


قورباغه ← دوزخیت



تجمع هوا در دهان


شکل دهان حیوانی  
تاریک

همه سلولها زنده هستند در بافت، در صورت آزار

### فصل ۳

## تبادلات گازی

تبادل




تنفس کشیدن، یکی از ویژگی‌های آشکار در بسیاری از جانوران است. اما آیا در همه جانوران به یک شکل انجام می‌شود؟ هدف از آن چیست؟

در ذهن بسیاری از ما، تنفس کشیدن به معنای زنده بودن است. برای تشخیص اینکه آیا فردی زنده است یا نه، غالباً نگاه می‌کنیم که آیا نفس می‌کشد یا خیر. به نظر می‌رسد این فرایند، کاری حیاتی را برای ما انجام می‌دهد. اما این کار حیاتی چیست؟

هوای آلوده به کدام بخش دستگاه تنفسی آسیب می‌رساند؟ افرادی که به دخانیات روی می‌آورند، چگونه به بدن خود آسیب می‌رسانند؟ اینها فقط بخشی از پرسش‌هایی است که پاسخ آنها را با مطالعه این فصل به دست خواهیم آورد.

علائم حیاتی





# گفتار ۱ ساز و کار دستگاه تنفس در انسان


## چرا نفس می کشیم؟

ارسطو، معتقد بود که نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می شود. او نمی دانست که هوا خود مخلوطی از چند نوع گاز است. بنابر این هوای دمی و بازدمی را از نظر ترکیب شیمیایی یکسان

می دانست. اما آیا واقعاً چنین است؟ **Ne** (تفاوت دم و بازدم؟) مقایسه هوای دمی و بازدمی نشان می دهد که این دو هوا با هم متفاوت اند. هوای دمی، اکسیژن بیشتری دارد اما در هوای بازدمی، کربن دی اکسید نسبت به هوای دمی بیشتر است. بنابراین، اهمیت فرایند تنفس از آنچه که ارسطو می پنداشت فراتر است. درک این اهمیت، زمانی ممکن شد

که آدمی توانست ارتباط دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون را بیابد. **دستگاه گردش خون، خون را از اندام های بدن جمع آوری می کند و به سوی شش ها می آورد.** این خون که به خون تیره معروف است اکسیژن کمتر و کربن دی اکسید بیشتری نسبت به خونی دارد که از شش ها خارج می شود. (خون تیره در شش ها، کربن دی اکسید را از دست می دهد و از هوا اکسیژن می گیرد و به خون روشن تبدیل می شود. خون روشن توسط دستگاه گردش خون به اندام ها و یاخته ها فرستاده می شود [شکل ۱]). به این ترتیب، **همواره به یاخته های بدن، اکسیژن می رسد و کربن دی اکسید از آنها دور می شود.** اما این کار چه ضرورتی دارد؟

در فصل قبل دیدیم که یاخته ها چگونه مواد مغذی را به دست می آورند. (انرژی مواد مغذی، مثل گلوکز، باید ابتدا به انرژی ذخیره شده در ATP تبدیل شود. واکنش خلاصه شده این تبدیل، به این صورت است:



این واکنش که تنفس یاخته ای نام دارد، علت نیاز به اکسیژن را توجیه می کند. اما کربن دی اکسید چرا باید دور شود؟ یکی از علل زیان بار بودن کربن دی اکسید این است که می تواند با آب واکنش داده، کربنیک اسید تولید کند و pH را کاهش دهد. این تغییر pH باعث تغییر ساختار پروتئین ها می شود که می تواند عملکرد پروتئین ها را مختل کند. از آنجا که بسیاری از فرایندهای یاخته ای از پروتئین ها انجام می دهند؛ از بین رفتن عملکرد آنها اختلال گسترده ای را در کار یاخته ها و بافت ها ایجاد می کند. در واقع، افزایش کربن دی اکسید، خطرناک تر از کاهش اکسیژن است.

$O_2 < CO_2$  در هوا دم و بازدم  
 $O_2 < CO_2$  دم  
 $CO_2 < O_2$  دم

علت لزوم از بین بردن  $CO_2$  بازدم نیست. هر دم از شش های مقصد نیست بلکه در شش عبور می شود و هوا از مجاری تنفسی برمی آید.


2. نسبت به ارسطو


اهمیت تبدیل مکان  
 در شش ها!

از تنفس سوخت؟

تفاوت در شش ها

$H_2O$





⬇

⬆


⬇



⬆ مراد غذایی

⬇ مراد دفعی ندارد

⬆ شش خون




\* بیشتر ها خون تیره دارد و سرد و پس از تبادل خون روشن خارج می شود.  
 سایر اندامها خون روشن دارد و سرد و خون تیره خارج می شود.

\* بیشتر  $O_2$  و بیشتر  $CO_2$  در خون ورودی ششهاست (سختی)

\* بیشتر  $O_2$  و بیشتر  $CO_2$  در خون خروجی ششهاست (سختی)

\* در سینه و بیاضی جمعیتی به تیره درون  
 بطن خون ندارد




## فعالیت ۱

### آیا هوای دمی با هوای بازدمی متفاوت است؟

پژوهش‌های دانشمندان در ابتدا، وجود سه گاز نیتروژن، اکسیژن و کربن دی‌اکسید را در هوا نشان داد. در این آزمایش، هوای دمی و بازدمی را از نظر مقدار نسبی کربن دی‌اکسید بررسی می‌کنیم. اما چگونه می‌توان مقدار کربن دی‌اکسید را در هوا تشخیص داد؟

برای انجام این آزمایش می‌توان از محلول آب آهک (بی‌رنگ) یا برم تیمول بلو رقیق (آبی‌رنگ) که معرف کربن دی‌اکسید هستند استفاده کرد. با دمیدن کربن دی‌اکسید به درون این محلول‌ها، آب آهک شیری‌رنگ و برم تیمول بلو، زرد رنگ می‌شود.



۱- دستگاه را مطابق شکل سوار کنید. انتهای لوله بلند را درون محلول و انتهای لوله کوتاه را در بالای محلول قرار دهید.

۲- به آرامی از طریق لوله مرکزی، عمل دم و بازدم را انجام دهید. در هنگام دم، در کدام ظرف، حباب‌ها مشاهده می‌شود؟ هنگام بازدم چطور؟

۳- دم و بازدم را ادامه دهید تا رنگ معرف در یکی از ظرف‌ها تغییر کند. آن را یادداشت کنید.

۴- چند دقیقه دیگر نیز به دم و بازدم ادامه دهید و تغییرات بعدی رنگ را در هر دو ظرف مشاهده، و یادداشت کنید.

۵- اکنون به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) چرا هوای دمی، به یک ظرف و هوای بازدمی، به ظرف دیگر وارد می‌شود؟

ب) نخست در کدام ظرف تغییر رنگ مشاهده کردید؟

پ) آیا معرف در هر دو ظرف سرانجام تغییر رنگ داد؟ این موضوع چه چیزی را برای ما روشن می‌کند؟

### بخش‌های عملکردی دستگاه تنفس

جایگاه هوا درون بدن را در  
درون و بیرون تنفس

از نظر عملکردی، می‌توان دستگاه تنفس را به دو بخش اصلی به نام‌های **بخش هادی** و **بخش**

۲) **مبادله‌ای** تقسیم کرد.

۴) **بصرفه‌خیزی**؟

جایگاه هوا بصورت اندر و درصفت هم تبادل گاز  
اجزای

### بخش هادی

۱) **مسیر ۲ طرفه**

بخش هادی، از مجاری تنفسی‌ای تشکیل شده است که هوا را به درون و بیرون دستگاه تنفسی

هدایت می‌کنند و آن را از ناخالصی‌ها، مثل میکروب‌های بیماری‌زا و ذرات گرد و غبار، پاک‌سازی و

نیز، گرم و مرطوب می‌کنند تا برای مبادله گازها با خون آماده شود. از بینی تا نایزک انتهایی به بخش

هادی تعلق دارد.

ابتدای مسیر ورود هوا در بینی، از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن، مانعی در برابر

ورود ناخالصی‌های هوا ایجاد می‌کند. با پایان یافتن این پوست، مخاط مزک‌دار در بینی آغاز می‌شود

که در سراسر مجاری هادی ادامه پیدا می‌کند. این مخاط، یاخته‌های مزک‌دار فراوان و ترشحات

**بیشتر بدانید**  
عوامل مختلفی بر عملکرد یاخته‌های مزک‌دار اثر می‌گذارند. هوای خیلی سرد، حرکت مزک‌های لایه مخاطی را کند می‌کند. دود سیگار و قلیان و بعضی از آلاینده‌های شیمیایی موجود در هوا، باعث مرگ یاخته‌های مزک‌دار می‌شوند.

سراسر دستگاه تنفسی تا نایزک انتهایی

مُزک ≠ نایزک

# بخش هادی

A) حوا ورودی و خروجی از مجاری مثبت معلق  
 گازها تنفسی فیسولر است. حوا ورودی (دم)  
 به شیری مثبت به حوا خروجی دارد.

B) ناخالصی ها توانند زنده شیر باکتری ها یا عنز زنده  
 باشند. شیر آلوده ها!

C) در مجاری هادی مجاورت حوا با بوی آب بسیع  
 مایع جز سیار آلوده بافت مطابق آوردن دما حوا دین  
 و سوز (25° به 37°)

D) لازم تبادل گازها محول در آب به آنها است.

E) بخش مجاری هادی 2 نوع بافت پوشش دارد منجی است  
کد سین دوبافت مخروط حرفان تند، ابتدا سفت  
چند دس مخاط کد داری بافت پوشش استوانه  
شردار با آستر سوزی است.

\* سکوا استوانه ای محد و شرک ندارد و شیر زنده حوا  
پوی در لابرای اس سکوا در سقف حفره سبی  
حفره.

بافت  
انتهای سبی سفت ش چند دس



خط مرزی (استخوانی)


خط مرزی (عضلانی)

سقف حفره سبی

نایزده ها مبادله ای  
 حباب ها

**مویز + آب**  
 ضروری (آب گرم رطوبت)

مخاطی دارد. در این ترشحات مواد ضد میکروبی وجود دارد. (شکل ۲).



شکل ۲- در مخاط نای سلول های استوانه ای مزک دار قرار دارند.

ترشحات مخاطی، ناخالصی های هوا را ضمن عبور به دام می اندازد. مزک ها با حرکت ضربانی خود، ترشحات مخاطی و ناخالصی های به دام افتاده در آن را به سوی حلق می رانند. در آنجا یا به دستگاه گوارش وارد شده، شیره معده آنها را نابود می کند یا بقیه خارج از بدن هدایت می شوند.

ترشحات مخاطی، هوا را مرطوب می کنند. مرطوب کردن هوا برای تبادل گازها ضرورت دارد. گازهای تنفسی تنها در صورتی که محلول در آب باشند، می توانند بین شش ها و خون مبادله شوند.

در بینی، شبکه ای وسیع از رگ هایی با دیواره نازک وجود دارد که هوا را گرم می کند. این شبکه به سطح درونی بینی بسیار نزدیک است، بنابراین آسیب پذیری بیشتری دارد و آسان تر از دیگر نقاط، دچار خونریزی می شود.

دهان، یا هر دو، به حلق وارد می شود (شکل ۳).

حلق، گذرگاهی ماهیچه ای است که هم هوا و هم غذا از آن عبور می کند.

انتهای حلق به یک دو راهی ختم می شود. در این دو راهی، حنجره در جلو و مری در پشت قرار دارد.

حنجره در بالای نای واقع است و در تنفس، دو کار مهم انجام می دهد.

یکی آنکه دیواره غضروفی آن، مجرای عبور هوا را باز نگه می دارد و دیگری آنکه در پوشی به نام برچاکنای (اپی گلوٹ) دارد که مانع ورود غذا به مجرای تنفسی می شود.

دیواره نای، حلقه های غضروفی شبیه به نعل اسب یا حرف C دارد که مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.


مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

**واژه شناسی**

**برچاکنای (Epiglottis / اپی گلوٹ)**

اپی گلوٹ زبانه ای است که در بالای حنجره قرار دارد و مانع ورود غذا به نای می شود. چاکنای به معنای شکاف میان تارهای صوتی است که در حنجره وجود دارد. اپی گلوٹ در پیچه ای است که این شکاف را می پوشاند. پس برچاکنای به معنای پوشاننده چاکنای همان معنی را می دهد که در آن بر به مغزای بالا و رو به کار رفته است.



شکل ۳- حلق و حنجره

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

مجرای نای را همیشه باز نگه می دارند (شکل ۴) دهانه غضروف دهانه حرف C به سمت مری قرار دارد. در نتیجه حرکت لقمه های بزرگ غذا در مری با مانعی روبه رو نمی شود. ساختار دیواره نای در شکل ۵ نشان داده شده است.

\* بازنگه داشتن مجرای عبور هوا ← دیواره عضلانی صخره

\* بازنگه داشتن مجرای نای ← حلقه‌ها عضلانی شکل

سطح 2 ← که همه سوراخ استخوانی ترک هستند. (اغلب درون) که ترک پرو از داخل سوراخ می‌گذرد و تیرگی از رخ حرکت ضربانی در آن زمان جهت حرکت ترک سوراخ می‌آید.

که ترک در آنجا خود اشکال می‌گیرد.

که تمام سوراخ برخی فقط به آن می‌رسند و تمام سوراخی که در آنجا در بین ترک

A) ترک‌های مجاری ← مانع نیروی ناخواسته و بروز زلزله ترک‌ها ← حرکت ناخواسته‌های به هم آمیخته به سمت حلقه و ترک \* در صورت زلزله‌ها در ترک‌ها به هم آمیخته باشد زلزله ترک‌ها در حرکت آن نیرو ندارد.

B) ترک‌ها بدون نیاز انرژی می‌توانند ایجاد می‌شوند در سطح هم‌تراز سطح باشد.

وضعیت ترک‌های مجاری در فضا : 1 مانع نیروی ناخواسته در مجاری تنفسی

2 سهولت ناخواسته حرکت

3 تحریک با نیروی

4 رطوبت در معده کردن هوا

C) در بین ← پوست ترک و در معده حرکت می‌کند  
 مسئله در هوا ✓ شده موثری X  
 دیواره ترک‌ها بسیار نازک ← علت آبریزد نیروی


D) زلزله‌های بزرگ باعث می‌شود ترک‌ها در ترک

E) حقوق توسط سیستم‌های انتقال به گوش میانی راه‌گذرد. میدان از حقوق جهت بروی صورت و تصور از آنست






# مقایسه درش عرضی نای و مری



۸-۷۷ مقعر  
 ۲-۷۷ سلول  
 ۴-۷۷ غشای داخلی

۹-۷۷ عضله  
 ۲-۷۷ غشای خارجی

۷۷-۷۷ لنگری




در غشیه جنبه شش چریع (عضروف کورس) ← تقاضای روبرو اندکی آن خارج شش رسد طرف شش  
 1 عدد - مفاصل شش  
 2 عدد - نایزده

نای، در انتهای خود، به دو شاخه تقسیم می شود و نایزده های اصلی را پدید می آورد. هر نایزده اصلی به یک شش وارد شده، در آنجا به نایزده های باریک تر تقسیم می شود (شکل ۶). همچنان که از نایزده اصلی به سمت نایزده های باریک تر پیش می رویم، از مقدار غضروف کاسته می شود، انشعابی از نایزده که دیگر غضروفی ندارد (نایزک) میبده می شود. در نایزده دوم قطعاً با غشیه جنبه شش در تماس است. به علت نداشتن غضروف، نایزک ها می توانند تنگ و گشاد شوند. این ویژگی نایزک ها به دستگاه تنفس امکان می دهد تا بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند. آخرین انشعاب نایزک در بخش هادی، نایزک انتهایی نام دارد.

اینش محل انجم در بخش هادی و هم مبادله ای با وجود دارد


بخش مبادله ای ← بخش نایزک ها و نایزک ها در بخش هادی  
 مفاصل شش و نایزده ها



بخش مبادله ای، با حضور اجزای کوچکی به نام حبابک مشخص می شود (شکل ۷). نایزکی را که روی آن حبابک وجود دارد، نایزک مبادله ای می نامیم. انتهای خود به ساختاری شبیه به خوشه انگور ختم می شود که از اجتماع حبابک ها پدید آمده است. هر یک از این خوشه ها را یک کیسه حبابکی می نامند. مفاصل شش و نایزده ها در طول نایزک مبادله ای به پایان می رسد، بنابراین در محل حبابک ها، این مخاط وجود ندارد.

در حبابک ها، گروهی از یاخته های دستگاه ایمنی بگن به نام درشت خوار (ماکروفاژ) مستقر شده اند (شکل ۸). این یاخته ها، باکتری ها و ذرات گرد و غباری را که از مخاط مژک دار گرفته اند نابود می کنند. درشت خوارها یاخته هایی با ویژگی بیگانه خواری و توانایی حرکت اند. این یاخته ها، نه فقط در کیسه های حبابکی شش ها، بلکه در دیگر نقاط بدن نیز حضور دارند.

هنگام نفس کشیدن، حجم کیسه های حبابکی تغییر می کند (لایه نازکی از آب، سطحی از حبابک را که در تماس با هواست پوشانده است؛ بنابراین حبابک به علت وجود نیروی کشش سطحی آب، در برابر باز شدن مقاومت می کند) به نام عامل سطح فعال (سورفاکتانت) که از بعضی یاخته های حبابک ها ترشح می شود. با کاهش نیروی کشش سطحی، باز شدن حبابک ها را آسان می کند (شکل ۹). در بعضی از نوزادانی که زود هنگام به دنیا آمده اند، عامل سطح فعال به مقدار کافی ساخته نشده است و بنابراین به زحمت نفس می کشند.




در بعضی از نوزادانی که زود هنگام به دنیا آمده اند، عامل سطح فعال به مقدار کافی ساخته نشده است و بنابراین به زحمت نفس می کشند.

این سورفاکتانت در سطح خدجی در داخل با سکوگا در داخل حبابک و از سطح صاف در داخل با سکوگا در داخل حبابک

تولید سورفاکتانت تا اواخر دوره جنینی ادامه دارد \*

A. Anterior view

B. Cross section





حقوق کا نظر سے

انقباض عضلات

انقباض معروف

فراہمہ جیب (انقباضی)  
جیناغ

نصرف کا ندرت






# عملت مویز اطراف حبیب؟

مویز داخل حبیب نماند

اطراف حبیبک ها را مویزگ های فراوان، احاطه کرده اند و به این ترتیب، امکان تبادل گازها بین هوا و خون فراهم شده است (شکل ۱۰).



انواع مویزها در دیواره حبیب

دیواره حبیبک از دو نوع ساخته شده است. نوع اول، سنگ فرشی و فراوان تر است. نوع دوم، با ظاهری کاملاً متفاوت، به تعداد خیلی کمتر دیده می شود و ترشح عامل سطح فعال را بر عهده دارد (شکل ۱۱). درشت خوارها را جزء یاخته های دیواره حبیبک، طبقه بندی نمی کنند.



برای اینکه اکسیژن و کربن دی اکسید بین هوا و خون مبادله شوند، این مولکول ها باید از ضخامت دیواره حبیبک ها و دیواره مویزگ ها عبور کنند. هر دو دیواره، از بافت پوششی سنگ فرشی یک لایه ساخته شده اند که بسیار نازک است. در جاهای متعدد، بافت پوششی حبیبک و مویزگ هر دو غشای پایه مشترک دارند؛ در نتیجه مسافت انتشار گازها به حداقل ممکن رسیده است (شکل ۱۱).

شکل ۸- یاخته های درشت خوار در حبیبک ها

مویز از ۲ تا ۱۷ سلول پوششی  
مویز مت و مویز

هر دو نوع خوار  
دارو غشای پایه

زنده تنوع  
بسط حبیب  
پولن  
مویز  
غشای پایه مشترک





شکل ۱۰- مویزگ های خونی فراوان، اطراف حبیبک ها را احاطه کرده اند.

شکل ۹- عامل سطح فعال در

سطحی که مجاور هواست ترشح می شود.

خون سبز دارد رنگ آن در خون جانمی است

انواع مویز توسط سلول های نوع دوم



فضای درون حبیبک  
گویچه قرمز  
گویچه سبز  
یاخته نوع دوم در مویزگ  
سنگ فرشی که مویزگ را احاطه کرده است

شکل ۱۱- ساختار حبیبک ها

A ← اوپنابل در اطراف جبهه حجم دجهای بزرگ تبدیل میشود (میزان  $O_2$  با  $CO_2$  ↑)  
دخول تیره ( $CO_2 < O_2$ ) به خون دوش ( $O_2 < CO_2$ ) تبدیل میشود.

B ← دیواره جبهه حشره از ب سول تیره شده در سرخ خارج طایفه باید باشد.  
① سفر ش (max) ← طنف و قطر ظار  
\* سول دیواره جبهه  
② نوع دوم (min) ← طنف و قطر ظار

\* سول سفر ش مماص تیره ظار و قطر ظار \*

\* سول نوع دوم قطر شیر، طایفه زائده کستوبه بسی هستند \*

← به در سرخ سول تیره در حالت طایفه باید بسی مماص باشد

③ ← در کجا ما باز


← بسی از سول دسته اعنی هستند که ف دک مردمی از سول مماص هستند

این سول در حالت مماص حضور دارند تولاف حالت در کجا دارند

← کوارش ظار سول مماص باید تا وسط آب سول حای  
(در کجا ما باز) ← بسی از سول داخل در سخت خوار  
← خط دوم دای

Hb ← در جایی که  $O_2 < CO_2$

$CO_2$  بسی از جایی که  $O_2$



\* هر مولکول از جمله از جمله می تولید شود بسی از مولکول از جمله مضر شده

Hb در جایی که  $O_2 < CO_2$  ←  $O_2$  بسی از جایی که  $CO_2$



← بسی از جایی که  $CO_2$


x تیره شده  $HbO_2$   
✓ بسی از جایی که  $HbCO_2$

\* هر انفصال Hb به  $O_2$  با  $CO_2$  فرد

\* نار

هر Hb می تولید شود با اختار آهن  
به ۴ مولکول از مضر شده  $O_2$   
(۸ اتم آهن)





## حمل گازها در خون

### بیشتر بدانید

گاز کربن مونوکسید، بدون رنگ، بو یا طعم است و بنابراین وجود آن در محیط، قابل تشخیص نیست؛ به همین علت آن را **قاتل خاموش** می نامند. این گاز در دود حاصل از سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز پدید می آید. به همین علت، اطمینان پیدا کردن از خروج دود از وسایلی که از سوخت فسیلی، به ویژه گاز استفاده می کنند کاملاً ضرورت دارد.

کار دستگاه تنفس با همکاری دستگاه گردش خون، کامل می شود. خون، اکسیژن را به یاخته‌ها می رساند و کربن دی اکسید را از آنها می گیرد و به سمت شش‌ها می آورد تا از بدن خارج شود.

(با توجه به اینکه بخش اندکی از این گازها به صورت محلول در خوناب جا به جا می شوند، بنابراین)

به سازوکارهای دیگری برای حمل این مولکول‌ها در خون نیاز است. گویچه قرمز سرشار از **هموگلوبین** است. غلظت اکسیژن خونی که از قلب به شش‌ها می رود کمتر از غلظت اکسیژن در هوای حبابک‌ها است؛ در نتیجه در شش‌ها اکسیژن به هموگلوبین می پیوندد و در مجاورت بافت‌ها، (که غلظت اکسیژن به علت مصرف شدن توسط یاخته‌ها کاهش یافته است)، اکسیژن از هموگلوبین جدا و به یاخته‌ها داده می شود. پیوستن کربن دی اکسید به هموگلوبین و یا گسستن از آن نیز تابع غلظت کربن دی اکسید است. در بافت‌ها، کربن دی اکسید به هموگلوبین متصل و در شش‌ها از آن جدا می شود.

کربن مونوکسید، مولکول دیگری است که می تواند به هموگلوبین متصل شود با این تفاوت که وقتی متصل شد، به آسانی جدا نمی شود. محل اتصال این مولکول به هموگلوبین، همان محل اتصال اکسیژن است (بنابراین کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوبین، مانع پیوستن اکسیژن می شود و چون به آسانی جدا نمی شود ظرفیت حمل اکسیژن را در خون کاهش می دهد. این وضعیت ممکن است چنان شدید باشد که به مرگ منجر شود. از این رو کربن مونواکسید گازی سمی به شمار می رود.

تنفس این گاز باعث مسمومیت می شود و بلاگاز گرفتگی شهرت دارد. بیشترین مقدار حمل اکسیژن در خون به وسیله هموگلوبین انجام می شود؛ اما هموگلوبین در ارتباط با حمل کربن دی اکسید نقش کمتری دارد.

بیشترین مقدار کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات در خون حمل می شود. در گویچه قرمز، آنزیمی به نام **کربنیک آنیدراز** هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. با رسیدن به شش‌ها، کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود و از آنجا به هوا انتشار می یابد.

اگر گاز گرفتگی شهرت دارد، این گاز چیست؟

بیشترین مقدار کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات در خون حمل می شود. در گویچه قرمز، آنزیمی به نام کربنیک آنیدراز هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. با رسیدن به شش‌ها، کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود و از آنجا به هوا انتشار می یابد.

بیشترین مقدار کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات در خون حمل می شود. در گویچه قرمز، آنزیمی به نام کربنیک آنیدراز هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. با رسیدن به شش‌ها، کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود و از آنجا به هوا انتشار می یابد.

بیشترین مقدار کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات در خون حمل می شود. در گویچه قرمز، آنزیمی به نام کربنیک آنیدراز هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. با رسیدن به شش‌ها، کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود و از آنجا به هوا انتشار می یابد.

بیشترین مقدار کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات در خون حمل می شود. در گویچه قرمز، آنزیمی به نام کربنیک آنیدراز هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. با رسیدن به شش‌ها، کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود و از آنجا به هوا انتشار می یابد.

بیشترین مقدار کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات در خون حمل می شود. در گویچه قرمز، آنزیمی به نام کربنیک آنیدراز هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. با رسیدن به شش‌ها، کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود و از آنجا به هوا انتشار می یابد.

بیشترین مقدار کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات در خون حمل می شود. در گویچه قرمز، آنزیمی به نام کربنیک آنیدراز هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. با رسیدن به شش‌ها، کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود و از آنجا به هوا انتشار می یابد.

بیشترین مقدار کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات در خون حمل می شود. در گویچه قرمز، آنزیمی به نام کربنیک آنیدراز هست که کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون بیکربنات از گویچه قرمز خارج و به خوناب وارد می شود. با رسیدن به شش‌ها، کربن دی اکسید از ترکیب یون بیکربنات آزاد می شود و از آنجا به هوا انتشار می یابد.

### بیشتر بدانید

#### تنفس از نگاه لاوازیه

آنتونی لاوازیه، دانشمند فرانسوی قرن هجدهم که به پدر علم شیمی نوین مشهور است، کارهایی در زمینه زیست‌شناسی نیز دارد. او برای توصیف آنچه در فرایند تنفس در جانوران رخ می دهد، آزمایش‌هایی انجام داد. لاوازیه براساس نتایج حاصل از این آزمایش‌ها عنوان کرد که آنچه در تنفس رخ می دهد، همانند سوختن شمع است که در آن یکی از اجزای هوا (که بعد اکسیژن نامیده شد) با جسم سوختنی ترکیب می شود. او بر این باور بود که گرمای بدن حاصل چنین واکنشی است که در شش‌ها رخ می دهد؛ خون گرم را از شش‌ها می گیرد و به سراسر بدن هدایت می کند؛ البته امروز می دانیم که این موضوع نادرست است. این نظر که کار شش‌ها ایجاد گرما است تا مدت‌ها به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته شده بود، شاید به این دلیل که دانشمندان آن زمان تحت تأثیر افکار **ارسطو** بودند که قلب و شش‌ها را محل وقوع مهم‌ترین فرایندهای حیاتی می دانست.

کمی بعد از مرگ لاوازیه در ۵۱ سالگی، اسپالانزانی (**Lazzaro Spallanzani**) دانشمند ایتالیایی دریافت که واکنش سوختن (تنفس)، حتی در بافت‌های جانوری تازه کشته شده و جانورانی که شش ندارند، نیز رخ می دهد. این یافته‌ها این باور را که شش‌ها محل سوختن مواد هستند، مورد تردیدی جدی قرار داد. سرانجام نزدیک به صد سال پس از لاوازیه، **فلوگر** (**Eduard Pflüger**) دانشمند آلمانی نشان داد، سوختن مواد در یاخته‌ها و نه در شش‌ها، رخ می دهد.

نورم بود ← سوزناک‌های محقق‌های باهوشی ← نظریه‌های تنفسی

بافت، تولید  $O_2$  در تنفس  
 سلول، اکسیژن

محل اتصال  $O_2$  به Hb  
 همان محل اتصال  $O_2$  به Hb  
 محل اتصال  $O_2$  به مولکول  $O_2$   
 را دارد. (اتم اکسیژن ← ۱۸)

محل اتصال  $O_2$  و تولید Hb  
 تولید در RBC (محیط قلیایی)  
 حباب‌های  $O_2$  و  $HCO_3^-$   
 تولید در RBC (محیط اسیدی)



⑤ شب نفثت کا رخا در مجاورت حبیب و

شب نفثت  $O_2$  و از حبیب در خون

شب نفثت  $CO_2$  از خون به هوای حبیب

⑥ در مجاورت حبیبها  $(O_2 < CO_2)$

\* تبدیل  $HbO_2$  در تجزیه  $HbCO_2$

در مجاورت سگوبه بافت  $(O_2 < CO_2)$


\* تبدیل  $HbCO_2$  در تجزیه  $HbO_2$

←  $CO_2$  به داخل حبیب آزاد می شود

←  $O_2$  وارد سگوبه می شود

⑨ حضور  $CO$  باعث ↓ ظرفیت سگوبه می شود  
عمل  $CO$  می شود و بی تاثیر در ظرفیت عمل  $CO_2$  ندارد.

⑩ علت مرگ در اثر طاری قلبی زمین  $O_2$  به سگوبه است.




سگوبه (نوع) 4 ص 4  
4 اسم آهن  
2 تا  $\alpha$   
2 تا  $\beta$

①  $CO_2$  ماده دفعی است در ریزش نوع آن بازم است.

② جهت خاص حرارت  $O_2$  و  $CO_2$  در خون مخالف یکدیگر است  
( $O_2$  از شش به سمت اندامها و  $CO_2$  از اندامها به سمت شش)


③ حجم  $O_2$  و حجم  $CO_2$  بر روش محول در باسما به مقدار بسیار اندک جابه جایی می شود  
( $O_2$  1.3 و  $CO_2$  1.7)

④ توان سگوبه به داخل سگوبه قرونز:



\*  $Hb$  ← داخل RBC  
✓ پرو قرونز رنگ انتقال دهنده  
✓ در جابه جایی  $O_2$  و  $CO_2$  نقش دارد  
← در جابه جایی  $O_2$  نقش دارد

\*  $AC$  ← داخل سگوبه  
✓ پرو آنزیمی  
✓ در جابه جایی  $CO_2$  نقش دارد



بانت

$O_2$  کا ذرہ

$O_2$

جانب

$O_2$  کا ذرہ

مگنون 1.3

197

$HbO_2$

$HbCO_2$

جانب جایی RBC دلا  $HbO_2$

جانب جایی RBC دلا  $HbCO_2$

$HbO_2$

$O_2$

Hb

$HbCO_2$

170

193

$H_2CO_3 + H_2O + H^+$

انستاز انستاز

AC

$CO_2$  مگنون

$HCO_3^-$

$CO_2$

مگنون در پائے

$CO_2$

Cell

حویں

انستاز  $CO_2$

انستاز  $CO_2$

انستاز  $CO_2$

ماهیچه بین دنده‌ای خارجی ← درم معمولی بعرض ۱۰-۱۲ میلی‌متر و دراز ۱۰-۱۲ سانتیمتر (۱-۲ عمق تقریبی)


ماهیچه بین دنده‌ای خارجی

## گفتار ۲

### تهویه ششی

### فرایند تهویه ششی؟

تهویه ششی شامل دو فرایند دم و بازدم است. برای درک چگونگی دم و بازدم، لازم است ابتدا با ساختار و عمل شش‌ها آشنا شویم.



ساختار و عمل شش‌ها آشنا شویم.

از دم شش‌ها در قفسه سینه

شش‌ها چینی


مکان

(شش‌ها درون قفسه سینه و روی پرده ماهیچه‌ای میان‌بند (دیافراگم) قرار دارند.) شش‌ها چپ به علت مجاورت با قلب، از شش راست قدری کوچک‌تر است. بیشتر حجم شش‌ها را کیسه‌های جیب‌کی به خود اختصاص داده‌اند و ساختاری اسفنج‌گونه را به شش می‌دهند. قفسه سینه علاوه بر محافظت از شش‌ها در تهویه ششی نیز نقش دارد. در بین دنده‌ها، ماهیچه‌هایی به نام ماهیچه‌های بین دنده‌ای وجود دارند که به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می‌شوند (شکل ۱۲-الف). (این ماهیچه‌ها دنده‌ها و در نتیجه قفسه سینه را حرکت می‌دهند.)

Handwritten notes in Persian: 'ماهیچه بین دنده‌ای خارجی' (external intercostal muscle), 'ماهیچه بین دنده‌ای داخلی' (internal intercostal muscle), 'شش‌ها چینی' (lungs are lobulated), 'مکان' (location), 'شش‌ها درون قفسه سینه' (lungs are in the thoracic cavity), 'روی پرده ماهیچه‌ای میان‌بند' (on the diaphragm), 'شش‌ها چپ به علت مجاورت با قلب' (left lung is smaller due to heart proximity), 'بیشتر حجم شش‌ها را کیسه‌های جیب‌کی' (most lung volume is in lobules), 'خود اختصاص داده‌اند' (dedicated to themselves), 'ساختاری اسفنج‌گونه' (spongy structure), 'قفسه سینه علاوه بر محافظت از شش‌ها' (thoracic cage protects lungs), 'در تهویه ششی نیز نقش دارد' (also plays a role in ventilation), 'در بین دنده‌ها' (between ribs), 'ماهیچه‌هایی به نام ماهیچه‌های بین دنده‌ای' (muscles called intercostal muscles), 'وجود دارند که به دو دسته خارجی و داخلی' (exist in two types: external and internal), 'تقسیم می‌شوند' (are divided), '(شکل ۱۲-الف)' (Figure 12-a), '(این ماهیچه‌ها دنده‌ها و در نتیجه قفسه سینه را حرکت می‌دهند.)' (these muscles move the ribs and thus the thoracic cage).

ماهیچه بین دنده‌ای داخلی  
← در بازدم عمیق در لایه عمیق‌تر نقش دارد.

هر یک از شش‌ها را پرده‌ای دو لایه به نام پرده جنب فراگرفته است (شکل ۱۲-ب). (یکی از لایه‌های این پرده، به سطح شش چسبیده و لایه دیگر به سطح درونی قفسه سینه متصل است.) زون پرده جنب، فضای اندکی است که از مایعی به نام مایع جنب، پر شده است. فشار این مایع از فشار جو کمتر است و باعث می‌شود شش‌ها در حالت بازدم، کاملاً جمع نشوند، در صورتی که قسمتی از قفسه سینه سوراخ شود، شش‌ها جمع می‌شوند. (عادت به مایع جنب)




شکل ۱۲-الف (ماهیچه‌های بین دنده‌ای، ب) شش‌ها و قفسه سینه

شش‌ها دو ویژگی مهم دارند: یکی پیروی از حرکات قفسه سینه و دیگری کشسانی. هنگامی که حجم قفسه سینه افزایش می‌یابد، شش‌ها باز می‌شوند. در نتیجه، فشار هوای درون شش‌ها کم شده، هوای بیرون به درون شش‌ها کشیده می‌شود. اما باید توجه داشت که به علت ویژگی کشسانی، شش‌ها در برابر کشیده شدن، مقاومت نیز نشان می‌دهند و تمایل دارند به وضعیت اولیه خود بازگردند. ویژگی کشسانی شش‌ها در بازدم نقش مهمی دارد.

حجم ۲۵۰۰ سی‌سی






ابتدا حجم قفسه سینه بعد از آنکه دم

(A) حفظ می‌شود و در آن زمان در حالت سکون در مجرای دم حجم قفسه سینه‌ای

دعم قفسه سینه

\* حرکت دادن استخوان‌ها و غشای نرسه و جفت‌ها در حین انقباض باقی  
در حالت استخوان هم منقبض می‌شود. انقباض بیننده او خارج می‌شود. در حالت استخوان

از 2 نوع وجود دارد و انقباض با هم  
استخوان‌ها را حرکت می‌دهند



شکل ۱۳- افزایش و کاهش حجم قفسه سینه در دم و بازدم عادی

دم، فرایندی است که در نتیجه افزایش حجم قفسه سینه رخ می‌دهد. در این رویداد، دو عامل دخالت دارد. اول، ماهیچه میان‌بند (1) که در حالت استراحت، گنبدی شکل است، اما وقتی منقبض می‌شود، به حالت مسطح در می‌آید. دوم، انقباض ماهیچه‌های بین دنده‌ای (2) خارجی که دنده‌ها را به سمت بالا و جلو جابه‌جا می‌کند و جناغ را به جلو می‌راند (شکل ۱۳). در تنفس آرام و طبیعی، میان‌بند نقش اصلی را بر عهده دارد. در دم عمیق، انقباض ماهیچه‌های ناحیه گردن نیز، به افزایش حجم قفسه سینه کمک می‌کند.

بافتن استخوان‌ها در حین انقباض

حرکت دنده‌ها در جهت جناغ در جهت

میان‌بند طرفه‌ای حرکت می‌کند (به افزایش)

جابه‌جایی هوا و جابجایی

با به استراحت در آمدن ماهیچه میان‌بند و ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی، و بر اثر ویژگی کشسانی شش‌ها، حجم قفسه سینه و در نتیجه، حجم شش‌ها کاهش می‌یابد و هوای درون آنها به بیرون رانده می‌شود. در بازدم عمیق، انقباض ماهیچه‌های بین دنده‌ای داخلی و نیز ماهیچه‌های شکمی، به کاهش حجم قفسه سینه کمک می‌کند.


بافتن استخوان‌ها در حین انقباض استراحت

\* دم معمو، غشوی فعال  
\* بازدم معمو، غشوی فعال

فعالیت ۲

تشریح شش گوسفند

۱- ویژگی ظاهری: شش به علت دارا بودن کیسه‌های حبابکی فراوان، حالتی اسفنج گونه دارد. شش راست از شش چپ بزرگ‌تر است. شش راست از سه قسمت یا لپ (لوب) و شش چپ از دو قسمت تشکیل شده است.  
۲- تشخیص شش راست و چپ: (اگر در نمونه‌ای که تهیه کرده‌اید مری نیز وجود دارد، به محل قرارگیری آن توجه کنید. نای در جلو و مری در پشت قرار گرفته است و به این ترتیب می‌توانید سطح جلویی و پشتی نای و شش‌ها (و در نتیجه راست و چپ آنها) را نیز مشخص کنید.)  
مری را جدا کنید. برای تشخیص سطح جلویی و پشتی نای در حالتی که مری از آن جدا شده است، کافی است به یاد داشته باشید که غضروف‌های نای C شکل اند. این وضعیت باعث می‌شود که در نای، قسمت دهانه حرف C از سایر قسمت‌ها نرم‌تر باشد. بالمس کردن، این قسمت را پیدا کنید.



در بعضی موارد بافتن

در جهت عقب

جهت نفس کشیدن R و L ابتدا باید سطح مری و بعد بافتن در حجم یا توسط مری یا توسط عضلات حجابی



این قسمت، محل اتصال نای به مری و بنابراین سطح پشتی نای است.

۳- بررسی ویژگی کشسانی شش ها: با یک تلمبه از نای به درون شش ها بدمید و قابلیت کشسانی شش ها را مشاهده کنید.

۴- بررسی ساختارهای درونی (نای را از قسمت نرم آن (دهانه حرف C) در طول، برش دهید تا به نزدیکی شش ها برسید.) در نای گوسفند، قبل از دو نایژه اصلی، یک انشعاب سوم هم مشاهده می شود که به شش راست می رود. مدخل این انشعاب و سپس نایژه های اصلی را مشاهده کنید.


در انسان گاو زردار

برش طولی نای را از مدخل نایژه اصلی ادامه دهید. دقت کنید (که بریدن نایژه اصلی به سادگی نای نیست و این به علت ساختار غضروف های نایژه است که در ابتدا به صورت حلقه کامل و بعد به صورت قطعه قطعه است.) در طول نای، مدخل های نایژه های بعدی قابل مشاهده است.

اگر تکه ای از شش را بپزید، در مقطع آن سوراخ هایی را مشاهده می کنید که به سه گروه قابل تقسیم اند. نایژه ها، سیاهرگ ها و سیاهرگ ها. لبه نایژه ها به علت دارا بودن غضروف، زبر است و به این ترتیب از رگ ها قابل تشخیص است. (سرخرگ ها دیواره محکم تری نسبت به سیاهرگ ها دارند و به همین علت، برخلاف سیاهرگ ها دهانه آنها حتی در نبود خون هم باز است اما دهانه سیاهرگ ها در نبود خون بسته است.)

اگر تکه ای از شش را ببرید و در ظرفی پر از آب بیندازید خواهید دید که روی سطح آب شناور می ماند. چرا؟

سبب بردهای حاصل از سطح آب است.



### حجم های تنفسی

مقدار هوایی که به شش ها وارد یا از آن خارج می شود به چگونگی دم و بازدم ما بستگی دارد.

بنابراین، حجم های مختلفی از هوا را می توان به شش وارد و یا از آن خارج کرد. (حجم های تنفسی را با دستگاه دم سنج (اسپیرومتر) اندازه می گیرند.) نموداری که دم سنج از دم و بازدم های فرد رسم می کند، دم نگاره (اسپیروگرام) نامیده می شود (شکل ۱۴). (تحلیل دم نگاره در تشخیص درست بیماری های ششی کاربرد دارد.)

توضیح اسپیرومتر؟  
توضیح اسپیرومتر؟  
توضیح دم نگاره؟  
توضیح دم نگاره؟

به مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج می شود حجم جاری می گویند. حجم جاری حدود ۵۰۰ mL است (از حاصل ضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه، حجم تنفسی در دقیقه به دست می آید.)


اما می دانیم که با دم یا بازدم عمیق می توانیم مقدار بیشتری هوا را به شش ها وارد یا از آنها خارج کنیم. (حجم ذخیره دمی، به مقدار هوایی گفته می شود که می توان پس از یک دم معمولی، با یک دم عمیق به شش ها وارد کرد.) (حجم ذخیره بازدمی، به مقدار هوایی گفته می شود که می توان پس از یک بازدم معمولی با یک بازدم عمیق از شش ها خارج کرد.) (حتی بعد از یک بازدم عمیق، مقداری هوا در شش ها باقی می ماند و نمی توان آن را خارج کرد. این مقدار را حجم باقی مانده می نامند.) (حجم باقی مانده، اهمیت زیادی دارد؛ چون باعث می شود حبابک ها همیشه باز بمانند؛ همچنین تبادل گازها را در فاصله بین دو تنفس ممکن می کند.)

توضیح حجم ذخیره دمی؟  
توضیح حجم ذخیره بازدمی؟  
توضیح حجم باقی مانده؟  
توضیح حجم باقی مانده؟


## هوا باقی مانده، باقی می ماند!

Min O2  
Max O2





باقی مانده



\* کول باقی مانده ←  $Max O_2$   $Min O_2$   
 \* کول مرده ←  $Min O_2$   $Max O_2$

# تعریف و مقدار هوا مرده؟

✓ هوا مرده اوسن ورود ، اوسن خروج!


باید توجه کرد که بخشی از هوای دمی در بخش هادی دستگاه تنفس می ماند و به بخش مبادله ای نمی رسد. به این هوا که در حدود ۱۵۰ میلی لیتر است، هوا مرده می گویند. مقدار حجم ها در فرد سالم، به سن و جنسیت او بستگی دارد.

## ظرفیت های تنفسی

\* ظرفیت تنفسی، مجموع دو یا چند حجم تنفسی است. ظرفیت حیاتی مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و با یک بازدم عمیق می توان از شش ها خارج کرد و برابر با مجموع حجم های جاری، ذخیره دمی و ذخیره بازدمی است. ظرفیت تام، حداکثر مقدار هوایی است که شش ها می توانند در خود جای دهند و برابر است با مجموع ظرفیت حیاتی و حجم باقی مانده.

ظرفیت تنفسی

حجم تنفسی = ظرفیت تنفسی



\* تفاوت ظرفیت تام و حیاتی حدود ۱۰۰۰ میلی لیتر  
 فضای باقی مانده است




\* هر جا نمودار در حال دور زدن از مکعبان می باشد ← فعال - با انقباض واقعی - برابر ظرفیت تنفسی  
 \* هر جا نمودار در حال توقف در ۲۵۰۰ ← غیر فعال - در زمان انقباض واقعی - در ۲۵۰۰

شکل ۱۴ - دم سنج و دم نگارم  
 ✓ هر جا نمودار صعودی ← ورود هوا  
 ✓ هر جا نمودار نزولی ← خروج هوا

## فعالیت ۳


ظرفیت شش های افراد مختلف مساوی نیست. با ساختن دستگاهی مانند شکل زیر، می توانید گنجایش شش های خود و هم کلاسی هایتان را اندازه بگیرید. گنجایش ظرف وارونه، حداقل باید پنج لیتر باشد. در




- ابتدا، ظرف را از آب پر و سپس در تشت وارونه کنید. ابتدا نفس بسیار عمیقی بکشید و بعد تا جایی که می توانید در لوله فوت کنید. هنگام فوت کردن بینی خود را بگیرید.
- ۱- آیا عددی که در اینجا نشان داده می شود، ظرفیت واقعی شش های شماست؟ دلیل بیاورید.
- ۲- چگونه می توانید به کمک این دستگاه، مقدار هوای دم و بازدم خود را نیز اندازه بگیرید؟




DATE



Blank lined area for writing.






زمان



# اعمال دستگاه تنفس

سرفه و عطسه برای سبب زودمانی هستند.



روش ایجاد پرده‌ها صوتی؟


## سایر اعمال دستگاه تنفس

**تکلم:** حنجره محل قرارگیری پرده‌های صوتی است. این پرده‌ها حاصل چین خوردگی مخاط به سمت داخل اند. پرده‌های صوتی صدا را تولید می‌کنند. شکل دهی به صدا به وسیله بخش‌هایی مانند لب‌ها و دهان صورت می‌گیرد.

**سرفه و عطسه:** (چنانچه ذرات خارجی یا گازهایی که ممکن است مضر یا نامطلوب باشند به مجاری تنفسی وارد شوند، باعث واکنش سرفه یا عطسه می‌شود در این حالت هوا با فشار از راه دهان (سرفه) یا بینی و دهان (عطسه) همراه با مواد خارجی به بیرون رانده می‌شود (شکل ۱۵). در افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند، به علت از بین رفتن یاخته‌های مزکدار مخاط تنفسی، سرفه راه مؤثرتری برای بیرون راندن مواد خارجی است و به همین علت این‌گونه افراد به سرفه‌های مکرر مبتلا هستند.)


صفت پرده‌ها صوتی  
صوتی  
راهی که باعث سرفه و عطسه می‌شود

علت سرفه و عطسه؟



شکل ۱۵- عطسه یکی از سازوکارهای بیرون راندن مواد خارجی است.

## تنظیم تنفس



شکل ۱۶- مراکز عصبی تنفس

تنظیم تنفس، با انقباض میان‌بند و ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی آغاز می‌شود. انقباض این ماهیچه‌ها با دستوری انجام می‌شود که از طرف مرکز تنفس در بصل النخاع صادر شده است (شکل ۱۶). با پایان یافتن دم، با زدم بدون نیاز به پیام عصبی، با بازگشت ماهیچه‌ها به حالت استراحت و نیز ویژگی کشسانی شش‌ها انجام می‌شود. (علت بازدم؟)

(تنفس، مرکز دیگری هم دارد که در پل مغز، واقع است و با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع، دم را خاتمه می‌دهد. مرکز تنفس در پل مغز می‌تواند مدت زمان دم را تنظیم کند.) اثر بر مغز در تنظیم تنفس

افزایش کربن دی‌اکسید و کاهش اکسیژن خون نیز از عوامل مؤثر در تنظیم تنفس اند.

دستور شروع دم ← بصل النخاع  
تنظیم مدت زمان دم ← پل مغز

## بیشتر بدانید

سکسکه دم عمیقی است که در نتیجه انقباض ناگهانی میان‌بند ایجاد می‌شود. این فرایند در نتیجه تحریک میان‌بند یا عصب مرتبط با آن آغاز می‌شود. صدای سکسکه وقتی ایجاد می‌شود که هوای دمی با پرده‌های صوتی برخورد می‌کند.

**خمیازه** دم بسیار عمیقی است که با باز شدن آرواره همراه است و نتیجه آن تهویه همه حبابک‌هاست (در تنفس عادی طبیعی لزوماً چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد). افزایش کربن دی‌اکسید از عوامل ایجاد خمیازه است.

DATE

\* تعلم


صدا سازی 8  
وصف دستگاه تنفس

فاشه سازی 8  
وصف دستگاه صوتی

\* مصرف سرفه نومی سازگار نامی دستگاه تنفس هستند \*



تنوع تبادلات گازی




شکل ۱۷- تنفس از طریق انتشار در تک یاخته ای ها (پارامسی)

در تک یاخته ای ها (شکل ۱۷) و جانورانی مانند هیدر که همه یاخته های بدن می توانند با محیط تبادلات گازی داشته باشند. ساختار ویژه ای برای تنفس وجود ندارد اما در سایر جانوران، ساختارهای تنفسی ویژه ای مشاهده می شود که ارتباط یاخته های بدن را با محیط فراهم می کنند. در این جانوران، چهار روش اصلی برای تنفس مشاهده می شود که عبارت اند از تنفس ناییدیسی، تنفس پوستی، تنفس آبششی و تنفس ششی.

- ۱) تنفس ناییدیسی
- ۲) تنفس پوستی
- ۳) تنفس آبششی
- ۴) تنفس ششی


نایدیس ها، لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق منافذ تنفسی به خارج راه دارند (شکل ۱۸). منافذ تنفسی در ابتدای نایدیس قرار دارند. نایدیس به انشعابات کوچک تری تقسیم می شود. انشعابات پایانی، که در کنار همه یاخته های بدن قرار می گیرند، بن بست بوده و دارای مایعی است که تبادلات گازی را ممکن می کند؛ حشرات چنین تنفسی دارند. در این جانوران دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.



شکل ۱۸- تنفس ناییدیسی

تنفس پوستی

در تنفس پوستی شبکه مویرگی زیرپوستی با مویرگ های فراوان وجود دارد و گازها با محیط اطراف از طریق پوست مبادله می شوند. سطح پوست در جانورانی که تنفس پوستی دارند، مرطوب نگه داشته می شود. کرم خاکی تنفس پوستی دارد. تنفس پوستی در دوزیستان نیز وجود دارد (شکل ۱۹).







شکل ۱۹- تنفس پوستی

- دوزیست
- انواع آب
- انواع آب
- ششی (خلی)

(A) این جنرال درگاه نفس نکلان و بی نعل کاز طراد و سلج تبادل و متاسو است


(B) تبادل کازی صورت 2 طرفه در بر دوش استارو باره




تبادل، تنفس ← عمل  
 بی مهره ها / مهره داران

**تنفس آبششی**

ساده ترین آبشش ها، برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی هستند، مانند آبشش های ستاره دریایی (شکل ۲۰). در سایر بی مهرگان، آبشش ها به نواحی خاص محدود می شوند. ماهیان و نوزاد دوزیستان نیز آبشش دارند (شکل ۲۱). تبادل گاز از طریق آبشش، بسیار کارآمد است. جهت حرکت خون در مویرگ ها، و عبور آب در طرفین تیغه های آبششی، برخلاف یکدیگر است. باعث  $\uparrow$  سطح تماس جهت تبادل گاز می شود.  
 خون کم اکسیژن



شکل ۲۰- ساده ترین آبشش در ستاره دریایی





شکل ۲۱- تنفس آبششی در ماهی. به تفاوت جهت حرکت آب و خون دقت کنید.

**تنفس ششی**

حلزون از بی مهرگان خشکی زی است که برای تنفس، از شش استفاده می کند. د مهره داران شش دار سازو کارهایی وجود دارد که باعث می شود جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت بخش مبادله ای برقرار شود. این سازو کارها به سازو کارهای تهویه ای شش درت دارند.

\* حرکتی شده نوزاد سازو کارهای تازه  
 \* سازو کارهای ویژه مهره داران شش دار



شکل ۲۲- پمپ فشار مثبت در قورباغه

می دهد (شکل ۲۳). (ظرف پر از هوا)  
 شکل ۲۳- دستگاه تنفسی در پرندگان

ریه ها (مهره دار) = ریه ها (بی مهره دار)

۹ عدد - خارج شش  
 ۴ عدد - داخل شش  
 ۴ عدد ریه ها در ریه ها  
 ۵ عدد ریه ها در ریه ها

