







آنالیز: گماید، فستار، ثابت

* و آن گرایگرایت









$$\alpha = \frac{\Delta H}{\text{C-H}}$$

نحوه
C-H



$$b = \frac{\Delta H}{O-H} + \frac{\Delta H}{O-H}$$

نحوه
O-H



$$\chi = \frac{\Delta H}{C-H} + \frac{\Delta H}{O-H} + \frac{\Delta H}{O-H} + \frac{\Delta H}{O-H}$$

درپی غذای سالم (کنکور)

شامل :

- 1- نکات آموزشی
- 2- سوالات کنکور و آزمون‌های آزمایشی
- 3- منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی
- 4- سوالات تكمیلی




تهیه و تنظیم : پیمان خواجه‌ی مجد

بخش اول: گرما و دما

دانشمندان اجزای بنیادی جهان مادی را ماده و انرژی می‌دانند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که انرژی از راههای گوناگون با ماده ارتباط دارد. آنچنان که کاهش جرم خورشید به عنوان تنها منبع حیات‌بخش انرژی، تبدیل ماده به انرژی را تأیید می‌کند.

- غذا همواره نقش محوری در رشد و تدرستی درزندگی انسان داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیاکان ما بیشتر وقت خود را صرف تهیه وعده‌های غذایی می‌کردند، آنچنان که در طول روز اغلب در جستجوی غذا و جمع‌آوری دانه‌های خوراکی بودند.



نمودار داده شده میزان تولید و مصرف جهانی غلات را در دهه اخیر نشان می‌دهد:

لکته: پیشرفت دانش و فناوری موجب شده است که تولید فراوردهای کشاورزی و دامی افزایش یابد و غذا به روش صنعتی تولید شود. در تولید انبوه، به دلیل فساد مواد غذایی و دشواری نگهداری آن‌ها حفظ کیفیت و ارزش مواد غذایی اهمیت بسزایی دارد.

- برای تولید انبوه غذا به فعالیت‌های صنعتی گوناگون مانند تولید، حمل و نقل، نگهداری، فراوری و ... نیاز است، مجموعه حوزه‌هایی که صنایع غذایی نامیده می‌شوند. در این صنعت نیز همانند دیگر صنایع، منابع شیمیایی بسیاری، سطح وسیعی از زمین‌های باир و حجم عظیمی از آب‌های قابل استفاده در کشاورزی مصرف می‌شود. این نیازها تأیید می‌کند که یکی از مهم‌ترین و شاید سنگین‌ترین مسئولیت‌های هر دولت تأمین غذای افراد جامعه است. مسئولیتی که در گذشته با قطعی و جنگ غذا تهدید می‌شد و امروزه نیز چالشی نگران‌کننده است.

- سرانه مصرف ماده غذایی، مقدار میانگین مصرف آن را به ازای هر فرد در یک گستره زمانی معین نشان می‌دهد.
- لکته:** سرانه مصرف نان، برنج، شکر، نمک خوراکی و روغن در ایران بیشتر از میانگین جهانی است.
- لکته:** دیابت بزرگ‌سالان یکی از بیماری‌های شایع در ایران است که مصرف بی‌رویه نان، برنج و شکر می‌تواند دلیل آن باشد.



نکته: گوشت قرمز و ماهی افزون بیر پروتئین، محتوی انواع ویتامین و مواد معدنی است.

نکته: شیر و فراورده‌های آن منبع مهمی برای تأمین پروتئین و به ویژه کلسیم است. کارشناسان تغذیه بر مصرف مناسب آن‌ها برای پیشگیری و ترمیم یوکی استخوان تأکید دارند.

نکته: کارشناسان تغذیه بر مصرف حبوبات مانند نخود، لوبیا، عدس و ... در برنامه غذایی تأکید دارند، زیرا سرشار از مواد مغذی هستند.

- غذا مواد اولیه برای ساخت و رشد بخش‌های گوناگون بدن مانند سلول خونی، استخوان، پوست، مو، ماهیچه، آنژیم‌ها و ... را فراهم می‌کند. همه این فرایندها وابسته به انجام واکنش‌های شیمیایی هستند که هر یک آهنگ ویژه‌ای دارند، واکنش‌هایی که دمای بدن را نیز کنترل و تنظیم می‌کنند.

بررسی چند جملهٔ مهم

- ۱) مصرف غذا، انرژی مورد نیاز بدن برای حرکت ماهیچه‌ها، ارسال پیام‌های عصبی، جابه‌جایی یون‌ها و مولکول‌ها از دیواره هر یاخته می‌شود.

۲) افزایش نامتناسب برخی مولکول‌ها و یون‌ها در وعده‌های غذایی سبب افزایش وزن و دیگر بیماری‌ها خواهد شد.

۳) سرانه مصرف نان در جهان از سرانه مصرف سایر مواد غذایی بیشتر است.

۴) تولید و فراوری مواد غذایی در حیطه صنایع غذایی بوده ولی نگهداری و حمل نقل آن در حوزه صنایع غذایی نیست.

۵) گوشت قمز و ماهی، افزون بر و تغییر، محتوی اندام و تامین و مواد معدنی است.

ماسنی‌ها:

- (1) درست نادرست (در ایران سرانه مصرف نان، برنج، شکر، نمک و روغن بیشتر از متوسط جهانی است).

(2) درست نادرست (نگهداری و حمل و نقل هم در حوزه صنایع غذایی قرار دارد).

(3) نادرست (در ایران سرانه مصرف نان، برنج، شکر، نمک و روغن بیشتر از متوسط جهانی است).

(4) درست نادرست (5)

تست آموزشی

- | | |
|---------------------|--|
| (سنبش - فروردین ۹۷) | - مصرف بی رویه چند مورد از مواد غذایی زیر، در گسترش بیماری دیابت نقش دارد؟ |
| 4 (4 | • شکر |
| 3 (3 | • برنج |
| 2 (2 | • روغن |
| 5 (1 | • نمک خوراکی |
| | • سبزیجات |
| | • شیر |

پاسخ‌ها :

- ۱) گزنه ۲ (برنج ، شکم و نان) (الته نان در بین موارد نیست).

غذا، ماده و انرژی

بدن ما برای انجام فعالیت‌های ارادی و غیرارادی گوناگون به ماده و انرژی نیاز دارد. برای نمونه هنگامی که قند خون پایین باشد، می‌توان با خوردن سبب و یا نوشیدن شربت آبلیمو و عسل و هنگامی که بدنه دچار کمبود آهن باشد، می‌توان با خوردن اسفناج و عدسی بدنه را به حالت طبیعی بازگرداند. توجه کنید که ارزش مواد غذایی در تأمین ماده و انرژی یکسان نیست.

- 亨گام روزه‌داری به ویژه نزدیک افطار اغلب احساس گرسنگی و سرما می‌کنید. در این شرایط بدنه ما به ماده و انرژی نیاز دارد تا دمای خود را کنترل کند، پس از افطار احساس گرمای دلچسبی می‌کنید، زیرا انرژی مواد غذایی در حال آزاد شدن است.

- یکی از راه‌های آزاد شدن انرژی مواد، سوزاندن آن‌ها است. سوختهایی مانند گاز شهری، بنزین، الکل در زمان سوختن انرژی آزاد می‌کنند و این انرژی برای گرم کردن خانه، پخت و پز و به حرکت درآوردن خودروها مصرف می‌شود. همچنین مواد غذایی مانند ماکارونی و گردو نیز هنگام سوختن انرژی آزاد می‌کنند.

بررسی چند جمله مهم

- (1) کمبود آهن در بدنه را می‌توان با مصرف اسفناج و عدس جبران کرد.
 نادرست درست
- (2) از خوراکی‌هایی مثل سبب، خرما و شربت آبلیمو می‌توان برای جبران پایین آمدن قند خون استفاده کرد.
 نادرست درست
- (3) یکی از راه‌های مهم آزاد شدن انرژی مواد سوزاندن آن‌ها است.
 نادرست درست

پاسخ‌ها :

(1) درست (2) درست (3) درست

تست آموزشی

2- در مقایسه دو ماده غذایی «گردو» و «ماکارونی» کدام عبارت زیر درست است؟

- (1) انرژی حاصل از سوزاندن دو ماده مستقل از جرم ماده است.
(2) انرژی حاصل از سوزاندن مقدار برابری از دو ماده برابر است.
(3) فرایند گوارش هر دو ماده در بدنه، همانند هم از نظر تغییر دما می‌باشد.
(4) با سوزاندن هر مقدار گردو مقدار بیشتری انرژی نسبت به سوزاندن ماکارونی حاصل می‌شود.

پاسخ‌ها :

(2) گزینه (3) : در فرایند گوارش هر دو ماده، اگر چه انرژی حاصل می‌شود، اما این انرژی به دلیل تفاوت در انرژی پتانسیل دو ماده بوده و موجب تغییر دما نمی‌شود.

با افزایش مقدار هر دو ماده، انرژی حاصل از سوزاندن بیشتر می‌شود. (نادرستی گزینه 1)

به دلیل این‌که هر ماده غذایی انرژی معینی داشته و انرژی دو ماده متفاوت از هم است، پس با سوزاندن مقدار برابری از دو ماده، انرژی یکسانی حاصل نمی‌شود. (نادرستی گزینه 2)

در جرم برابر، انرژی حاصل از سوزاندن گردو بیشتر از ماکارونی است. (نادرستی گزینه 4)



مقایسه دما و گرما

دما : دما کمیتی است که میزان سردی و گرمی مواد را نشان می‌دهد، دما با میانگین انرژی جنبشی ذرات سازنده جسم رابطه مستقیم دارد. یکای رایج دما درجه سلسیوس ($^{\circ}\text{C}$) و در حالی که یکای دما در سیستم SI کلوین (K) است.

لکته : با این که ذرات سازنده یک ماده در سه حالت فیزیکی یکسان بوده و پیوسته در جنب و جوش هستند، اما میزان جنبش ذره‌ها متفاوت است. به طوری که جنبش نامنظم ذره‌ها در حالت گاز شدیدتر از مایع و آن‌هم شدیدتر از حالت جامد است. همچنین هر چه دما بالاتر باشد، میانگین انرژی جنبشی ذره‌های سازنده آن بیشتر است. به دیگر سخن دمای یک ماده معیاری برای توصیف میانگین تندری و میانگین انرژی جنبشی ذره‌های سازنده آن است.

انرژی گرمایی : مجموع انرژی جنبشی ذره‌های سازنده یک نمونه ماده هم‌ارز با انرژی گرمایی است، انرژی گرمایی تابع دو عامل است:

(آ) دما : اگر مقدار و جنس محتویات دو ظرف یکسان باشد، ظرفی که دمای بالاتری دارد، انرژی گرمایی بالاتری خواهد داشت.

(ب) مقدار : اگر دما و جنس محتویات دو ظرف یکسان باشد، ظرفی که مقدار ماده آن بیشتر باشد، انرژی گرمایی بالاتری خواهد داشت.

لکته : روغن و چربی از جمله ترکیب‌های آلی هستند که به دلیل تفاوت در ساختار، رفتارهای فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند. روغن دارای حالت فیزیکی مایع بوده اما چربی جامد است. از دیدگاه شیمیایی در ساختار روغن پیوندهای دوگانه بیشتری وجود دارد و واکنش پذیری بیشتری نیز دارد.

بررسی چند جمله مهم

(۱) دمای ذوب خوراکی‌های کاکائویی به دمای بدن نزدیک است.

(۲) بوی غذاهای گرم، آسانتر از غذاهای سرد به مشام می‌رسد.

(۳) مولکول‌های آب در حالت یخ، جنب و جوش و نظم بیشتری نسبت به حالت مایع دارند.

نظم : گاز < مایع < جامد

(۴) در شکل مقابل میانگین انرژی جنبشی ذرات در حالت A، در مقایسه با حالت B، بیشتر است.

(۵) یک ویژگی مشترک همه مواد با هر حالت فیزیکی، جنبش‌های منظم ذره‌های سازنده آن‌ها است.


نمک (NaCl)

(۶) شدت جنبش‌های مولکول‌های آب در 100 گرم آب 50°C با 10 گرم آب 50°C یکسان است.

(۷) جنبش‌های نامنظم ذره‌های سازنده یک جسم در دمای معین در سه حالت جامد، مایع و گاز یکسان است.

تست‌های آموزشی

3- هر یک از سامانه‌ها در شکل زیر محتوی یک نمونه گاز نجیب در دمای اتاق است. با توجه به آن، چه تعداد از موارد زیر صحیح هستند؟ (هر ذره معادل 0/01 مول از گاز نجیب مربوط است).



- اگر گازهای موجود در دو ظرف a و c یکسان بوده و میانگین انرژی جنبشی ذرات آن‌ها برابر باشد، نتیجه می‌گیریم که انرژی گرمایی دو سامانه باهم برابر است.

$$C > \alpha$$

- در ظرف‌های a و b به ترتیب گازهای آرگون و هلیوم می‌توانند قرار گرفته باشند. به عکس

- انرژی گرمایی سامانه a از b بیشتر است ولی میانگین انرژی جنبشی ذرات آن‌ها با یکدیگر برابر است.
- اگر تعداد ذرات موحد در سامانه a را در دمای ثابت دو برابر کنیم، میانگین انرژی جنبشی ذرات آن تغییر نمی‌کند.

4 (4)


3 (3)

2 (2)

1 (1)



شایع‌بینز



4- با توجه به شکل مقابل که مربوط به دو ظرف محتوی آب خالص می‌باشد، همه مطالب زیر درست هستند، به جز ... (نشانه پرتم-دی 98)

- میانگین تندی مولکول‌ها در دو ظرف A و B یکسان است.


- هر گاه آب موجود در ظرف A را به ظرف B اضافه کنیم، انرژی گرمایی و میانگین تندی مولکول‌ها در ظرف B افزایش می‌یابد.

- انرژی گرمایی آب در ظرف B از ظرف A بیشتر می‌باشد.

- پس از کاهش دمای آب موجود در ظرف B به اندازه ۵°C، انرژی گرمایی آن از ظرف A بیشتر است.

گرما و وزن یک جسم مقدار ثابت است و به حجم ساره بستگی ندارد.

5- اگر دو لیوان یکی دارای 100 گرم و دیگری دارای 300 گرم آب با دمای ثابت و یکسان 40°C داشته باشیم، چه تعداد از عبارت‌های زیر درباره آن‌ها درست است؟



خط فیزیکی
مقدار
 m_C

- میانگین تندی مولکول‌های آب در هر دو لیوان یکسان است.

- ظرفیت گرمایی محتویات هر دو لیوان باهم برابر است.

- گرمای ویژه محتویات لیوان (2) بیشتر از گرمای ویژه محتویات لیوان (1) است.

- برای رساندن دمای آب موجود در لیوان (1) به 70°C و رساندن دمای آب موجود در لیوان (2) به 50°C گرمای یکسانی نیاز داریم.

4 (4) 3 (3) 2 (2) 1 (1)

$$Q = m \cdot C \cdot \Delta \theta$$

$$\Rightarrow Q_1 = 100 \times C \times 30^{\circ}$$

$$\Rightarrow Q_2 = 300 \times C \times 10^{\circ}$$



اصل انتشار

$$Q = mc\Delta\theta$$

گرمای ویژه

جرم

(J)

ج

C

مایع < بین < بخار آب

ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه

ظرفیت گرمایی: مقدار گرمایی است که به یک جسم می‌دهیم تا دمای آن 1°C افزایش پیدا کند.گرمای ویژه: مقدار گرمایی است که به 1g از یک جسم می‌دهیم تا دمای آن 1°C افزایش پیدا کند.• گرما با نماد Q نشان داده می‌شود و یکای آن در SI ژول است. ($1\text{ J} = 1\text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2}$)• هنوز در برخی موارد از یکای کالری برای بیان میزان گرما استفاده می‌شود. ($1\text{ cal} = 4/18\text{ J}$)**لطفا:** ظرفیت گرمایی ویژه به حالت فیزیکی ماده بستگی دارد. در آب داریم:

تست‌های آموزشی

6- در یک شوفاژ، در هر دقیقه 10 کیلوگرم آب با دمای 30°C وارد و با دمای 45°C خارج می‌شود. در هر ساعت چند کیلوژول گرما توسط این شوفاژ به محیط خانه وارد می‌شود؟ (از هدر رفت گرما صرف نظر)

(سنمش (یاضی-اسفند 1400))

 $(c_{\text{H}_2\text{O}} = 4/2\text{ J.g}^{-1.\text{C}^{-1}}$ شود.)

28400(4)

32000(3)

34500(2)

37800(1)

$$Q = mc\Delta\theta = \frac{10 \times 10^3 \text{ g} \times 4,2 \times 10}{\text{برای دقیقه}} \times 45^{\circ} = 37800 \times 10^3 \text{ J}$$

هر ساعت ۳۷۸۰۰ کیلوژول

7- دو ظرف یکسان حاوی مقدار مساوی آب و روغن زیتون در دمای 25°C موجود است. اگر تخم مرغ در آب 75°C در مدت پنج دقیقه پخته شود، در همین مدت زمان در روغن زیتون در چه دمایی (بر حسب سانتیگراد) پخته خواهد شد؟ (گرمای ویژه روغن زیتون و آب بر حسب $\text{J.g}^{-1.\text{C}^{-1}}$ به ترتیب برابر 2 و گزینه دو) 4/2 می‌باشد).

100 (4)

80 (3)

130 (2)

105 (1)

$$Q_{آب} = Q_{زیتون}$$

$$\cancel{m} \times \cancel{10^3} \times \cancel{\Delta\theta} = \cancel{m} \times \cancel{10^3} \times (\theta_2 - 25)$$

$$100 = \theta_2 - 25 \Rightarrow \theta_2 = 125^{\circ}$$



$$m = 1,1 \times 2 = 2,2$$

$$m = d \cdot V = 1 \times 2,0 = 2,0 \text{ kg}$$

- ۸- ۲/۵ لیتر آب ($d = 1 \text{ kg L}^{-1}$) و ۲ لیتر اتیلن گلیکول ($d = 1/1 \text{ kg L}^{-1}$) با یکدیگر مخلوط شده و درون رادیاتور خودرو به کار رفته است. مقدار گرمای جذب شده برای افزایش دمای این محلول به اندازه 10°C چند کیلوژول است؟ (ظرفیت گرمایی ویژه آب و اتیلن گلیکول به ترتیب برابر $4/2$ و $2/4$ ژول بر گرم درجه سلسیوس است و ظرفیت گرمایی مواد در محلول تغییر نکرده است).

157/8 (4)

153 (3)

15/8 (2)

15/3 (1)

$$Q_{\text{آب}} = 2,0 \times 10 \times \frac{4}{2} \times 10 = 100 \times 10 = 1000 \text{ kJ}$$

$$Q_{\text{اتیلن گلیکول}} = 2,2 \times 10 \times \frac{2}{4} \times 10 = 55,0 \times 10 = 550 \text{ kJ}$$

$$\underline{\underline{1000 + 550 = 1550 \text{ kJ}}}$$

- ۹- اگر گرمای سوختن کامل یک مول متان برابر 890 kJ باشد، برای بالا بردن دمای یک ظرف آهنه با جرم ۵۲۰ گرم و دارای ۱۰۰۰ گرم آب به اندازه 50°C چند مول متان باید سوزانده شود؟ گرمای ویژه آهن و آب به ترتیب $0,15 \text{ J g}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ بر حسب سنجش (سنجه) $4/2$ ، $0/5$ می‌باشد.

0/75 (4)

0/45 (3)

0/25 (2)

0/15 (1)

$$Q_{\text{متان}} = 1000 \times 2,0 \times 50 = 20000 \text{ J} = 20 \text{ kJ}$$

$$Q_{\text{آهن}} = \frac{240}{0,15} \times \frac{1}{5} \times 50 = 12000 \text{ J} = 12 \text{ kJ}$$

$$\frac{\text{مول}}{\frac{20}{12} \text{ kJ}} \Rightarrow \chi = \frac{222}{190} \approx \frac{1}{2}$$

- ۱۰- با انجام یک آزمایش در یک گرماسنج دارای ۹۰۰ گرم آب، دمای آب به اندازه 2°C بالاتر می‌رود. اگر در شرایط یکسان از ۴۶۰ گرم اتانول با دمای 20°C به جای آب استفاده شود، دمای پایانی گرماسنج به چند درجه سلسیوس می-

(تمدی فاراه ۹۶)

 $(c_{\text{H}_2\text{O}} = 75, c_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 110 \text{ J mol}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}, O = 16, C = 12, H = 1 \text{ g mol}^{-1})$


33/6 (4)

28/6 (3)

26/8 (2)

24/2 (1)

$$Q_{\text{آنال}} = Q_{\text{اتانول}}$$



$$\frac{\chi_{\text{آهن}}}{\chi_{\text{اتانول}}} \times 10 \times 2 = \frac{1}{2} \times 10 \times (22 - 20)$$

$$10 = 10 \times 22 - 10 \times 20 \Rightarrow 10 = 200 - 200 \Rightarrow 10 = 200$$



قدر است؟ (چگالی آب را g.mL^{-1} در نظر بگیرید). 74/5^{\circ}\text{C}

$$Q_1 + Q_2 = 0 \Rightarrow Q_1 = -Q_2$$

$$\nabla \Theta_r - \nabla \phi = -r \nabla \Theta_r + r \nabla \phi \Rightarrow \nabla \Theta_r = r \nabla \phi$$

12- یک قطعه فلز کروم به جرم 100 گرم و دمای 55 درجه سانتی گراد را در 200 گرم آب با دمای 23/4 درجه سانتی گراد وارد می کنیم. اگر دمای نهایی آب تقریباً به 25 درجه سانتی گراد برسد، ظرفیت گرمایی ویژه کروم بر حسب $J \cdot g^{-1} \cdot {}^{\circ}C^{-1}$ کدام است؟ (ظرفیت گرمایی ویژه آب را $4/2 J \cdot g^{-1} \cdot {}^{\circ}C^{-1}$ در نظر بگیرید.) (قلم هپ)

0/233 (4) 3/58 (3) 0/897 (2)



$$Q_{\text{left}} = -Q_{\text{right}}$$

$$\cancel{2.0 \times 1.2 \times 1.4} = \cancel{-1.0} \times C_{Cr} \times (-\cancel{2.0})$$

$$C_G = 144\text{A}$$

سامانه و محیط

سامانه و محیط : بخشی از جهان که در مورد تغییرات انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد را سامانه می‌گویند و بخشی از جهان که سامانه را احاطه کرده را محیط می‌گویند.(بین سامانه و محیط مرزی تعریف می‌شود که ممکن است حقیقی یا



* دَلَانِتْ هَارِسْتَ دَالَيَاشْ مجازي باشد.


* هَلَّى گَرَادِه هَسْتَه.

$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$


* اَهْلَبْ دَلَانِتْ هَارِ تَجْزِيَه گَلَمْ

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

$2H_2O \rightarrow H_2 + O_2$



با نوشیدن شیر گرم در دمای حدود ۶۰°C، پس از ورود به بدن نخست مقداری انرژی به شکل گرما از دست می‌دهد تا با دمای بدن هم‌دما شود، اگر در این فرایند، شیر گرم را سامانه و بدن را محیط در نظر بگیریم با این توصیف در این فرایند با جاری شدن انرژی از سامانه به محیط، دمای سامانه کاهش می‌یابد. این ویژگی نشان می‌دهد $Q < 0$ بوده و با فرایندی گرماده سروکار داریم:



اما بخش عمده انرژی موجود در شیر هنگام فرایند گوارش و سوخت و ساز به بدن می‌رسد، فرایندهایی که با انجام واکنش‌های شیمیایی گوناگونی همراه است. به دیگر سخن انجام مجموعه این واکنش‌ها منجر به تولید انرژی و مواد اولیه مورد نیاز سوخت و ساز یاخته‌ها خواهد شد. نمودار انرژی وابسته به مجموعه این واکنش‌ها به صورت مقابل است: در این واکنش‌ها با این که دما ثابت است (37°C) اما باز هم میان سامانه و محیط پیرامون انرژی داد و ستد می‌شود.

بستنی یک خوراکی خنک و سرشار از مواد مغذی و انرژی‌زا است. فرایند هم‌دما شدن آن در بدن با جذب انرژی، در حالی که گوارش و سوخت و ساز آن با آزاد شدن انرژی همراه است.


تست‌های آموزشی

(سراسری تجربی 98)

سامانه محیط

13- چند مورد از مطالع زیر، درست است؟

- در واکنش‌های گرماده، انرژی از محیط به سامانه جریان می‌یابد.
- گرمای مبادله شده بین دو ماده، از رابطه $Q = mc\Delta\theta$ به دست می‌آید.
- در فرایند گوارش و سوخت و ساز شیر در بدن، با وجود ثابت بودن دما، $Q < 0$ است.
- در فرایند گرماده، فراورده‌ها در سطح انرژی بالاتر نسبت به واکنش‌دهنده‌ها قرار می‌گیرند.




1 (1)

1 (1)



یخچال صحرایی


محمد باه‌آبا، معلم مسلمان نیجریایی با طراحی و ساخت دستگاهی ساده و ارزان به مردم کشورش خدمتی ارزنده ارائه کرد. دستگاهی که همانند یک یخچال اما بدون نیاز به انرژی الکتریکی، غذا را خنک و برای مدت طولانی تری نگه می‌دارد. او برای ساخت این دستگاه، دو ظرف سفالی (ساخته شده از خاک رس) را درون یکدیگر قرار داد و فضای میان آن‌ها را با شن خیس پر کرد. درپوش این مجموعه پوششی نخی و مرتبط است که تهويه را به آسانی انجام می‌دهد، آب در بدنه سفالی ظرف به بیرون نفوذ کرده و به آرامی طبق رابطه زیر تبخیر می‌شود:



این معادله نشان می‌دهد که برای تبخیر یک مول آب $44/1$ کیلوژول گرما نیاز است. جذب گرما در این فرایند باعث افت دما شده و فضای درونی دستگاه همراه با محتویات آن را خنک می‌کند، شرایطی که برای سالم نگهداشتن دما به صورت طولانی‌تر مناسب است.

این دستگاه ساده و ارزان به سرعت در مقیاس صنعتی تولید و فرآگیر شد. شرکت رولکس کشور سوئیس به پاس خدمت بشردوستانه این معلم مبتکر هر دو سال یکبار دو قطعه از تولیدات قیمتی خود را به ایشان اهدا می‌کند.

بررسی چند جمله مهم



- نادرست
 - درست
-
- نادرست
 - درست
-
- نادرست
 - درست
-
- نادرست
 - درست

به آرامی
محتویات داخل

تست‌های آموزشی

(قلم‌چی)

14 - کدام گزینه در مورد یخچال صحرایی درست است؟

(1) یخچال صحرایی با وجود ساده و ارزان بودن، هنوز در مقیاس صنعتی تولید و فرآگیر نشده است.

(2) درپوش یخچال صحرایی، پوششی جیجی است که مبادله گرما را با سرعت بسیار کمی انجام می‌دهد.

(3) این دستگاه همانند یک یخچال اما بدون نیاز به انرژی الکتریکی، غذا را خنک و برای مدت طولانی تری نگه می‌دارد.

(4) مبتکر این دستگاه یک معلم مسلمان اهل آفریقای جنوبی به نام محمد باه‌آبا است.

نیتی




ترموشیمی (گرماسیمی)

می‌دانید که هر واکنش شیمیایی ممکن است با تغییر رنگ، تولید رسوب، آزاد شدن گاز و ایجاد نور و صدا همراه باشد اما یک ویژگی بنیادی در همه آن‌ها داد و ستد گرما با محیط پیرامون است. از این‌رو هر واکنش شیمیایی ممکن است گرماده یا گرمایی باشد، بررسی مطالعه این ویژگی در واکنش‌ها منجر به پیدایش ترموشیمی (گرماسیمی) شد.

ترموشیمی شاخه‌ای از علم شیمی است که به بررسی کمی و کیفی گرمایی واکنش‌های شیمیایی، تغییر آن و تأثیری که بر حالت ماده دارد، می‌پردازد.

- مواد غذایی پس از گوارش، انرژی لازم برای سوخت و ساز یاخته‌ها را در بدن تأمین می‌کنند.
- سوختن سوخت‌ها، انرژی لازم برای حمل و نقل و نیز گرمایش محیط‌های گوناگون را فراهم می‌کند.
- زغال کک، واکنش‌دهنده‌ای رایج در استخراج آهن بوده که تأمین‌کننده انرژی لازم برای انجام این واکنش نیز است.



بررسی سطح انرژی مواد در تغییرات فیزیکی:

* آلوترودی که سطح انرژی پاسخ‌زن دارد پایه‌تراد است. (O_2 پایه‌تر)

بررسی سطح انرژی در آلوتروپ‌های اکسیژن و کربن:

تبديل O_2 به O_3 گرایگر تبدیل O_2 به O_4 گرداده

- منبع انرژی در بدن غذا است، منبعی که انرژی آن پس از انجام واکنش‌های شیمیایی گوناگون به بدن می‌رسد. بدیهی است که هر یک از این واکنش‌ها می‌تواند گرماده یا گرمایی باشد، نمودار رویه‌رو مربوط به اکسایش گلوکز برای تولید انرژی در بدن است. جالب اینکه با وجود تولید انرژی در واکنش اکسایش گلوکز دمای بدن تغییر محسوسی نمی‌کند، زیرا دمای مواد اولیه پیش از آغاز واکنش با دمای فراورده‌ها پس از پایان واکنش برابر است.

بررسی چند جمله مهم

(1) زغال کک، واکنش‌دهنده‌ای رایج در استخراج آهن است که انرژی لازم برای انجام این واکنش را نیز فراهم می‌کند.

- نادرست درست

(2) با وجود تولید انرژی در واکنش اکسایش گلوکز، دمای بدن تغییر چندانی نمی‌کند و عملًا واکنش در دمای ثابت انجام می‌شود.

- نادرست درست

(3) گرمای آزاد شده در یک واکنش گرماده که در دمای ثابت انجام می‌شود، ناشی از تفاوت انرژی گرمایی واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها است.

- نادرست درست


(4) گرافیت پایدارتر از الماس است، زیرا در فرایند سوختن آن انرژی بیشتری آزاد می‌شود.

- نادرست درست



تست‌های آموزشی

15- کدام تغییر حالت فیزیکی مواد خالص، بر اثر تغییر انرژی، مطابق شکل زیر، به ترتیب از راست به چپ به حالت‌های میان، فرازش، چگالش و انجماد مربوط است؟ (تمدن ۱۴۰۱)




- b , c , e , f (1)
c , d , f , b (2)
d , f , a , e (3)
d , a , f , b (4)

(یافی ۹۸)

16- با توجه به واکنش $N_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g) - 183 \text{ kJ}$ ، کدام مورد درست است؟

- (۱) بسطح انرژی فراورده از واکنش‌دهنده‌ها پایین‌تر است.
~~گرانجول~~
~~گرانجور~~
~~گرانجور~~
~~سامانه به سمت~~
~~سامانه به سمت~~
- (۲) با تولید هر مول آمونیاک، ۱۸۳ کیلوژول انرژی تولید می‌شود.
~~کلی~~
~~کلی~~
~~کلی~~
- (۳) واکنش در انرژی است و با انجام آن در یک ظرف، دمای آن پایین می‌آید.
~~کلی~~
~~کلی~~
~~کلی~~
- (۴) با انجام واکنش در دمای ثابت، انرژی باید از محیط به سامانه جریان یابد.



17- توضیحات ارائه شده در مورد چه تعداد از واکنش‌های زیر درست است؟

• $CO_2(g) \rightarrow CO_2(s)$: فرایندی گرماده است و علامت ΔH آن منفی است.

• $NO_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$: با انجام این واکنش سامانه پررنگ‌تر می‌شود.

• $2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$: فرایندی گرانجور است و علامت ΔH در آن مثبت است.

• $C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(l)$: با وجود تولید انرژی، دمای بدن تغییر محسوسی نمی‌کند.

4 (4)




3 (3)

2 (2)

1 (1)

18- با فرض اینکه گرمای لازم برای تبخیر یک مول آب دو برابر گرمای تبخیر مولی آمونیاک باشد، ترتیب

مقدار گرمای حاصل از واکنش‌های (آ) تا (ت) در کدام گزینه به درستی ارائه شده است؟ (قلمپی)



(4) ت < ب < آ < پ

(3) پ < ب < آ < ت

(2) پ < ب < ت < آ



- همه مواد پیرامون ما در دما و فشار اتاق، آنتالپی معینی دارند و هر سامانه در دما و فشار ثابت آنتالپی معینی دارند.
- با انجام واکنش شیمیایی گرمگیر در یک سامانه، مواد با محتوی انرژی (آنتالپی) کمتر به موادی با انرژی (آنتالپی) بیشتر تبدیل می‌شوند. (عکس این موضوع در واکنش‌های گرماده صادق است).

تست‌های آموزشی

(سراسری تهری فارج ۱۴۰۱ کشور ۹۸)



19- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟


- با سرد شدن هوا، شدت رنگ گاز آلاینده NO_2 در شهرها، کاهش می‌یابد.
- در تبدیل $CO_2(s) \rightarrow CO_2(g)$ ، میانگین تنی و انرژی جنبشی ذرات، ثابت است.
- علامت ΔH در واکنش شیمیایی انجام شده در فتوسنتز (در گیاهان سبز)، مثبت است.
- تغییر نوع آلوتروپ در واکنش‌هایی که عنصرهای خالص تولید یا مصرف می‌شوند، تأثیری بر ΔH واکنش ندارد.

4 (4) 3 (3) 2 (2) 1 (1)



20- نمودار زیر به اکسایش گلوکز در بدن مربوط است، با توجه به آن، چند مورد از

(سراسری تهری فارج ۱۴۰۱)




مطالب زیر درست است؟

- آنتالپی فراورده‌ها از آنتالپی واکنش‌دهنده‌ها بزرگتر است.
- محتوای انرژی و پایداری مولکول آب از گلوکز کمتر است.
- در انجام این فرایند، انرژی از سامانه به محیط انتقال می‌یابد.
- نمودار فرایند هم‌دمای شدن شیر با دمای 60°C در بدن مانند نمودار روبرو است.
- دمای مواد واکنش‌دهنده پیش از آغاز واکنش در مواد فراورده پس از انجام واکنش به تقریب برابر است.

4) یک 3) دو 2) سه 1) چهار




گرماگر




انرژی لازم برای شکستن پیوندهای اشتراکی موجود در یک مول مولکول دو اتمی گازی و تبدیل آن به دو مول اتم گازی را آنتالپی پیوند می‌گویند. مثلاً شواهد تجربی نشان می‌دهد که آنتالپی پیوند حدود 436 kJ.mol^{-1} است.


در مولکول‌های چند اتمی به کار بردن میانگین آنتالپی پیوند مناسب‌تر است.



(2) طول پیوند:



(3) قطبیت پیوند:



بررسی چند جمله مهم

(1) مقایسه انرژی پیوند هالوژنهای دوره‌های سوم تا پنجم جدول دوره‌ای به صورت $\text{I}_2 < \text{Br}_2 < \text{Cl}_2$ می‌باشد.

- نادرست
- نادرست
- نادرست
- درست



- درست
- درست
- درست

(2) در مولکول‌های NH_3 , HCl , H_2O به کار بردن میانگین آنتالپی پیوند مناسب‌تر است. درست.

CH₄

- 21- اگر میانگین آنتالپی پیوند $\text{C}-\text{H}$ در مولکول متان برابر 412 kJ.mol^{-1} در نظر گرفته شود، ΔH کدام واکنش برابر (سراسری یا ضمیمه 87)

مولکول



امم کان: سیز

+1648 kJ است



(قلمچه)

? کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد میانگین آنتالپی پیوندها درست است؟

$$\Delta H_{(\text{C}=\text{C})} = 2\Delta H_{(\text{C}-\text{C})} \quad (2)$$

$$\Delta H_{(\text{C}=\text{C})} < 2\Delta H_{(\text{C}-\text{C})} \quad (4)$$

$$\Delta H_{(\text{C}\equiv\text{C})} = \Delta H_{(\text{C}=\text{C})} + \Delta H_{(\text{C}-\text{C})} \quad (1)$$

$$\Delta H_{(\text{C}\equiv\text{C})} > 3\Delta H_{(\text{C}-\text{C})} \quad (3)$$

گروه‌های عاملی

ادویه‌ها نقش جالبی در تمدن و تاریخ ملت‌ها دارند، به‌طوری‌که بو و مزه لذت‌بخش غذاهای بومی در هر جای جهان، اغلب به دلیل افزودن ادویه‌های ویژه‌ای به آن‌ها است. ادویه‌ها دارای دو ویژگی مهم هستند:

(آ) به مواد غذایی رنگ، بو و مزه خوشایندی می‌دهند.

(ب) مصرف دارویی مانند جلوگیری از گرسنگی، افزایش سوخت و ساز، جلوگیری از التهاب، پیشگیری، بهبود و گاهی رفع سرطان.

یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که چنین خواصی در ادویه‌ها به طور عمده وابسته به ترکیب‌های آلی موجود در آن‌هاست، ترکیب‌هایی که در ساختار خود افزون بر اتم‌های هیدروژن و کربن، اتم‌های اکسیژن، گاهی نیتروژن و گوگرد نیز دارند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که تفاوت در خواص ادویه‌ها به دلیل تفاوت در ساختار این مواد آلی است.

گروه عاملی: آرایش منظمی از اتم‌ها که به مولکول آلی دارای آن خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی می‌بخشد.

گروه عاملی آلدهید:

گروه عاملی کتون:

تمرین ۱: چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین آلدهیدها و کتون‌ها وجود دارد؟

گروه عاملی اتر:

گروه عاملی الكل (هیدروکسیل):




تمرين 2: در مورد مولکول بنزالدهید به سوالات زیر پاسخ دهيد :

- (آ) فرمول ساختاري آن را رسم کنيد.
- (ب) فرمول مولکولي آن را تعين کنيد.
- (پ) تعداد پيوند دوگانه آن را تعين کنيد.
- (ت) بنزالدهید در وجود دارد.

تمرين 3: در مورد مولکول 2-هپتانون به سوالات زير پاسخ دهيد :


- (آ) فرمول ساختاري آن را رسم کنيد.
- (ب) فرمول مولکولي آن را تعين کنيد.
- (پ) اين ماده در وجود دارد.

تمرين 4: تركيب زير ماده آلي موجود در گشنيز را نشان مي دهد، بر اين اساس پاسخ دهيد :




- (آ) فرمول مولکولي آن را مشخص کنيد.
- (ب) گروه عاملی آن چه نام دارد؟

تمرين 5: تركيب زير ماده آلي موجود در رازيانه را نشان مي دهد، بر اين اساس پاسخ دهيد :




- (آ) فرمول مولکولي آن را مشخص کنيد.
- (ب) گروه عاملی آن چه نام دارد؟

تمرين 6: ساختار تركيبهای آلي موجود در دارچين و زردچوبه در زير داده شده است، بر اين اساس پاسخ دهيد.



- (آ) کدام ماده در دارچين و کدام ماده در زردچوبه وجود دارد؟
- (ب) گروه عاملی هر ماده را تعين کنيد.
- (پ) فرمول مولکولي هر تركيب را تعين کنيد.

تمرين 7: با توجه به ساختارهای داده شده به سوالات زير پاسخ دهيد :




- (آ) فرمول مولکولي هر تركيب را تعين کنيد.
- (ب) اين دو تركيب چه نسبتی باهم دارند؟
- (پ) نقطه جوش کدام يك بالاتر است؟

ت) آيا محتواي انرژي اين دو ماده يكسان است؟ چرا؟

تمرين 8 : کلسترونول یکی از مواد آلی موجود در غذاهای جانوری است که مقدار اضافی آن در دیواره رگ‌ها رسوب می‌کند، فرایندی که منجر به گرفتگی رگ‌ها و سکته می‌شود. با توجه به ساختار آن پاسخ دهید.

(آ) چرا شیمی‌دانها آن را یک الکل سیرنشده می‌دانند؟




(ب) در شرایط یکسان کدام پیوند اشتراکی یگانه در ساختار آن آسان‌تر شکسته می‌شود؟
چرا؟

تست‌های آموزشی

(یافتن فارغ (1401)

23- چند مورد از مطالب زیر دربارهٔ ترکیبی با فرمول «پیوند-خط» داده شده درست است؟



$$(C = 12, H = 1, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$

• سه گروه عاملی متفاوت دارد.

• جرم مولی آن برابر 178 گرم است.

• شمار اتم‌های کربن و هیدروژن مولکول آن برابر است.

• شمار اتم‌های هیدروژن مولکول آن با شمار اتم‌های هیدروژن مولکول پنتن برابر است.

4 (یک)


3 (دو)

2 (سه)

1 (چهار)

(سنجهش)

24- دربارهٔ ترکیبی با فرمول « نقطه-خط » رو به رو، چند مورد از مطالب زیر، درست‌اند؟



• گروه عاملی به کار رفته در آن، در ماده موجود در دارچین هم وجود دارد.

• فرمول مولکولی آن، $C_5H_{10}O$ است.

• مولکول آن دارای گروه عاملی هیدروکسیل است.

• در ساختار مولکول آن، 30 جفت الکترون پیوندی شرکت دارند.

2 (2)

1 (1)


4 (4)

3 (3)

(سراسری تجربی (1401)

25- کدام مطلب دربارهٔ ترکیبی با ساختار زیر، نادرست است؟

(1) دارای سه نوع گروه عاملی متفاوت است.



(2) مولکول‌های آن می‌توانند با یکدیگر یا با مولکول‌های آب پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.

(3) شمار اتم‌های هیدروژن مولکول آن، دو برابر شمار اتم‌های هیدروژن در مولکول بوتان است.


(4) شمار اتم‌های هیدروکسیل مولکول آن با شمار اتم‌های کربن مولکول اتیلن گلیکول برابر است.



مسایل ترکیبی استوکیومتری و آنتالپی

تست‌های آموزشی

26- اگر ΔH واکنش تهیه گازآب در صنعت برابر 134 kJ باشد، برای تهیه یک کیلوگرم هیدروژن در این فرایند چند مگاژول گرمای باید صرف شود؟ ($H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$) (سراسری فارج تمدنی ۹۴)



33/5 (4)

67 (3)

134 (2)

268 (1)

27- اگر آنتالپی واکنش $2\text{KClO}_3\text{(s)} \rightarrow 2\text{KCl(s)} + 3\text{O}_2\text{(g)}$ -90 kJ باشد، با گرمای آزاد شده از تجزیه 49 گرم پتابسیم کلرات، چند گرم جیوه از تجزیه جیوه (II) اکسید به دست می‌آید؟ ($\Delta H = +180 \text{ kJ}$) (سراسری ریاضی فارج ۹۳)

$$(Hg = 200, K = 39, Cl = 35/5, O = 16 : \text{g.mol}^{-1})$$

80 (4)

60 (3)

40 (2)

20 (1)

28- اگر ΔH واکنش $\text{Fe(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4\text{(s)} + \text{H}_2\text{(g)}$ -150 kJ باشد، گرمای آزاد شده ضمن تشکیل چند لیتر گاز هیدروژن در شرایطی که حجم مولی گازها برابر 25 لیتر است، دمای 300 گرم آب را به اندازه 40°C بالا می‌برد؟ ظرفیت گرمایی ویژه آب برابر $4 \text{ J.g}^{-1}.{}^\circ\text{C}^{-1}$ است. (سراسری ریاضی فارج از کشور ۹۴)

8/4 (4)

12/2 (3)

16/8 (2)

33/6 (1)



ارزش سوختی

مقدار انرژی آزاد شده به ازای سوختن یک گرم ماده را ارزش سوختی می‌گویند. ارزش سوختی کربوهیدرات و پروتئین برابر 17 kJ.g^{-1} و ارزش سوختی چربی برابر 38 kJ.g^{-1} است.

- کربوهیدرات‌ها در بدن به گلوکز شکسته شده و گلوکز حاصل از آن‌ها در خون حل می‌شود. خون این ماده را به یاخته‌ها می‌رساند. (گلوکز قند خون است). این ماده هنگام اکسایش در یاخته‌ها، انرژی تولید می‌کند، از این رو به آسانی انرژی مورد نیاز یاخته‌ها را تأمین می‌کند.

- میزان انرژی مورد نیاز بدن هر فرد به وزن و سن و میزان فعالیت‌های روزانه او بستگی دارد. هر مقدار اضافی از مواد و انرژی دریافتی از مواد غذایی به طور عمده به شکل چربی در بدن ذخیره شده و باعث چاقی می‌شود.

- برای تهیه هر غذای گرم به انرژی نیاز است که این انرژی به طور عمده از سوختن سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود. یکی از این سوخت‌ها متان است که بخش عمده گاز شهری را تشکیل می‌دهد.

لکته: ارزش سوختی مواد خوراکی مختلف به صورت زیر مقایسه می‌شود :

«بادام زمینی > پنیر > شکلات > نان > تخمر مرغ > شیر»

بررسی چند جمله مهم

(1) ارزش سوختی اتان از اتانول بیشتر است، اما در جرم برابر از دو ماده اتانول کربن دی‌اکسید بیشتری تولید می‌کند.

درست ○
نادرست ○

(2) ارزش سوختی اتان بیشتر از پروپان و کمتر از متان است.

(3) با توجه به معادله $2\text{C}_3\text{H}_6(\text{g}) + 9\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2058 \text{ kJ}$ ارزش سوختی پروپن برابر 49 کیلوژول بر مول است. ($\text{C} = 12, \text{H} = 1, \text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1}$)

تست‌های آموزشی

29- چند گرم از ماده‌ای که شامل 20% پروتئین، 16% چربی و 14% کربوهیدرات است باید بسوزد تا 593 کیلوکالری انرژی به بدن بدهد؟ ارزش سوختی پروتئین و کربوهیدرات 17 kJ.g^{-1} و ارزش سوختی چربی 38 kJ.g^{-1} است. یک کالری را معادل 4 ژول در نظر بگیرید و از انرژی تولید شده توسط باقی مواد صرف نظر کنید.
(قله‌چی)

186 (4)	200 (3)	0/2 (2)	207 (1)
---------	---------	---------	---------



آنالپی سوختن

انرژی آزاد شده از سوختن یک مول ماده در شرایط استاندارد را آنالپی سوختن می‌گویند.

تمرين 1: در هر مورد معادله موازنه شدهای بنویسید که تغییر آنالپی در آن معادل آنالپی سوختن ماده مورد نظر باشد.

(آ) گاز بوتان :

(ب) متانول مایع :

عوامل مؤثر بر آنالپی سوختن :

(۱) تعداد کربن :

(ب) خانواده ترکیب آلی :

بررسی چند جمله مهم

۱) آنالپی سوختن اتان بیشتر از اتن ولی کمتر از پروپن است.

۲) آنالپی سوختن مقدار گرمای آزاد شده به هنگام سوختن یک مول از یک ماده در هوا است.

نادرست ○ درست ○

۳) آنالپی سوختن از هیدروکربن سیرشده و خالص در اکسیژن سوخته و $17/6$ گرم کربن دی اکسید و $10/8$ گرم آب مایع و 312 کیلوژول انرژی تولید می‌کند. آنالپی استاندارد سوختن این ترکیب چند کیلوژول بر مول است؟

(سراسری تمدنی ۹۶)

مسئله‌های آموزشی

۳۰- نمونه‌ای از هیدروکربن سیرشده و خالص در اکسیژن سوخته و $17/6$ گرم کربن دی اکسید و $10/8$ گرم آب مایع و 312 کیلوژول انرژی تولید می‌کند. آنالپی استاندارد سوختن این ترکیب چند کیلوژول بر مول است؟

$(C = 12, H = 1, O = 16 : g.mol^{-1})$

-1560 (4) -1248 (3) -1040 (2) -780 (1)

آنالپی سوختن $(kJ.mol^{-1})$	ارزش سوختی $(kJ.g^{-1})$	ماده آلی
-890	55/5	$CH_4(g)$
-1560	52/+	$C_2H_6(g)$
b	a	$C_3H_8(g)$

۳۱- به جای a و b در جدول زیر، به ترتیب از راست به چپ کدام عددها را می‌توان قرار داد؟ $(C = 12, H = 1 : g.mol^{-1})$ (سراسری یافته ۱۴۰۱)

-2230 , 47/2 (1)

-2230 , 50/7 (2)


-4580 , 47/2 (3)

-4580 , 50/7 (4)




قانون هس

اگر یک واکنش از جمع چند واکنش دیگر به دست آید، تغییر آنالی آن از جمع جبری ΔH ها به دست می‌آید. از قانون هس برای تعیین ΔH واکنش‌هایی استفاده می‌شود که در شرایط عادی انجام نمی‌شوند و یا انجام آن‌ها پسیار سخت است.



پررسی سوختن گرافیت :



بررسی تشکیل آمونیاک :

واکنش‌هایی که به طور تجربی انجام نمی‌شوند یا انجام آنها بسیار سخت است. (طبق کتاب درسی)

تست‌های آموزشی

(تہجی 1401)

32- یا توجه به نمودار زیر چند مورد از مطالب زیر درست است؟ (همه گونه‌ها گازی شکل هستند).

- به جای X می‌توان $2B_2$ را قرار داد.

- به یک واکنش سه مرحله‌ای مربوط است.

- محتوای انرژی A_2 از A_2B_4 کمتر و از AB_3 بیشتر است.

- علامت ΔH واکنش تشکیل A_2B_4 و AB_3 مخالف یکدیگر است.


- مولکول A_2B_4 از AB_3 پایدارتر است زیرا پیوندهای بیشتری دارد.

4w (2)

دو (1)



(4) پنج

3) چهار



-33- با توجه به واکنش‌های زیر و مقدار آنها، ΔH° واکنش $3\text{Fe(s)} + 4\text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g})$ کدام است؟


(یافی فاچ ۹۰ و ۹۱ و فاچ تجربی ۹۱)



$$-812/5 (4) \quad +646 (3) \quad -752/5 (2) \quad +744 (1)$$

-34- با توجه به واکنش‌های زیر، ΔH واکنش: $\text{P}_4\text{O}_{10}(\text{s}) + 6\text{PCl}_5(\text{l}) \rightarrow 10\text{POCl}_3(\text{l})$ برابر چند کیلوژول است و اگر در این

واکنش $266/5$ کیلوژول گرما آزاد شود، چند مول POCl_3 تشکیل می‌شود؟ (سراسری یافی فاچ ۱۰ کشور ۹۳)



$$4, -344 (4) \quad 4, -533 (3) \quad 5, -344 (2) \quad 5, -533 (1)$$

-35- با توجه به واکنش‌های زیر، گرمای مبادله شده برای واکنش $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO(g)} \rightarrow 2\text{Fe(s)} + 3\text{CO}_2(\text{g})$ ، برابر چند

کیلوژول است؟ (سراسری تجربی ۹۲)





$$+20/5 (4) \quad +103/5 (3) \quad -92/5 (2) \quad -70/5 (1)$$



(سراسری ریاضی ۱۴۰۱)

- ۳۶- با توجه به واکنش‌های زیر :





بر پایه قانون هس تبدیل $\frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g})$ به $\text{Cl}^-(\text{aq})$ گرماده است یا گرمگیر و آن برابر چند کیلوژول است؟

$$-176/5 \quad +167/5 \quad +176/5 \quad -167/5 \quad (4) \text{ گرمگیر} , (3) \text{ گرماده} , (2) \text{ گرمگیر} , (1) \text{ گرماده}$$

- ۳۷- با توجه به واکنش‌های زیر، ΔH واکنش $\text{O}_2(\text{g}) + \text{P}_4(\text{s}) + 2\text{SO}_2(\text{g}) + 8\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SOCl}_2(\text{l}) + 4\text{POCl}_3(\text{l})$ برابر چند کیلوژول است؟

(سراسری ریاضی ۹۸)




$$-2532 (4) \quad -2445 (3) \quad -2352 (2) \quad -2235 (1)$$

متان : متان، ساده‌ترین هیدروکربن و نخستین عضو آلکان‌ها است. این ماده قسمت عمده گاز طبیعی را تشکیل می‌دهد و از تجزیه گیاهان به وسیله باکتری‌های بی‌هوایی در زیر آب تولید می‌شود. این ماده اولین بار از سطح مرداب جمع‌آوری شد، از این رو به گاز مرداب معروف است.




تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از انرژی پیوند

برای تعیین آنتالپی واکنش از رابطه زیر استفاده می‌شود:



تست‌های آموزشی

(سنجهش)


38- آنتالپی سوختن CH_3OH ، بر پایه واکنش زیر، چند کیلوژول بر مول است؟

O-H	O=O	C=O	C-O	C-H	نوع پیوند
463	495	800	380	415	(kJ.mol ⁻¹)
-1243 (4)	-621/5 (3)	-1250 (2)	-964 (1)		

39- تفاوت گرمای سوختن کامل 0/5 مول گاز بوتان با گرمای سوختن کامل 0/5 مول گاز اتان، در شرایط یکسان، برابر چند کیلوژول است؟ آنتالپی پیوندهای O-H ، C=O ، C-C ، O=O و C-H با یکای کیلوژول بر مول به ترتیب برابر 414 ، 463 و 800 ، 495 ، 348

(سراسری تجربی ۱۴۰۱)

1251 (4) 1215 (3) 670/5 (2) 607/5 (1)

40- با توجه به آنتالپی پیوندها و واکنش زیر، کدام هیدروکربن زیر پایدارتر است و ΔH این واکنش، چند کیلوژول است؟ (۹۸) (۵)

-40 ، ۱

-40 ، ۲


+40 ، ۳

+40 ، ۴



روش مستقیم اندازه‌گیری گرمای واکنش

در روش مستقیم تعیین آنتالپی واکنش از دستگاهی به نام گرماسنج استفاده می‌شود. شکل زیر یک گرماسنج لیوانی را نشان می‌دهد، این دستگاه دارای ویژگی‌های زیر است:



- (1) اندازه‌گیری گرمای واکنش به روش مستقیم
- (2) از دو لیوان یک بار مصرف (از جنس پلی استیرن) که عایق گرما هستند و مجهز به درپوشی از یونالیت که در آن همزن و دماسنجد تعییه شده است، تشکیل شده است.
- (3) عملکرد در فشار ثابت
- (4) اندازه‌گیری آنالپی واکنش (با توجه به تفییر دمای آب یا محلول به کار رفته)

نکته: برای اندازه‌گیری دقیق گرمای سوختن مواد از نوع دیگری از گرماسنج به نام گرماسنج بمی استفاده می‌شود. در این گرماسنج, حجم ثابت است.

تست‌های آموزشی

- 41 - 3/04 گرم از یک ماده‌ی آلی با جرم مولی 152 گرم بر مول در یک گرماسنج بمی می‌سوزد و دمای گرماسنج و آنچه در آن است، از $25/7^{\circ}\text{C}$ به $29/7^{\circ}\text{C}$ می‌رسد. در صورتی که گرمای سوختن این ماده برابر 590 کیلوژول بر مول باشد، ظرفیت گرمایی کلی این گرماسنج برابر چند $\text{J}^{\circ}\text{C}^{-1}$ است؟ (جرم گرماسنج و آنچه در آن جای دارد را برابر 1000 گرم در نظر بگیرید).

2950 (4)


2650 (3)

2/95 (2)

2/65 (1)

(سراسری ریاضی فارغ ۱۴۰۱)


- 42 - با توجه به معادله‌های گراماشیمیابی زیر:



- (1) انحلال مخلوطی به نسبت مولی برابر از این دو ماده گرماده است.
- (2) از انحلال $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ برای گرم کردن محل آسیب‌دیده بدن، استفاده می‌شود.
- (3) از انحلال $0/2$ مول $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ در آب، $2/5$ کیلوژول انرژی گرمایی با محیط تبادل می‌شود.
- (4) روند تغییر انحلال‌پذیری $\text{CaCl}_2(\text{s})$ در آب نسبت به دما مشابه انحلال‌پذیری شمار زیادی از نمک‌های دیگر است.



- 43- در واکنش زیر، به ازای مصرف کامل $10/5$ گرم از واکنشدهنده آلی، $66/75$ کیلوژول گرما آزاد می‌شود. بر این اساس و با توجه به مفاهیم علمی مرتبط، کدام مطلب نادرست است؟ (سنجهش)



- (1) کاتالیزگر به کار رفته در واکنش، برخلاف هر یک از مواد شرکت‌کننده جزو ترکیب‌های یونی است.
- (2) مجموع آنتالپی پیوند‌ها در فراورده، از مجموع آنتالپی پیوند‌ها در واکنش‌دهنده‌ها بزرگ‌تر است.
- (3) نام فراورده واکنش «1, 1-دی‌کلرو اتان» است.
- (4) برابر با $a = 178$ است.

