

# دایره

نمره در امتحان نهایی


هشت نمره

تعداد تست

یک تست


پیش نیاز

زوايا سال هفتم  
فصل ۱ هندسه دهم: همروزی های مثلث



فصل یک هندسه یازدهم

زوايا  
روابط طولی  
محاطی - محیطی



دایره  
که میان هندسه های دایره از کدام قسم است بنا صلاحت دارد


شعاع بیش از رادیوس  
 $OI < R$

هر دایره صفحه را به سه بخش افزایش می کند:


۱- داخل دایره: مجموعه نقاطی که فاصله‌ی آن‌ها از دایره کمتر از شعاع دایره است.

۲- روی دایره: مجموعه نقاطی که فاصله‌ی آن‌ها از دایره برابر شعاع دایره است.


۳- خارج دایره: مجموعه نقاطی که فاصله‌ی آن‌ها از دایره بیشتر از شعاع دایره است.




حالاتی که خط و دایره



$OH > R$   
برونی مخورد




$OH = R$   
لیمک مغور



$OH < R$   
بینک مغور

### انواع زاویه در دایره

$$\hat{O}_1 = \hat{A}$$




$$\hat{O} = \hat{AB}$$

رأس = مرکز راس


$$OA = OB = r$$

اصلاً تقع ها

از ازه برابر با کل ممتد




زاویه مرکزی



رأس = ابی محیط راس

$$CA, CB$$

ورها




از ازه کل دو برابر زاویه

$$\hat{A} = \frac{\hat{AB}}{r}$$

رأس = محیط راس

اصلاً بی وتر


بیخط معادل



زاویه محاطی


$$360 - 220 = 140$$

$$\text{نحوه اثبات: } \hat{M} = \frac{\hat{CB} + \hat{AD}}{2}$$



زاویه داخلی


$$M = \frac{BB' - AA'}{r}$$




$$\hat{M} = \frac{\hat{BD} - \hat{AC}}{2}$$



زاویه خارجی




آموزش را با دبیران برنده ایران تجربه کنید



$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{l}{\pi r^2} = \frac{S}{\pi r^2} = \frac{\theta}{\pi}$$

اینها (بشتیرنون برا برای محاسبه مساحت است)

$$\hat{A} = \frac{\widehat{BC}}{\pi}$$




$$\hat{O}_1 = \widehat{BC} \quad * \\ \hat{O}_1 = \hat{A} + \hat{B}$$


$$OA = OB = r \quad \xrightarrow{\text{مساحت ایجاد}} \hat{A} = \hat{B}$$

$$O = 2\hat{A} \quad * \quad 2A = \widehat{BC} \Rightarrow \hat{A} = \frac{\widehat{BC}}{\pi}$$

مرکز زوین را در نظر مانند



$$\hat{A}_1 = \frac{\widehat{BD}}{\pi} \quad \rightarrow \quad A : \hat{A}_1, \hat{A}_2 = \frac{\widehat{BD} + \widehat{DC}}{\pi} = \frac{\widehat{BC}}{\pi}$$




$$\hat{A}_1, \hat{A}_2 \\ \hat{A} = \frac{\widehat{BD}}{\pi}$$

$$\hat{A}_2 = \frac{\widehat{DC}}{\pi}$$

اینها همچنان

$$\begin{aligned} A_1 &= A - A_2 = \frac{\widehat{BD} - \widehat{DC}}{\pi} \\ &= \frac{\widehat{BD} - \widehat{DC}}{\pi} = \frac{\widehat{BC}}{\pi} \end{aligned}$$

$$\hat{A} = \frac{\widehat{BA}}{\pi}$$



خط مماس دو نقطه کار برش عور است

$$\hat{A} = \frac{\widehat{ACB}}{\pi}$$


$$\hat{A}_r = \frac{\widehat{BD}}{\pi}$$

$$A_1 = 90^\circ - \hat{A}_r = \frac{90^\circ}{\pi} - \frac{\widehat{BD}}{\pi} = \frac{90^\circ - \widehat{BD}}{\pi}$$

$$\hat{AD} = 180^\circ$$

$$\begin{aligned} \hat{AD} &= 180^\circ \\ A_1 &= \frac{\widehat{ACB}}{\pi} \end{aligned}$$

اینها می‌شوند زوین حداکثری از خود دورتر می‌شوند (دو کل ممکن است)




$$\hat{M}_1 = \frac{\widehat{AB}' + \widehat{A'B}}{\pi}$$

$$\hat{M}_1 = \hat{A} + \hat{A}'$$

$$\hat{A} = \frac{\widehat{A'B}}{\pi}$$

$$\hat{A}' = \frac{\widehat{AB}'}{\pi}$$



$$\hat{A} = \frac{\widehat{AA} + \widehat{BB}}{\pi}$$

$$\hat{M}_1 = \frac{\widehat{AB}'}{\pi} + \frac{\widehat{A'B}}{\pi} = \frac{\widehat{A'B} + \widehat{B'A}}{\pi}$$

(۱)  $\hat{M} = \frac{\hat{AA}' - \hat{BB}'}{r}$

$$\text{ویرایش اینجا در حالت از محور دو وتر را که تفاصل آنها با میانه است}$$

$$MB\hat{A}' \text{ و } MB\hat{B}' = \hat{M} + \hat{A}' \Rightarrow \hat{M} = \hat{B}' - \hat{A}'$$

$$\text{ویرایش } B\hat{A}' = \frac{\hat{AA}'}{r} \quad \text{(۱)}$$

$$\text{ویرایش } A' = \frac{\hat{BB}'}{r} \quad \text{(۲)}$$

$$\hat{M} = \frac{\hat{AA}' - \hat{BB}'}{r}$$
  

(۲)  $\frac{\hat{T}A - \hat{T}B}{r} = M$

$$BMT \text{ و } B\hat{B}' = \hat{T} + \hat{M} \rightarrow \hat{M} = \hat{B}' - \hat{T}$$

$$\text{ویرایش } \frac{\hat{AT}}{r} - \frac{\hat{TB}}{r}$$

$$\hat{M} = \frac{\hat{AT} - \hat{TB}}{r}$$
  

(۳)  $\hat{M} = \frac{\hat{T}B\hat{T}' - \hat{T}A\hat{T}'}{r}$

$$T' \text{ و } T\hat{B}' = \hat{T} + \hat{M}$$

$$\hat{M} = \hat{T}' - \hat{T}$$

$$\text{ویرایش } \frac{\hat{TB}\hat{T}'}{r} - \frac{\hat{T}A\hat{T}'}{r}$$

$$\hat{M} = \frac{\hat{TB}\hat{T}'}{r} - \frac{\hat{T}A\hat{T}'}{r}$$
  


(۴)

$$\begin{cases} y - n = r\alpha \\ y + n = r\beta \end{cases}$$

$$y = 180 + \alpha$$

$$n = 180 - \alpha$$

$$ry = 180 + rd$$




$$2n + 3n + 4n = 120^\circ$$

زايد گایلی

$$9n = 120^\circ \Rightarrow n = 13.3^\circ$$

در شکل زیر، BD قطر دایره است. اگر  $O$  مرکز دایره باشد،  $\hat{C}OD = 10\alpha + 20^\circ$ ،  $\hat{A} = 7\alpha - 10^\circ$  و  $\hat{B} = 10\alpha + 20^\circ$



$$10\alpha + 20^\circ = 14\alpha - 20^\circ$$


$$\alpha = 10^\circ$$

$$10 = \alpha$$

$$* 10\alpha + 20^\circ = 2(7\alpha - 10^\circ)$$

دکتر رها مسیح

$$H_1 = H_2 = 90^\circ \text{ میز} \quad \text{و زیر}$$



قضایای مهم

نمایش: نسبت کننده.


$$AH = HB \quad \text{* حمل}$$

$$AD = DB \quad \text{و زیر}$$

موقعیت میانه سطح در دایره نهاده

$$\begin{aligned} H_1 = H_2 = 90^\circ & \quad \text{و زیر} \\ \Rightarrow OA = OB = r & \quad \text{و زیر} \\ \Rightarrow OH = OH & \quad \text{منبع} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangle OAH \cong \triangle OBH & \quad \text{برهه} \\ \Rightarrow AH = HB & \quad \text{برهه} \\ \Rightarrow O_1 = O_2 \quad \Rightarrow AD = DB & \quad \text{برهه} \end{aligned}$$



$$AH = HB \quad \text{فرض}$$


$$AE = EB \quad \text{حمل}$$

$$\begin{aligned} H_1 = H_2 = 90^\circ & \quad \text{و زیر} \\ \Rightarrow OH = OH & \quad \text{و زیر} \\ \Rightarrow OA = OB = r & \quad \text{و زیر} \\ \Rightarrow \triangle OAH \cong \triangle OBH & \quad \text{برهه} \\ \Rightarrow O_1 = O_2 \quad \Rightarrow AE = EB & \quad \text{برهه} \end{aligned}$$

$$H_1 = H_2 = 90^\circ \quad \text{فرض}$$



$$\begin{aligned} AB \neq CD & \quad \text{فرض} \\ AB \neq CD & \quad \text{فرض} \\ AB \neq CD & \quad \text{فرض} \end{aligned}$$



$$AC = BD \quad \text{حمل}$$


$$AB \parallel CD / BC \quad \text{خط} \rightarrow \hat{A}\hat{B}\hat{C} = \hat{B}\hat{C}\hat{D} \quad \text{خط} \rightarrow \frac{\hat{A}\hat{C}}{Y} = \frac{\hat{B}\hat{D}}{Y}$$

$$AC = BD \quad \leftarrow$$

$$\begin{aligned} AC = BD & \quad \text{فرض} \\ \hat{B} = \hat{C} & \quad \text{خط} \end{aligned}$$

$$AB \parallel CD \quad \text{حمل}$$

$$AB \parallel CD \quad \text{حمل خط موازی}$$



$$OH = OH' \quad \text{فرض}$$

$$AB = A'B' \quad \text{حمل}$$

$$OB = OB' \quad \text{فرض}$$

$$OB = OH + BH \quad \text{شق}$$

$$OB' = OH' + B'H' \quad \text{شق}$$

$$BH = B'H' \quad \text{شق}$$

$$AB = A'B' \quad \text{شق}$$

$$OB = OH + HB \quad \text{شق}$$

$$OB' = OH' + HB' \quad \text{شق}$$

$$OB = OB \quad \text{شق}$$

$$OH + BH = OH + B'H' \quad \Delta$$

$$AB < A'B' \quad \text{حمل}$$

$$\begin{aligned} OH = OH' & \quad \text{و زیر} \\ H = H' = 90^\circ & \quad \text{و زیر} \\ OB = OB' & \quad \text{و زیر} \\ OB = OH + HB & \quad \text{شق} \\ OB' = OH' + HB' & \quad \text{شق} \\ OB = OB & \quad \text{و زیر} \\ OH + HB = OH + HB' & \quad \Delta \end{aligned}$$

$$AB = A'B' \quad \leftarrow PBH \cdot PH'$$

$$OB = OH + HB \quad \text{شق}$$

$$OB = OH + HB' \quad \text{شق}$$

$$OB = OB \quad \text{و زیر}$$

$$OH + HB = OH + HB' \quad \Delta$$

$$AB < A'B' \quad \text{شق}$$


$$OH < OH' \quad \text{شق}$$

$$AB < A'B' \quad \text{شق}$$

$$OH < OH' \quad \text{شق}$$

آموزش را با دبیران برنده ایران تجربه کنید

۳ در شکل رو به رو  $AC \parallel DE$ ،  $AB \parallel DE$  مماس بر دایره و  $\angle AED = 110^\circ$  باشد، در این صورت اندازه زاویه  $\hat{BAC}$  کدام است؟ (قطر دایره است.)




زاویه  $\hat{BAC}$  کدام است؟ (قطر دایره است.)

- $35^\circ$  (۱)
- $70^\circ$  (۲)
- $40^\circ$  (۳)
- $45^\circ$  (۴)

نصف کامل همچنین = خطی

$$\text{زاویه } \hat{BAC} = \frac{\widehat{BA}}{r} = \frac{70}{2} = 35^\circ$$

۴ در شکل مقابل، O مرکز دایره و  $\angle A = 65^\circ$  است. اندازه زاویه  $\hat{O}_1$  کدام است؟



$$\text{زاویه } \hat{A} = \frac{\widehat{TB}}{r}$$


$$65^\circ = \frac{\widehat{TB}}{r} \rightarrow \widehat{TB} = 130^\circ$$

- $65^\circ$  (۱)
- $60^\circ$  (۲)
- $50^\circ$  (۳)
- $45^\circ$  (۴)

دکتر رها مسیح

$$C = \frac{d+b}{2} = \frac{240}{2} = 120^\circ$$

در شکل رو به رو اضلاع زوایای A و B بر دایره مرسوم مماس هستند. در این صورت اندازه زاویه C کدام است؟



$$\angle A = a + d + c - b$$

$$140^\circ = a + d + c - b$$

$$100^\circ = a + b + c - d$$

$$140^\circ = 2a + 2c$$


$$120^\circ = a + c$$

100° (۱)

120° (۲)

80° (۳)

140° (۴)







$$a + b + c + d = 360^\circ$$

۱۲۰

$$a + d = 240^\circ$$

۶ دایره  $C(O, r)$  و خط  $\ell$  به فاصله  $3a+1$  از مرکز آن مفروض است. اگر خط و دایره هیچ نقطه تقاطعی نداشته باشند،


مقدار a کدام گزینه می‌تواند باشد؟



$$3a+1 > r$$

$$3a > r \rightarrow a > \frac{r}{3}$$

۷ در دایره  $C(O, r)$ ، وترهای PQ و RS با هم برابر بوده و یکدیگر را در نقطه T قطع کرده‌اند. اگر  $\angle RSP = 100^\circ$  باشد، اندازه زاویه OTR کدام است؟





$$\text{راحتی} = \frac{110^\circ + 100^\circ}{2} = \frac{210^\circ}{2} = 105^\circ$$

$$RS = PQ \Rightarrow RS = PQ$$


$$\overarc{RQ} + \overarc{QS} = \overarc{PS} + \overarc{RS}$$

$$110^\circ + 110^\circ + 100^\circ = 320^\circ$$

$$* 110^\circ + 110^\circ = 220^\circ \Rightarrow m = 110^\circ$$



در شکل زیر، نقطه D محل تقاطع نیمسازهای دو زاویه B و C است. اگر  $\hat{BDC} = 100^\circ$ ، آن‌گاه کمان BC چند درجه است؟



$$\hat{BDC} : \beta + \alpha + 100^\circ = 180^\circ$$


$$\beta + \alpha = 80^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{A} = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$

$$\widehat{BC} = \hat{A} = 80^\circ$$

- ۲۰ (۱)
- ۸۰ (۲)
- ۶۰ (۳)
- ۴۰ (۴)

۹ در شکل مقابل مثلث OBC متساوی‌الاضلاع است. حاصل  $\alpha + \beta$  کدام است؟ (O مرکز دایره)




$$180^\circ + \alpha + 40^\circ + \beta + 40^\circ = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta = 30^\circ$$

- ۱۰ (۱)
- ۲۰ (۲)
- ۳۰ (۳) ✓
- ۴۰ (۴)

۱۰ در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ C کدام است؟



$$130^\circ + 140^\circ = 270^\circ$$

$$360^\circ - 270^\circ = 90^\circ$$


- ۷۰° (۱)
- ۶۰° (۲)
- ۶۵° (۳)
- ۴۵° (۴) ✓

دو دایره

۱۱ دایره‌ی  $(O, r)$  و نقطه‌ی  $M$  به فاصله‌ی ۱ از مرکز دایره مفروض است. چند وتر داخل دایره می‌توان رسم کرد که طول آن باشد

واز  $M$  بگذرد؟

۱۱) بی‌شمار  
کوئاتین و ترمیلن سے رجوع در فرم



$$m+1 = \sqrt{15} \rightarrow m = \sqrt{15} - 1$$

دو وتر را بین  
ماصله‌ها هم بایز

دو وتر را بین

ماصله‌ها هم بایز



۱۲ مطابق شکل مقابل، دو وتر  $AB$  و  $CD$  بر هم عمودند. اندازه‌ی شعاع این دایره چقدر است؟

$$\sqrt{2}$$

$$5$$


$$\sqrt{2}$$

$$6$$

$$4$$

ابن سينا  
ستھانک

مربع متن



۱۳ مطابق شکل دو دایره‌ی هم‌مرکز به شعاع‌های ۲ و ۴ مفروض‌اند. از نقطه‌ی  $A$  دو مماس بر دو دایره

رسم شده است. تفاضل مربعات طول این دو مماس چقدر است؟

$$12(2)$$

$$20(4)$$

$$AT^2 - AT'^2$$


$$10(1)$$

$$16(3)$$

$$\begin{aligned} &= r^2 + AT^2 = OA^2 \\ &= r^2 + AT'^2 = OA^2 \\ &\underline{\underline{16 - 4 = AT^2 - AT'^2}} \end{aligned}$$

## هندسه یازدهم

دکتر رها مسیح  
روان طبی درست  
نمای از اندیشه



$$AH^2 = HB \times HC$$

$$AB^2 = BH \times BC$$

$$AC^2 = HC \times BC$$

$$AH \times BC = AB \times AC = TS$$

در نیم دایرهٔ شکل مقابل مقابلهٔ  $MT$  بر نیم دایرهٔ مماس باشد، طول پاره خط  $AM = 1$ .  $AB = 3$  و  $AC = 2$ . اگر  $MH$  چقدر است؟

۱/۵ (۱)

۱/۴ (۲)




۱/۶ (۳)

$$y = 2 \times 210$$

$$\frac{1}{2} \times 210 = \frac{210}{2} = y = \frac{210}{2} = 105$$

$$m^2 = 210 - 105 = (210 - 105)(210 + 105) \rightarrow m = 2$$



در شکل مقابل  $AB$  قطر دایره و  $O$  مرکز آن است. اندازهٔ زاویهٔ  $COD$  کدام است؟

۱۵۰° (۱)

۱۳۰° (۲)

۱۶۰° (۳)


۱۴۰° (۴)

$$\text{مکانی } \hat{COD} = \lambda \alpha = \lambda \times 2.$$

$$4\alpha + 4m + 4m = 360.$$

$$14m = 360.$$

$$m = 20.$$



در شکل مقابل اگر  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ ، کمان  $ANB$  چه کسری از محیط دایره است؟


$\frac{1}{4}$  (۱)

$\frac{1}{6}$  (۲)


$\frac{1}{3}$  (۳)

$\frac{1}{5}$  (۴)

$$ds = \alpha n$$




در شکل مقابل وتر  $AB$  بر قطر  $CD$  عمود است. ثابت کنید قطر  $CD$  و کمان  $AB$  را نصف می‌کند. خرداد ۱۴۰۳



$$1/5 \text{ (حکم)} \quad AH = HB / \widehat{AD} = \widehat{DB}$$

$$\begin{aligned} OH &= \text{متر} \\ OA &= OB = r \\ H_1 &= H_2 = 9^\circ \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{چون} \\ \widehat{OAH} \cong \widehat{OHB} \rightarrow AH = HB \\ \widehat{O}_1 = \widehat{O}_2 \xrightarrow{\text{چون}} \widehat{AD} = \widehat{DB} \end{array} \right.$$

۱۷ دایره  $C(O, r)$  مفروض است. اگر  $\hat{A} = (3x - 35)^\circ$  و  $\hat{B} = (2x + 10)^\circ$  کدام است؟



$$\frac{\alpha}{360^\circ} = \frac{l}{2\pi r^2} = \frac{S}{\pi r^2}$$

$$4x + 10 = 360 - 10$$

$$10 = 360$$

$$10 = 360$$

$$4x + 10 = 2 \times 10 + 10 = \alpha$$


$$\frac{5\pi}{3} \quad (\checkmark)$$

$$2\pi \quad (2)$$

$$\frac{8\pi}{3} \quad (3)$$

$$\frac{10\pi}{3} \quad (4)$$

۱۸ در شکل مقابل،  $CI$  قطر دایره و  $CA \parallel ON$ . اگر  $\widehat{AC} = 40^\circ$  باشد، آنگاه اندازه زاویه  $CNO$  کدام است؟ ( $O$  مرکز دایره است).



$$140^\circ = 4\alpha$$

$$\frac{140}{4} = \alpha$$

$$35^\circ = \frac{10}{2} = \alpha$$



$$27/5^\circ \quad (1)$$

$$30^\circ \quad (2)$$

$$35^\circ \quad (\checkmark)$$

$$22/5^\circ \quad (4)$$

۱۹ مطابق شکل زیر، در دایره به مرکز  $O$  و شعاع ۵ واحد، دو وتر موازی  $AB = 8$  و  $CD = 6$  در طرفین مرکز دایره رسم شده‌اند. مساحت ذوزنقه  $ABCD$  کدام است؟



$$S = \frac{(a+b) \times h}{2} = 29$$



روزگار زن و بودجه

۵۶ (۱)

۴۹ (✓)

۴۲ (۳)


۳۵ (۴)



۲۰ نقطه  $P$  درون دایره است. بزرگترین و کوچکترین وتر گذرنده از  $P$  چه هستند؟

جودنوارد  $2r >$  طول دتر  
و بر بزرگتر  $2r =$  طول دتر  
درتر  $2r >$  طول دتر  
پادتر  $2r =$  طول دتر  
و تر  $<$  طول دتر

۲۱ زاویه  $\widehat{M}$  را به دست آورید.




$$\frac{x+y}{2} = 80^\circ \rightarrow x+y = 160^\circ$$


$$\frac{x-y}{2} = 40^\circ \rightarrow x-y = 80^\circ$$

$$2x = 240^\circ \rightarrow x = 120^\circ$$

۲۲ زاویه  $O$  را به دست آورید.

رسانید:






۲۳ نشان دهید نقاط A، B و C روی خط راست هستند.



$$\begin{aligned} \text{گایلی دوچرخه } \hat{A}_1 &= \frac{\widehat{BM}}{r} = 90^\circ \\ \text{گایلی دوچرخه } \hat{A}_2 &= \frac{\widehat{CM}}{r} = 90^\circ \end{aligned} \quad \left. \right\} \rightarrow A_1 + A_2 = 180^\circ \quad \begin{matrix} \text{رادیوس} \\ \text{راست} \end{matrix} \rightarrow A, B, C \quad \begin{matrix} \text{دوچرخه} \\ \text{سترن} \end{matrix}$$



۲۴ BX || MA. زاویه  $\alpha$  را به دست آورید.


لکن های محض بین دو خط موازی برابر

$$BX \parallel MA \rightarrow \widehat{BA} = \widehat{BM}$$

$$\text{گایلی } \hat{C} = \frac{\widehat{BA}}{r} \rightarrow \widehat{BA} = 40^\circ$$


$$\text{گایلی } \hat{B}_1 = \frac{\widehat{AC}}{r} \Rightarrow \widehat{AC} = 90^\circ$$

$$\text{دانلی } \alpha = \frac{\widehat{AC} + \widehat{BM}}{r} = \frac{90^\circ + 40^\circ}{r} = \alpha^\circ$$



۲۵ مماس بر دایره هستند و  $AB = AC$ . زاویه  $\hat{A}$  را به دست آورید.

$$\text{گایلی } \hat{A} = \frac{\widehat{BC}}{r} = \frac{100^\circ}{r} = 40^\circ$$



$$M = \frac{\beta - \gamma}{r}$$

$$\text{حرجی } M = \frac{\widehat{CAB} - \widehat{BC}}{r} = 100^\circ$$


$$\alpha + \beta = 140^\circ$$

$$\widehat{CAB} - \widehat{BC} = 100^\circ$$

$$\frac{\widehat{CAB} + \widehat{BC}}{2} = 140^\circ \quad \widehat{CAB} = 280^\circ$$

$$\widehat{BC} = 80^\circ$$

در شکل رو به رو، نیم دایره ای به قطر  $AB$  رسم شده است. اگر  $AD = DE$  و  $BC = CD$  . اندازه زاویه  $A$  چند درجه است.



است؟

$24^\circ$  (۱)

$30^\circ$  (۲) ✓

$36^\circ$  (۳) ✓

$42^\circ$  (۴)

در شکل رو به رو،  $AB$  قطر دایره است،  $PD$  بر دایره مماس است و  $\widehat{C} = 110^\circ$  . اندازه زاویه  $P$  چند درجه است؟

$$P = \frac{\widehat{BD} - \widehat{AD}}{2} = \frac{120 - 40}{2} = 40^\circ$$


۲۷

$50^\circ$  (۱) ✓

$60^\circ$  (۲)

$45^\circ$  (۳)

$55^\circ$  (۴)



۲۸


$15^\circ$  (۱)

$20^\circ$  (۲) ✓

$25^\circ$  (۳)

$30^\circ$  (۴)

در شکل رو به رو،  $CD$  بر دایره کوچک مماس است. اگر  $\widehat{BEC} = 140^\circ$ ، آنگاه اندازه زاویه  $\widehat{BEC}$  چند درجه است؟



۲۹


$80^\circ$  (۱)

$100^\circ$  (۲) ✓

$40^\circ$  (۳)

$50^\circ$  (۴)

در شکل رو به رو،  $O$  محل تلاقی ارتفاع های مثلث  $ABC$  است. زاویه  $\widehat{AOD}$  برابر کدام است؟ (سراسری ریاضی - ۹۲)




۳۰

$\widehat{OBC}$  (۱)

$\widehat{CAD}$  (۲)

$\widehat{OAC}$  (۳)

$\widehat{ADO}$  (۴)




۶

### دکتر رها مسیح




**۳۱** در مثلث ABC، داریم  $\hat{B} = 50^\circ$  و  $\hat{C} = 60^\circ$ . نیمساز داخلی زاویه A و عمودمنصف ضلع BC در نقطه M متقاطع‌اند.




**۳۲** در مثلث متساوی الساقین (AB = AC)ABC، مرکز دایره‌ای است که در نقطه B بر ضلع AB مماس است. امتداد BC این دایره را در نقطه D قطع کرده است. مثلث OCD چگونه است؟




(سراسri ریاضی - ۹۰) **۱** زوایای متساوی مم  
**۲** قائم الزاویه و متساوی الساقین  
**۳** غیرمشخص  
**۴** متساوی الساقین  
**۵** زوایای هم




**۳۳** در شکل مقابل، ضلع مریع برابر ۲ واحد است، فاصله وسط کمان AB از تریک تریک رأس مریع چقدر است؟




**۳۴** در شکل مقابل، اگر  $\widehat{AE} = \widehat{CD}$  و  $\widehat{CD} = 3$ ،  $BC = 8$ ،  $AB = 6$ ، آن‌گاه اندازه AM کدام است؟



**۳۵** در مربعی به ضلع ۲ واحد، دایره‌ای به مرکز یک رأس آن و شعاع  $2/\sqrt{5}$  واحد، دو ضلع مریع را قطع می‌کند. فاصله نزدیک‌ترین رأس مریع تا نقطه تقاطع، کدام است؟




**۳۶** مریع ABCD به ضلع ۴ واحد، مفروض است. شعاع دایره گذرا بر روی رأس A و B و مماس بر ضلع CD کدام است؟



### دکتر رها مسیح

سیستم میکرو ۳۹۷۰۷۲۴۳  
نرم افزاری برای آنالیز و تحلیل  
رسانه داری با مدل های مکانیکی  
آنالیزی مکانیکی مهندسی



$$AM \cdot BM = CM \cdot DM \quad \rightarrow \quad \frac{AM}{CM} = \frac{DM}{BM} \leftarrow \overset{\hat{A}}{AMD} \leftarrow \overset{\hat{B}}{BMC}$$

$$\begin{aligned} M_1 &= M_2 \\ \hat{A} &= \hat{C} = \frac{\widehat{BD}}{r} \end{aligned}$$


j:

$$\triangle AMD \sim \triangle BMC$$


جبر نهایی

$$\frac{MP}{MB} = \frac{AD}{CB} = \frac{AM}{CM}$$

$$AM \times MB = CM \times MD$$



$$\text{مکانیکی} \quad \text{لوله} = \frac{1}{2\pi r^2} \alpha = \frac{\pi r^2 \alpha}{2\pi r^2} = \frac{\alpha}{360^\circ} \quad S = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ}$$



$$AM \cdot BM = CM \cdot DM$$

$$\frac{AM}{CM} = \frac{DM}{BM} \quad \overset{\hat{A}}{ADM} \quad \overset{\hat{B}}{BMC}$$

$$\begin{aligned} \hat{M} &= \hat{M} \\ \hat{B} &= \hat{D} = \frac{\widehat{AC}}{r} \end{aligned}$$

j:


$$\triangle ADM \sim \triangle BMC$$

$$MC \times MD = BM \times AM$$

$$\frac{MC}{AM} = \frac{BC}{AD} = \frac{BM}{MD}$$

از اینرو، هر سه این قضایا دارای طرح کلی یکسانی می باشند:

$$(vertex to circle) \cdot (vertex to circle) = (vertex to circle) \cdot (vertex to circle)$$



نقشه دایره

$$MT \times MT = MA \times MB$$

$$MT^2 = MA \times MB \quad \text{خط مماس و دایره}$$

$$\frac{MT}{MB} = \frac{MA}{MT} \rightsquigarrow \frac{MT}{MA} = \frac{MB}{MT}$$

میان دورطاجم  
ای ربعه اوی و ک  
صلی


$$\left. \begin{array}{l} \text{متر} \\ \hat{\angle} T = \hat{\angle} A \\ \hat{\angle} B = \hat{\angle} A \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \hat{\angle} T = \hat{\angle} B \\ \hat{\angle} T = \hat{\angle} B \end{array} \right\} \rightarrow \hat{\angle} T = \hat{\angle} B$$

مداد تعمیس


$$\triangle ATM \sim \triangle BTM \rightsquigarrow$$

$$\frac{AT}{TB} = \frac{AM}{MB} = \frac{MT}{BT}$$

$$MT = AM \cdot MB$$




خط مماس بر دایره



دکتر رها مسیح

نطاولن = نست ۳۵ - ۴۱  
+ صفحه ۲۳ جزو  
+ اثبات مینیز عدو معرفت  
+ تحریر دری کلیل



$$(x-1)x = (x-\alpha)(x+\alpha)$$

$$x^2 - x\alpha = x^2 + x\alpha - 1\alpha \\ 1\alpha = 2x\alpha \rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

در شکل مقابل  $x$  برابر است با:

۵ ①

۱۰ ②

۸ ③

گزینه های ۱، ۲ و ۳


در شکل مقابل شعاع دایره ۶ و قطر ۴ می باشد، طول مماس  $PT$  کدام است؟

۱ ④

۱۴ ⑤

$5\sqrt{2}$  ⑥

$4\sqrt{3}$  ①



$$PA \times PB = PT^2$$


$$4 \times 14 = PT^2$$

$$2 \times 7 = PT \\ PT = 7$$


در شکل مقابل مقدار  $y$  کدام است؟

۶ ①

۸ ③



✓



۴۰ در شکل،  $AT$  مماس و کمان های  $\widehat{BC} = \widehat{CT} = 2\widehat{BT}$ . زاویه  $A$  چند درجه است؟

$$72^\circ \quad \textcircled{P}$$

$$144^\circ \quad \textcircled{F}$$

$$18^\circ \quad \textcircled{1}$$

$$36^\circ \quad \textcircled{W}$$


$$\alpha = \frac{r_n - n}{2} = \frac{n}{2} = \frac{72}{2} = 36$$

$$4n + 2n + n = 360.$$

$$7n = 360.$$

$$n = \frac{360}{7} = 51$$

✓



۴۱ در شکل مقابل  $T$  و  $T'$  نقاط تماس هستند. اگر  $MT = \frac{1}{3}MT'$  باشد، حاصل  $\frac{MA \cdot MB}{MC \cdot MD} = \frac{MT'^2}{MT^2}$  کدام است؟

$$\frac{1}{9} \quad \textcircled{F}$$


$$\frac{MT'^2}{MT^2} = \frac{(MT')^2}{(\frac{1}{3}MT')^2} = \frac{\frac{1}{1}MT'}{\frac{1}{9}MT'} = \frac{9}{1}$$

$$4 \quad \textcircled{1}$$

$$9 \quad \textcircled{W}$$

$$MA \times MB = MT'^2$$


$$MC \times MD = MT^2$$



میان مشترک = خطی است که بر دو دایره میان است

میان منځ را خالی = خطی است که بر دو دایره میان است


و دو دایره در دو طرف خط را را دارد



میان منځ خارجی = خطی که بر دو دایره میان است و هر دایره در سمت خط را را دارد

(۱) از  $O$  نزدیکی  $R-R'$  رسم کنیم


(۲) از  $O'$  نزدیکی  $d - (R-R')$  رسم کنیم  
(دایره با قطر  $d$  داشته باشد)



(۳) از  $O$  نزدیکی  $T$  را فتح کنید  
دایره اولیه را در  $T$  میان میان میان

(۴) از  $T$  میان میان میان را رسم کنیم

$$OO' = (R+R') + TT'$$



$$TT' = \sqrt{d^2 - (R+R')^2}$$


(۱) دایره ای نزدیکی  $R+R'$  و میان رسم کنیم

(۲) از  $O'$  نزدیکی  $OH$  را رسم کنیم (دایره با دایره ای نزدیکی  $H$  داشته باشد)

(۳) میان  $OH$  را رسم نزدیکی  $O$  و میان  $O$  را رسم نزدیکی  $H$  داشته باشد

(۴) از  $T$  میان  $OH$  را رسم کنیم

فاصله‌ی دو مرکز همان فاصله‌ی دو نقطه است که اگر  $A(x_A, y_A)$  و  $B(x_B, y_B)$  باشد، از رابطه‌ی



$$AB' = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$


زیر به دست می‌آید:

$$OO' = d = \sqrt{(x_0 - x_0')^2 + (y_0 - y_0')^2}$$


$$\text{قضیه } TT' = \sqrt{d^2 - (R-R')^2}$$

$$TT' = \sqrt{d^2 - (R+R')^2}$$


۱ سان خارج ۲ سان دافع  
۳ سان منتهی




۱ سان خارج ۲ سان دافع  
۳ سان منتهی




۱ سان خارج ۲ سان دافع  
۳ سان منتهی



۱ سان خارجی سازی  
X



X



X

$$R+R' < OO'$$

$$OO' = R+R'$$

$$R-R' < OO' < R+R'$$

$$|R-R'| = OO'$$

$$OO' < |R-R'|$$

$$OO' = 0$$

«متخارج»:

«مماس خارج»:

«متقطع»:

«مماس داخل»:

«متداخل»:

«هم مرکز»:

۴۲ اگر دو دایره را به مراکز  $O(2, -3)$  و  $O'(1, 4)$  داشته باشیم، شعاع دایره‌ی اول ۲ و شعاع دایره‌ی

$$OO' = \sqrt{(2-1)^2 + (4+3)^2} = \sqrt{50} = \sqrt{50}$$

$$R+R' = 2+3 = 5$$

$$|R-R'| = |3-2| = 1$$


$$\sqrt{50} > 5$$

$$OO' > R+R' \rightarrow \text{متخارج}$$

دوام

دو دایره  $C'$  و  $C(O, r)$  مفروضند. خط قاطع  $d$  که در دایره  $C$  وتری به طول  $30^\circ$  به وجود می‌آورد، در دایره  $C'$  وتری با کدام طول پدیده می‌آورد؟

۱۴) ۴      ۱۰) ۳      ۱۲) ۶      ۱۵) ۱




$$17^\circ - 15^\circ = 2^\circ \rightarrow (17 - 15)(17 + 15) = 2^2$$

$$4 \times 19 = 2^2 \rightarrow r = 2 \times 4$$

$$r = 8$$

دو دایره‌ی  $C_1$  و  $C_2$  به شعاع ۵ مماس خارجند. چند خط می‌توان رسم کرد که بر دایره‌ی  $C_1$  مماس باشد و در دایره‌ی  $C_2$  وتری به طول ۶ جدا کند؟



۴۵)


هم چقدر است؟

دو دایره به شعاع‌های ۷ و ۲ مفروض‌اند. اگر اندازه مماس شترک خارجی دو دایره برابر ۱۲ واحد باشد، بیشترین فاصله بین نقاط روی دو دایره از

۲۳) ۱۵

۲۲) ۱۳


۲۰) ۱



$$TT' = \sqrt{d^2 - (R - R')^2}$$

$$12 = \sqrt{d^2 - (7-2)^2}$$

$$144 = d^2 - 25 \rightarrow 129 = d^2 \rightarrow d = 13$$




$$13 + 7 + 2 = 22$$

$$13 - 2 = 11 \quad \text{فاصله طریقه Min}$$

$$13 + 2 = 15 \quad \text{فاصله طریقه Max}$$

۴۶ در شکل مقابل، دو دایره برحمناس و دو قطر  $AB$  و  $CD$  از دایره بزرگتر برهم عمودند. اگر  $AM = 16$  و  $ND = 10$  شعاع‌های دو دایره را پیدا کنید.




$$\begin{aligned}
 & (R-10) \times (R-10) = R(R-14) \\
 & R^2 - 20R + 100 = R^2 - 14R \\
 & 100 = 6R \rightarrow R = 20 \\
 & R - 14 + R = 2R' \\
 & \cancel{R} - \cancel{R} = \cancel{R}' \\
 & 20 - 14 = 16 = R'
 \end{aligned}$$

ثابت کنید هرگاه خط‌های شامل دو وتر دلخواه  $AB$  و  $CD$  در نقطه‌ای مانند  $M$  (بیرون دایره) یکدیگر را قطع کنند، آن‌گاه: خرداد ۱۴۰۳


نمره ۱/۵

$$MA \cdot MB = MC \cdot MD$$



در شکل زیر  $MT$  به طول  $3\sqrt{2}$  مماس بر دایره است. مقادیر عددی  $x$  و  $y$  را به دست آورید.


نمره ۱/۲۵



$$\begin{aligned}
 & n^2 = 1 \times 2 \rightarrow n = \sqrt{2} \\
 & y \times (y+2) = (3\sqrt{2})^2 \\
 & y^2 + 2y = 18 \\
 & y^2 + 2y - 18 = 0 \\
 & (y+4)(y-2) = 0 \\
 & y = 2
 \end{aligned}$$



دکتر رها مسیح

در شکل رو به رو، وتر  $AD$  از دایره بزرگ تر، دایره کوچک تر را در نقاط  $C$  و  $B$  قطع کرده است. اگر  $AB = 4$  و


$$\begin{aligned} S_{\text{زنجیر}} &= \pi R^2 - \pi r^2 \\ &= \pi (R^2 - r^2) \\ \boxed{r^2 - b^2 = (a-b)(a+b)} \end{aligned}$$

$$25\pi \quad (4)$$

$$16\pi \quad (3)$$

نقطه  $P$  به روی وتر  $AB$  به طول ۱۵ واحد از دایره ای چنان قرار دارد که آن وتر را به نسبت  $\frac{1}{2}$  تقسیم کرده است.

(سراسری ریاضی - ۹۷)



$$12 \quad (2)$$


$$9 \quad (1)$$

$$\alpha \times \alpha = 3 \times 12$$

$$\alpha^2 = 36$$

$$\alpha = 6$$

پ وسط و دار مرکز رکن عواید.

قطع کنند. مقدار  $BM \cdot MP + NQ \cdot CN$  برابر با کدام است؟

$$BM \cdot MP + NQ \cdot CN = \frac{AB^2}{4} + \frac{AC^2}{4} = \frac{AB^2 + AC^2}{4} = \frac{BC^2}{4} = \frac{36}{4} = 9$$

$$9 \quad (2)$$

$$16 \quad (3)$$


$$36 \quad (4)$$

$$BM \cdot MP = MC \cdot AM = AM = \left(\frac{AB}{2}\right)^2$$

$$NQ \cdot CN = AN \cdot NB = AN^2 = \left(\frac{AC}{2}\right)^2$$

$$\hat{A} = 90^\circ \quad BC = \sqrt{3}$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$




$$\sqrt{18} \quad (2)$$

$$\sqrt{14} \quad (1)$$

$$\sqrt{18} \quad (4)$$

$$\sqrt{16} \quad (3)$$



VIP

$$OH + OH' = \Lambda$$


$$\begin{aligned} R^2 &= r^2 + OH^2 \\ R^2 &= 1^2 + OH'^2 \\ 0 &= 4 - 1 + OH^2 - OH'^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OH - OH' &= \Lambda \\ (OH + OH')(OH' - OH) &= \Lambda \\ R^2 &= 1 + \frac{\Lambda^2}{4} = \frac{16}{4} \Rightarrow R = \sqrt{\frac{16}{4}} \times 2 = \sqrt{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OH' + OH &= \Lambda \\ OH' - OH &= 1 \\ \frac{OH' + OH}{2} &= \frac{\Lambda}{2} \Rightarrow OH' = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

در دایره ای به شعاع  $OA$  وتر  $BC$  متماس بر دایره ای به قطر  $OA$  رسم شده است. مقدار  $MB \cdot MC$  برابر کدام است؟

(سراسری فارج از کشور ریاضی - ۹۷)





$$MO^2 \quad (1)$$

$$MA^2 \quad (2)$$


$$OA^2 \quad (3)$$

$$MA \cdot MO \quad (4)$$


## کلی / ملک محیط




## چند ضلعی محیطی



## چند ضلعی محاطی





$$(2R)^2 = AB \times CD$$

ارتفاع

۵۲ یک ذوزنقه‌ی متساوی الساقین بر دایره‌ای به شعاع ۳ محیط است. اگر مساحت ذوزنقه ۴۵ باشد، طول ساق آن کدام است؟

۵۳ شعاع دایره محاطی داخلی یک مثلث متساوی الاضلاع به ضلع ۶ کدام است؟

(۴)  $3\sqrt{3}$ (۳)  $2\sqrt{3}$ 

(۲) ۳

(۱)  $\sqrt{3}$ 

۵۴ یک ذوزنقه‌ی متساوی الساقین بر دایره‌ای به شعاع ۳ محیط است، اگر مساحت ذوزنقه ۴۵ باشد،

طول ساق آن کدام است؟

۵۵ در مثلث متساوی الاضلاع به طول ضلع  $\sqrt{3}$ ، طول خط المركزین دو دایره‌ی محاطی داخلی و

محاطی خارجی آن کدام است؟

۵۶ کم‌ترین و بیش‌ترین فاصله نقطه  $M$  تا دایره‌ای به ترتیب ۲ و ۱۸ واحد است. اگر بتوانیم از این نقطه دو مماس بر دایره رسم کنیم، فاصله دو نقطه تماس از یکدیگر کدام است؟

(۱) ۱۰

(۲) ۹/۶

(۳) ۵

(۴) ۴/۸

۵۷ فاصله دورترین نقطه دایره‌ای از نقطه  $P$  برابر ۹ سانتی‌متر و فاصله  $P$  تا مرکز این دایره  $\frac{13}{2}$  سانتی‌متر است. طول مماس مرسوم از نقطه  $P$  بر این دایره کدام است؟

(۱)  $\sqrt{6}$ (۲)  $\sqrt{13}$ 

(۳) ۶

(۴)  $3\sqrt{2}$

۵۸

اگر در یک مثلث قائم الزاویه، طول یکی از اضلاع زاویه قائم دو برابر دیگری باشد، نسبت شعاع دایره محاطی داخلی به شعاع دایره محاطی خارجی متناظر با وتر کدام است؟

$$\frac{5-\sqrt{3}}{5+5\sqrt{3}} \quad (4) \quad \frac{7+3\sqrt{5}}{2} \quad (3) \quad \frac{7-3\sqrt{5}}{2} \quad (2) \quad \frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} \quad (1)$$

۵۹

در مثلث ABC اگر  $\hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$  و  $a^2 + b^2 + c^2 = 40$  باشد، شعاع دایره محیطی مثلث کدام است؟


$$4 \quad (2) \quad 1 \quad (1)$$

$$\sqrt{3} \quad (4) \quad \sqrt{5} \quad (3)$$

۱/۲۵ نمره


در مثلث قائم الزاویه‌ای با اضلاع زاویه قائم ۳ و ۴، شعاع دایره محاطی داخلی را محاسبه کنید. خرداد ۱۴۰۳

### دکتر رها مسیح



- ۱ یک پنجضلعی در یک دایره محاط شده است. هر ضلع این پنجضلعی، وتر رو به یک زاویه محاطی است. مجموع این زوایای محاطی کدام است؟

۱۴۰۲



$$2\alpha + 2\beta + 2n + 2n + y = 360^\circ$$


$$\alpha + \beta + n + n + y = 180^\circ$$

۷۲° (۳)

۱۸° (۵)

۵۴° (۱)

- ۲ در شکل مقابل، O مرکز دایره و  $\hat{A} = 65^\circ$  است. اندازه زاویه  $O_1$  کدام است؟



۶۵° (۱)

۶۰° (۲)

۵۰° (۳) ✓

۴۵° (۴)

۳

در شکل زیر شعاع دایره ۳ واحد است. اندازه کمان  $\widehat{EDC}$  به درجه، کدام است؟


سراسری ریاضی ۱۴۰۰

۸۰ (۱)

۹۰ (۲)

۱۰۰ (۳) ✓


۱۲۰ (۴)



۴

در دایرة  $C(O, r)$ . وترهای  $PQ = 40^\circ$  و  $RS = 20^\circ$  با هم برابر بوده و یکدیگر را در نقطه  $T$  قطع کرده‌اند. اگر  $\angle OTR = 100^\circ$  باشد، اندازه زاویه  $OTR$  کدام است؟

۴۰° (۱) ۲۰° (۲) ۲۵° (۳) ۷۰° (۴) ✓



فاصله میان دو وتر کار، کار باشد

۵

دایرة  $C(O, r)$  و خط  $\ell$  به فاصلة  $2a+1$  از مرکز آن مفروض است. اگر خط و دایرة هیچ نقطه تقاطعی نداشته باشند، مقدار  $a$  کدام گزینه می‌تواند باشد؟

$$2a+1 > r$$

۳ (۴)

۲ (۳)


$\frac{3}{2}$  (۲)

۱ (۱)

$$2a > r$$

$$a > \frac{r}{2}$$

۶ در شکل روبرو اضلاع زوایای A و B بر دایره مرسوم مماس هستند. در این صورت اندازه زاویه C کدام است؟



$$\begin{aligned} \alpha + b + d - c &= 180^\circ \\ b + c + d - \alpha &= 150^\circ \\ 2(b+d) &= 330^\circ \\ b+d &= 165^\circ \\ C &= 90^\circ \quad \leftarrow b+d = 165^\circ \end{aligned}$$


۱۰۰° (۱)

$180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$  (۲)

۸۰° (۳)

۱۴۰° (۴)

۷ در شکل زیر،  $\widehat{BME} = 20^\circ$ ،  $\widehat{FD} = 100^\circ$ ،  $\widehat{EC} = 80^\circ$ ،  $\widehat{AE} = 15^\circ$  است. اگر  $\widehat{ABD} = 140^\circ$  باشد، اندازه زاویه  $A\hat{B}D$  چند درجه است؟



تیرماه ۱۴۰۱

$$290^\circ - 210^\circ = 180^\circ$$

$$x + y = 180^\circ$$

$$\frac{x+15^\circ-y}{2} = 90^\circ$$

$$x + y = 180^\circ$$

$$x + y = 180^\circ$$

$$2y = 120^\circ$$

$$y = 60^\circ$$

۷۱/۲۵ (۱)


۷۴ (۲)

۷۵ (۳)

۷۸/۷۵ (۴)

$$A\hat{B}D = \frac{91^\circ + 90^\circ}{2} = \frac{181^\circ}{2} = 90.5^\circ$$

در شکل زیر، نقطه D محل تقاطع نیمسازهای دو زاویه B و C است. اگر  $\hat{BDC} = 100^\circ$ ، آن‌گاه کمان BC چند درجه است؟



$$\begin{aligned} 2x + 2y + \alpha &= 180^\circ \\ 2(x+y) &= 180^\circ - \alpha \end{aligned}$$

راهنمایی  
برای این سوال

$$100^\circ = 2\alpha + \frac{\alpha}{2}$$


$$\frac{\alpha}{2} = 10^\circ$$

$$\alpha = 20^\circ$$

- ۲۰ (۱)  
۸۰ (۲)  
۶۰ (۳)  
۴۰ (۴)

۸

$$\begin{aligned} D &= 180^\circ - (x+y) = 180^\circ - 90^\circ + \frac{\alpha}{2} \\ &\stackrel{||}{=} 90^\circ + \frac{\alpha}{2} \end{aligned}$$




در شکل مقابل مثلث OBC متساوی‌الاضلاع است. حاصل  $\alpha + \beta$  کدام است؟ (مرکز دایره)

$$90^\circ - \alpha + \gamma + \beta + \delta = 180^\circ$$

- ۱۰ (۱)  
۲۰ (۲)  
۳۰ (۳)  
۴۰ (۴)

۹

در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ C کدام است؟



$$\frac{180^\circ - 130^\circ}{2} = 25^\circ$$


- ۷۰° (۱)  
۶۰° (۲)  
۶۵° (۳)  
۴۵° (۴)

۱۰

۱۱ دایره‌ی  $(O, r)$  و نقطه‌ی  $M$  به فاصله‌ی ۱ از مرکز دایره مفروض است. چند وتر داخل دایره می‌توان رسم کرد که طول آن ۲ باشد؟

واز  $M$  بگذرد؟

۴) بی‌شمار



۳) صفر

$$r^2 + 1^2 = 4^2 \rightarrow r^2 - 15 \rightarrow r = \sqrt{15}$$

$$\text{کوئادرنس} = \sqrt{15} \approx 3.9 \quad \times$$


$$\text{کوئادرنس} = 2\sqrt{15} \approx 6.2 \quad \times$$

$$\dots$$

۲) ۲

۱) ۱	کوئادرنس > طول وتر
۱) ۲	کوئادرنس = طول وتر
۱) ۳	طول > کوئادرنس
۱) ۴	طول = کوئادرنس
۱) ۵	کوئادرنس < طول

۱۲ مطابق شکل مقابل، دو وتر  $AB$  و  $CD$  بر هم عمودند. اندازه‌ی شعاع این دایره چقدر است؟



۳۷۲ (۱)

۵۲ (۲)

۴۷۲ (۳)

۶۴ (۴)


۱۳ مطابق شکل دو دایره هم‌مرکز به شعاع‌های ۲ و ۴ مفروض‌اند. از نقطه‌ی  $A$  دو مماس بر دو دایره رسم شده است. تفاضل مربعات طول این دو مماس چقدر است؟

۲۰ (۴)

۱۲ (۲)

۱۰ (۱)

۱۶ (۳)




$$AT^2 + r^2 = OA^2$$

$$AT'^2 + R^2 = OA^2$$

$$AT^2 + 16 = AT'^2 - 16$$

۱۴. در شکل زیر اضلاع زاویه‌های  $A$  و  $B$  بر دایره مماس‌اند. اگر وتر  $CD$  برابر شعاع دایره باشد، زاویه  $\hat{EDF}$  چند درجه است؟

خارج از کشور ۹۸



$$\frac{190}{\alpha} = \frac{90 + c + d - a}{\gamma}$$

$$\frac{100}{\beta} = \frac{90 + a + d - c}{\gamma}$$

$$c + d - a = 100$$

$$a + d - c = 40$$

$$2d = 140 \Rightarrow D = \frac{d}{2} = \frac{70}{2} = 35$$

۲۵ (۱)

۳۰ (۲)

۳۵ (۳)

۴۰ (۴)

۱۵


در شکل مقابل اگر  $\widehat{AMB} = 4\widehat{ANB}$ ، کمان  $ANB$  چه کسری از محیط دایره است؟

$\frac{1}{3}$  (۱)

$\frac{1}{5}$  (۲)


$\frac{1}{4}$  (۳)

$\frac{1}{6}$  (۴)



## دکتر رها مسیح

مهان عود!



در نیم دایرهٔ شکل مقابل مقابلهٔ  $AB = 3$  و  $AM = 1$ . اگر  $MT$  بر نیم دایرهٔ مماس باشد، طول پاره خط  $MH$  چقدر است؟

۱۶

۱/۵ (۱)

۱/۴ (۳)

۱/۶ (۲)  
۱/۸ (۴)

$$MT^r = MA \times MB$$


$$MT^r = 1 \times 2$$

$$MT = 2$$

$$MT^r = MH \times MO$$

$$2 = MH \times 2/\delta$$

$$1/2 = 1/10 = 2 \times 1/\delta = MH$$



در شکل مقابل  $AB$  قطر دایره و  $O$  مرکز آن است. اندازهٔ زاویهٔ  $COD$  کدام است؟

۱۷

۱۵۰° (۲)

۱۳۰° (۴)

۱۶۰° (۱)


۱۴۰° (۳)

$$\angle m = 240^\circ$$

$$m = 20^\circ$$

در شکل زیر و تر  $AB$  برابر شعاع دایره و  $BD$  مماس بر دایره و  $AB \parallel CD$  و زاویه  $\beta = 2\alpha$  است. کمان  $BD$  چند درجه است؟

۱۸



سراسری ۹۸

۵۰ (۱)

۶۰ (۲)

۷۰ (۳)


۷۵ (۴)

$$2\alpha + 2\alpha + \gamma + 40^\circ = 360^\circ$$


$$\gamma + \alpha = 160^\circ$$

$$\gamma = 100^\circ$$

در شکل زیر، نیمسازهای زاویه‌های  $B$  و  $C$  در مثلث  $ABC$  رسم شده‌اند. اگر چهارضلعی داخل دایره محاطی



۲۰. اگر کمترین و بیشترین فاصله نقاط دایره  $C(O, r)$  تا خط  $d$  برابر ۳ و ۱۱ باشد، شعاع دایره کدام است؟



## جاست تست


دایره - فصل ۱ هندسه یازدهم / آموزش لغزشی ۲۰ بلهه!

زوايا و روابط طولي در دایره

۱) فاصله دورترین نقطه دایره‌ای از نقطه P برابر ۹ سانتی‌متر و فاصله P تا مرکز این دایره  $\frac{13}{2}$  سانتی‌متر است. طول مماس مرسوم از نقطه P بر این دایره کدام است؟

- (۱)  $3\sqrt{2}$       (۲) ۶      (۳)  $\sqrt{13}$       (۴)  $\sqrt{6}$

۲) در شکل زیر پاره خط AC بر دایره مماس است. اگر  $\frac{DB}{BC} = \sqrt{3}$ ، آنگاه نسبت  $\frac{AC}{BC} = ?$  کدام است؟



- (۱)  $\sqrt{2}$       (۲)  $\sqrt{3}$       (۳) ۲      (۴) ۳

سراسري ۱۴۰۰

۳ اندازه مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع‌های ۱۶ و ۶ واحد برابر ۱۵ است. خط‌المرکزین دو دایره چند واحد است؟

۷۷۶ (۴)

۱۷ (۳)

۱۸ (۲)

۱۲۷۲ (۱)

سراسری ریاضی ۱۳۹۱

۴ کم‌ترین و بیش‌ترین فاصله نقطه  $M$  تا دایره‌ای به ترتیب ۲ و ۱۸ واحد است. اگر بتوانیم از این نقطه دو مماس بر دایره رسم کنیم، فاصله دو نقطه تماس از یکدیگر کدام است؟


۱۰ (۴)

۹/۶ (۳)

۵ (۲)

۴/۸ (۱)

۵ در شکل مقابل مساحت ناحیه هاشورخورده چقدر است؟



$$\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$$

$$\frac{\pi}{2} - \sqrt{3}$$

$$\frac{2\pi}{3} - \sqrt{3}$$

$$\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$


۶ در شکل رو برو پاره خط  $BC$  مماس بر دایره، زاویه  $\angle C = 60^\circ$  و اندازه  $CD$  برابر  $\sqrt{3}$  واحد می باشند. مساحت دایره چقدر است؟

$$24\pi \quad ⑪$$

$$40\pi \quad ⑫$$

$$36\pi \quad ⑬$$

$$18\pi \quad ⑭$$



۷ در شکل رو برو، دو دایره به شعاع های ۲ و ۴ واحد، مماس داخل و اندازه کمان  $AC$  برابر  $\frac{4\pi}{3}$

است. حاصل  $MA \times MB$  کدام است؟


۸ (۱)

۶ (۳)


۹ (۲)

۱۲ (۴)

سراسری  
ریاضی ۹۹



۸ مساحت قسمت رنگ شده شکل مقابل چقدر است؟



$$9\pi - \frac{8\sqrt{3}}{9} \quad (2)$$

$$3\pi - 2\sqrt{3} \quad (4)$$

$$4\pi - 2\sqrt{3} \quad (1)$$

$$3\pi - \frac{9\sqrt{3}}{4} \quad (3)$$


۹. اگر زاویه بین مماس مشترک‌های خارجی دو دایره  $(O, 3)$  و  $(O', 13)$  برابر  $60^\circ$  باشد، طول خط مرکزین این دو دایره چقدر است؟

۲۴ (F)

۱۸ (۳)

۱۶ (۲)

۲۰ (۱)

۱۰- در شکل مقابل، اندازه قطعه مماس  $AC$ ، برابر وتر  $AB$  است. الزاماً کدام برابری درست است؟

$$BC = BA \quad (1)$$

$$BD = AC \quad (2)$$


$$BC = BD \quad (3)$$

$$DA = DC \quad (4)$$

سراسری  
ریاضی ۹۹


۱۱ در شکل زیر، نیمسازهای زوایه‌های  $B$  و  $C$  در مثلث  $ABC$  رسم شده‌اند. اگر چهارضلعی داخل دایره محاطی باشد، زاویه  $A$  چند درجه است؟

- ۹۰ (۱)  
۷۵ (۲)  
۶۰ (۳)  
۴۵ (۴)



۱۲ اگر کمترین و بیشترین فاصله نقاط دایره  $(O, r)$  تا خط  $d$  برابر ۳ و ۱۱ باشد، شعاع دایره کدام است؟

- ۸ (۱) ۸ (۲) ۷ (۳) ۴ (۴) ۴ (۵)




۱۳ مطابق شکل دو دایره هم‌مرکز به شعاع‌های ۲ و ۴ مفروض‌اند. از نقطه‌ی  $A$  دو مماس بر دو دایره رسم شده است. تفاضل مربعات طول این دو مماس چقدر است؟

- ۱۲ (۱) ۱۰ (۲)  
۲۰ (۳) ۱۶ (۴)

۱۴. در شکل زیر اضلاع زاویه‌های  $A$  و  $B$  برابر شعاع دایره مماس‌اند. اگر وتر  $CD$  برابر شعاع دایره باشد، زاویه  $\hat{EDF}$  چند درجه است؟

خارج از کشور ۹۸



۲۵ (۱)


۳۰ (۲)

۳۵ (۳)

۴۰ (۴)

۱۵. در شکل زیر وتر  $AB$  برابر شعاع دایره و  $AB \parallel CD$  مماس  $CX$  بوده است. کمان  $\widehat{BD}$  چند درجه است؟

سواسی ۹۸




۵۰ (۱)

۶۰ (۲)

۷۰ (۳)

۷۵ (۴)




در نیم دایره‌ی شکل مقابل مقابله  $AB = 3$  و  $AM = 1$ . اگر  $MT$  بر نیم دایره مماس باشد، طول پاره خط  $MH$  چقدر است؟

۱/۶) ۲

۱/۵) ۱

۱/۸) ۴

۱/۴) ۳



در شکل مقابل  $AB$  قطر دایره و  $O$  مرکز آن است. اندازه‌ی زاویه‌ی  $COD$  کدام است؟

۱۵۰°) ۲

۱۶۰°) ۱

۱۳۰°) ۴


۱۴۰°) ۳

۱۸ فرض کنید خطوط  $x + y = 1$  و  $x - y = 3$  قطرهای یک دایره و خط  $4x + 3y + 5 = 0$  مماس بر آن باشد. نزدیک‌ترین فاصله نقطه  $M(4, -2)$  از دایره، کدام است؟

۱۴۰۰ سراسری

 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ) ۳ $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ ) ۲ $\sqrt{3} - 1$ ) ۱

۹ خط  $AB$  بر دایره‌ای به قطر  $BC = 6$  مماس است. اگر  $CD = 4$ ، طول پاره‌خط  $AD$  کدام است؟




۳ (۱)

۵ (۲)

۷ (۳)

۹ (۴)


۲۰ در شکل زیر،  $PA$  مماس بر دایره است و  $B$  وسط  $PC$  است. می‌دانیم که  $AB = 1$ . طول  $AC$  چقدر است؟

 $\frac{3}{2}$  (۱) $\sqrt{2}$  (۲) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$  (۳)

۲ (۴)

## دایره - فصل ۱ هندسه یازدهم

## زوايا و روابط طولي و چند ضلعی محاطی و محیطی



۱ در شکل رو به رو، دو دایره به شعاع‌های ۲ و ۴ واحد، مماس داخل و اندازه کمان  $AC$  برابر  $\frac{4\pi}{3}$

است. حاصل  $MA \times MB$ ، کدام است؟

۸ (۱)

۶ (۳)

۹ (۲)

۱۲ (۴)

سراسرى  
ریاضی ۹۹

۲ فرض کنید طول خط مرکزین دو دایره با شعاع‌های  $1 - a^2$  و  $2 - a^2$  برابر ۶ واحد باشد. اگر دو دایره فقط یک مماس مشترک داشته باشند، میانگین مقادیر ممکن برای  $a$ ، کدام است؟

۱ (۱)


$\frac{13}{3}$

۶ (۳)

۷ (۴)

سراسرى  
۱۴۰۰

۳ مساحت قسمت رنگ شده شکل مقابل چقدر است؟



$$9\pi - \frac{8\sqrt{3}}{9} \quad (2)$$

$$3\pi - 2\sqrt{3} \quad (4)$$

$$4\pi - 2\sqrt{3} \quad (1)$$

$$3\pi - \frac{9\sqrt{3}}{4} \quad (3)$$


۴. اگر زاویه بین مماس مشترک‌های خارجی دو دایره  $(O, 3)$  و  $(O', 13)$  برابر  $60^\circ$  باشد، طول خط مرکزین این دو دایره چقدر است؟

۲۴ (F)

۱۸ (۳)

۱۶ (۲)

۲۰ (۱)

۵- در شکل مقابل، اندازه قطعه مماس  $AC$ ، برابر وتر  $AB$  است. الزاماً کدام برابری درست است؟

$$BC = BA \quad (1)$$

$$BD = AC \quad (2)$$

$$BC = BD \quad (3)$$

$$DA = DC \quad (4)$$

سراسری  
ریاضی ۹۹

۶ در شکل زیر، نیمسازهای زوایه‌های  $B$  و  $C$  در مثلث  $ABC$  رسم شده‌اند. اگر چهارضلعی داخل دایره محاطی


باشد، زاویه  $A$  چند درجه است؟

۹۰ (۱)

۷۵ (۲)

۶۰ (۳)

۴۵ (۴)




۷ اگر کمترین و بیشترین فاصله نقاط دایره  $C(O, r)$  تا خط  $d$  برابر ۳ و ۱۱ باشد، شعاع دایره کدام است؟

۸ (۱)

۸ (۲) یا ۳ (۳)

۷ (۴) یا ۴ (۵)

۱۰ (۶)



۸ مطابق شکل دو دایره هم‌مرکز به شعاع‌های ۲ و ۴ مفروض‌اند. از نقطه‌ی  $A$  دو مماس بر دو دایره رسم شده است. تفاضل مربعات طول این دو مماس چقدر است؟

۱۲ (۱)


۲۰ (۲)

۱۰ (۳)

۱۶ (۴)

۹. در شکل زیر اضلاع زاویه‌های  $A$  و  $B$  برابر شعاع دایره مماس‌اند. اگر وتر  $CD$  برابر شعاع دایره باشد، زاویه  $\hat{EDF}$  چند درجه است؟

خارج از کشور ۹۸



۲۵ (۱)


۳۰ (۲)

۳۵ (۳)

۴۰ (۴)

۱۰. در شکل زیر وتر  $AB$  برابر شعاع دایره و  $AB \parallel CD$  مماس بر دایره است. کمان  $\widehat{BD}$  چند درجه است؟

سواسی ۹۸




۵۰ (۱)

۶۰ (۲)

۷۰ (۳)

۷۵ (۴)



در نیم‌دایره‌ی شکل مقابل مقابله  $AB = 3$  و  $AM = 1$ . اگر  $MT$  بر نیم‌دایره مماس باشد، طول پاره خط  $MH$  چقدر است؟


۱۱

۱/۶ (۲)

۱/۵ (۱)

۱/۸ (۴)

۱/۴ (۳)



در شکل مقابل  $AB$  قطر دایره و  $O$  مرکز آن است. اندازه‌ی زاویه‌ی  $COD$  کدام است؟

۱۲

۱۶۰° (۱)

۱۵۰° (۲)

۱۴۰° (۳)

۱۳۰° (۴)

یک ذوزنقه متساوی‌الساقین با طول قاعده‌های ۸ و ۶ واحد، بر دایره‌ای به مساحت  $15\pi$  محیط است. مقدار  $\alpha$  کدام است؟

۱۳

۱۰ (۴)

 $\frac{32}{3}$  (۳)

۸ (۲)

 $\frac{25}{3}$  (۱)

سراسری  
۱۴۰۱ تیرماه

۱۴ طول خط مرکزین دو دایره مماس درونی  $\frac{2}{5}$  سانتی‌متر و مساحت ناحیه محدود بین آنها  $2\pi$  سانتی‌متر مربع است. شعاع دایره کوچک‌تر، چند سانتی‌متر است؟

سراسری  
تیرماه ۱۴۰۱


$2/75$  (۱)

$2/25$  (۳)

$1/75$  (۲)

$1/25$  (۴)

۱۵ در شکل زیر، از نقطه A دو مماس رسم شده است. شعاع دایره کدام است؟



$7/2\sqrt{2}$  (۱)

$4/8\sqrt{5}$  (۲)

$3/6\sqrt{2}$  (۳)

$2/4\sqrt{5}$  (۴)

یک پنج ضلعی در یک دایره محاط شده است. هر ضلع این پنج ضلعی، وتر رو به یک زاویه محاطی است. مجموع این زوایای محاطی کدام است؟

(۴) ۳۶°

(۳) ۷۲°

(۲) ۱۸°

(۱) ۵۴°

سراسری

تیرماه ۱۴۰۲

یک دایره به شعاع ۲، داخل ذوزنقه متساوی الساقینی محاط شده است. اگر یکی از زوایای ذوزنقه  $60^\circ$  درجه باشد، مساحت این ذوزنقه کدام است؟

سراسری

دی ماه ۱۴۰۱

 $\frac{32}{\sqrt{3}}$  (۴) $\frac{24}{\sqrt{3}}$  (۳) $\frac{16}{\sqrt{3}}$  (۲) $\frac{12}{\sqrt{3}}$  (۱)

۱۸

در شکل زیر شعاع دایره ۳ واحد است. اندازه کمان  $\widehat{EDC}$  به درجه، کدام است؟


سراسری ۱۴۰۰

۸۰ (۱)

۹۰ (۲)

۱۰۰ (۳)

۱۲۰ (۴)



۱۹


در شکل زیر پاره خط AC بر دایره مماس است. اگر  $\frac{DB}{BC} = \sqrt{3}$ ، آنگاه نسبت  $\frac{AC}{BC}$  کدام است؟

سراسری ۱۴۰۰

 $\sqrt{2}$  (۱) $\sqrt{3}$  (۲)


۲ (۳)

۳ (۴)



۲۰ مطابق شکل زیر ذوزنقه قائم‌الزاویه  $ABCD$  بر دایره‌ای به شعاع ۳، محیط شده است.

اگر زاویه  $\hat{MBN} = 120^\circ$  باشد، مساحت چهارضلعی  $OMNC$  کدام است؟



سراسری ۱۴۰۰

$$\frac{27\sqrt{3}}{4} \quad (1)$$

$$\frac{9\sqrt{3}}{2} \quad (2)$$

$$\frac{27\sqrt{3}}{2} \quad (3)$$

$$9\sqrt{3} \quad (4)$$

نام و نام خانوادگی :

پایه تحصیلی :


نام دبیر : رها مسیح

زمان آزمون :

تاریخ برگزاری

## کارت‌نامه خرد

در شکل مقابل  $L' \parallel L$  و شعاع دایره برابر  $30^\circ$  واحد است. با فرض  $\pi = 3$ ، طول کمان  $\widehat{AB}$  کدام است؟



۶۵ ۴

۶۰ ۳

۷۵ ۲

۷۰ ۱

در دو دایره  $C'(O', R')$  و  $C(O, R)$  طول مماس مشترک خارجی ۱۲ و طول مماس مشترک داخلی  $2\sqrt{15}$  و اندازه خط المركزين  $4\sqrt{15}$  است. اختلاف مساحت دو دایره  $C'$  و  $C$  کدام است؟


$50\pi$  ۴

$40\pi$  ۳

$30\pi$  ۲

$20\pi$  ۱

اگر مساحت قسمت سایه خورده برابر  $\frac{\pi}{2}$  باشد، محیط قسمت سایه خورده کدام است؟ (در محاسبه نهایی محیط  $\pi$  را  $3$  فرض کنید).




۷ ۴

۶ ۳

۱۰ / ۵ ۲

۷ / ۵ ۱

در شکل مقابل فاصلهٔ مراکز دو دایرۀ متقاطع برابر  $O_1O_2 = 9$  است. وتر مشترک  $AB = 5$  را امتداد می‌دهیم تا مماس مشترک خارجی  $TT'$  را در نقطۀ  $M$  قطع کند. اگر  $AM = 2$  باشد، اختلاف اندازه شعاع‌های دو دایرۀ کدام است؟




$4\sqrt{2}$  ۴

۵ ۳

$2\sqrt{3}$  ۲


۳ ۱

در دایرهٔ شکل زیر، دو ضلع  $AB$  و  $AC$  از مثلث  $ABC$  بر دایره مماس‌اند. حاصل  $x + y + z$  برابر کدام است؟




- $5 + 8\sqrt{6}$  ۱       $8\sqrt{6}$  ۲       $5\sqrt{6}$  ۳       $5 + 5\sqrt{6}$  ۴

در دایره به مرکز  $O$  و شعاع  $6$ ، دو وتر  $AB$  و  $CD$  موازی‌اند. مساحت قطعهٔ رنگ‌شده برابر کدام است؟




- $6\pi - 9\sqrt{3}$  ۱       $6\pi - 6\sqrt{3}$  ۲       $8\pi - 8\sqrt{3}$  ۳       $8\pi - 4\sqrt{3}$  ۴

در شکل زیر اندازهٔ زاویهٔ ظلی  $\widehat{ABC}$  برابر کدام است؟




- $29^\circ$  ۱       $21^\circ$  ۲       $36^\circ$  ۳       $40^\circ$  ۴

در شکل زیر مساحت قطعهٔ رنگی برابر  $\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$  است. مساحت دایره کدام است؟



- $\pi$  ۱       $4\pi$  ۲       $6\pi$  ۳       $9\pi$  ۴


در شکل زیر چهارضلعی  $ABCD$  مستطیلی به ابعاد  $12$  و  $25$  واحد و  $AB$  قطر دایره است. طول وتر  $EF$  کدام است؟



- $9$  ۱       $8$  ۲       $7$  ۳       $6$  ۴


۱۰

در دایرهٔ  $C(O, r)$  است. طول کمان  $\widehat{CD} \parallel AB$  کدام است؟

 $\pi$  ۱ $\frac{\pi}{2}$  ۲ $\frac{3\pi}{2}$  ۳ $2\pi$  ۴

در شکل مقابل،  $\widehat{CNF} = 135^\circ$  و  $\widehat{BD} = 75^\circ$  است. اگر  $\widehat{AC} = 85^\circ$ ,  $BD \parallel CE$ ,  $AC \parallel DF$  باشد، اندازه

کمان  $\widehat{EF}$  چند درجه است؟




۳۰ ۱

۳۵ ۲


۴۰ ۳

۴۵ ۴

در شکل مقابل، دو دایره در نقطه B بر هم مماس و دو قطر AB و CD از دایره بزرگتر بر هم عمودند. اگر  $\angle AM = 8^\circ$  و  $\angle CN = 6^\circ$  باشد، مساحت ناحیه سایه زده کدام است؟


۶۶ $\pi$  ۱۶۴ $\pi$  ۲۵۶ $\pi$  ۳۵۴ $\pi$  ۴

در دایره‌ی  $C(O, 5)$  پاره خط AB در نقطه‌ی B بر دایره مماس است. اگر  $AP = 4$  و  $AB = 6$  باشند، آنگاه طول کمان PQ برابر کدام است؟

 $\frac{5}{6}\pi$  ۱ $\frac{6}{5}\pi$  ۲ $\frac{4}{3}\pi$  ۳ $\frac{5}{3}\pi$  ۴

در شکل مقابل وتر  $AB$  با قطر  $CD$  موازی است. زاویه‌ی  $D\hat{B}A$  چند درجه است؟

۱۴



۶۰ ۱


۶۵ ۳

۵۰ ۲

۲۵ ۱

در شکل،  $MT$  بر دایره مماس است. اگر  $MA = ۱/\sqrt{۵}$  و  $BT = ۲$  باشند، آنگاه اندازه‌ی  $AB$  کدام است؟

۱۵



۱۴ ۱


۱۴/۵ ۳

۵ ۲

۵/۵ ۱

در شکل مقابل،  $O$  مرکز دایره و شعاع آن  $۴$  واحد است. اگر  $BD = ۴$  باشد، طول مماس  $MA$  کدام است؟

۱۶



$16\sqrt{3}$  ۱


$\sqrt{3}$  ۳

$4\sqrt{3}$  ۲

$8\sqrt{3}$  ۱

در شکل زیر اضلاع زاویه‌های  $B$  و  $C$  بر دایره مماس هستند. اندازه زاویه  $\alpha$  چند درجه است؟

۱۷



$30^\circ$  ۱


$50^\circ$  ۳

$60^\circ$  ۲

$45^\circ$  ۱

در دایره  $(O, 6)$ ، طول کمان  $AB$  برابر کدام است؟

۱۸




$3\pi$  ۱

$\frac{8}{3}\pi$  ۳

$\frac{3}{2}\pi$  ۲

$6\pi$  ۱

در شکل مقابل،  $\widehat{B} = 2\widehat{A}$  و  $\widehat{BT} = y$  و  $\widehat{A} = x$  کدام است؟



$80^\circ$  ۱

$90^\circ$  ۲

$60^\circ$  ۳

$50^\circ$  ۴

در دایره‌ای به قطر  $AB$ ، وتر  $AC$  با قطر  $AB$  زاویه‌ی  $64^\circ$  می‌سازد. نقطه‌ی  $D$  را روی کمان  $BC$  طوری انتخاب می‌کنیم که  $\angle BAD = \angle ACB$  چند درجه است؟


۳۵ ۱

۳۶ ۲

۳۷ ۳

۳۸ ۴

در شکل مقابل،  $\widehat{EF} = 80^\circ$  و  $\widehat{CD} = 100^\circ$ ،  $\widehat{AB} = 60^\circ$  است. اگر  $EF \parallel BC$  و  $AB \parallel DE$  باشد، اندازه  $\widehat{BCT}$  چند درجه است؟




۱۱۰ ۱

۱۰۰ ۲

۹۵ ۳

۹۰ ۴

از نقطه‌ی  $M$  خارج دایره  $C(O, R)$ ، خطی چنان رسم شده است که دایره را در نقاط  $A$  و  $B$  قطع کرده و  $MA = RB$  باشد. اگر  $\alpha = 22^\circ$  باشد، اندازه‌ی زاویه  $\beta$  کدام است؟




$22^\circ$  ۱

$27^\circ$  ۲

$30^\circ$  ۳

$33^\circ$  ۴

۲۳

در شکل زیر  $O$  مرکز و  $AB$  قطر دایره و  $\widehat{AKE} = 75^\circ$  باشد، زاویه  $\angle ADC$  چند درجه است؟


۱۰۰ ۴

۱۰۵ ۳


۱۱۵ ۲

۱۱۰ ۱

۲۴

با فرض  $R$  (شعاع دایره) در شکل‌های زیر، اندازه  $\alpha + \beta$  کدام است؟

۱۳۲ ۴




۱۲۴ ۳

۱۲۸ ۲

۱۱۸ ۱

۲۵

در شکل زیر  $O$  مرکز دایره است و  $\widehat{BCD} = 50^\circ$ . اگر  $\angle MCD = 2\angle ACD$  چند درجه است؟

۷۰° ۴

۶۰° ۳

۵۰° ۲

۴۵° ۱

## پاسخنامه کلیدی

۱	۱	۲	۳	۴
۲	۱	۲	۳	۴
۳	۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳	۴
۵	۱	۲	۳	۴
۶	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴
۸	۱	۲	۳	۴
۹	۱	۲	۳	۴
۱۰	۱	۲	۳	۴
۱۱	۱	۲	۳	۴
۱۲	۱	۲	۳	۴
۱۳	۱	۲	۳	۴
۱۴	۱	۲	۳	۴
۱۵	۱	۲	۳	۴
۱۶	۱	۲	۳	۴
۱۷	۱	۲	۳	۴
۱۸	۱	۲	۳	۴
۱۹	۱	۲	۳	۴
۲۰	۱	۲	۳	۴
۲۱	۱	۲	۳	۴
۲۲	۱	۲	۳	۴
۲۳	۱	۲	۳	۴
۲۴	۱	۲	۳	۴
۲۵	۱	۲	۳	۴

# تبديلات


## هندسى

تعداد تست

یک تست

پيش نياز

تبديلات هفتم



فصل دو هندسه يازدهم

انتقال، بازتاب،  
دوران و تجانس

تبديل هندسي

انتقال

بازتاب

دوران

تجانس

$$f(x, y) = (x + y, x - 3y)$$

۱ کدام یک از تبدیل‌های زیر یک انتقال است؟

$$T(x, y) = (y + 2, x - 1) \quad (2)$$

$$T(x, y) = (x + 1, 1 - y) \quad (1)$$

$$T(x, y) = \left( \frac{rx + s}{t}, \frac{ry + u}{v} \right) \quad (4)$$

$$T(x, y) = (2x + 1, 1 + y) \quad (3)$$

۲ تصویر خط  $1 - y = 2x - 3y$  را تحت تبدیل  $T(x, y) = (1 - y, 2x + 2)$  به دست آورید.

حفظ شب

ایزومتری

نقطه ثابت

انتقال

بازتاب

دوران

تجانس

۲	سه خط دوبهدو ناموازی $L_1$ و $L_2$ و $L_3$ داریم. توضیح دهید که چگونه می‌توان پاره خطی به طول ۵ واحد رسم کرد که دو سر آن روی $L_1$ و $L_2$ باشند و موازی $L_3$ باشد.	۵
۲	یک مربع را در تجانسی با نسبت تجانس $\frac{2}{3}$ و به مرکز محل تلاقی قطرها تصویر کرده‌ایم. اگر مساحت بین مربع و تصویرش ۵ واحد باشد، محیط مربع اولیه را محاسبه کنید.	۶
۱/۵	نقطه $B$ تصویر نقطه $A$ در بازتاب نسبت به خط $L$ است. اگر $AB = 16$ و نقطه $O$ روی خط $L$ باشد و $OA = 10$ ، فاصله نقطه $A$ از خط $OB$ را بیابید.	۷
۱	<p>فقط درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:</p> <p>(الف) تجانس همواره اندازه زاویه را حفظ می‌کند.</p> <p>(ب) بازتاب همواره شب خط را حفظ می‌کند.</p>	۸

**۲** یکی از نقاط تلاقی دو دایره‌ی  $C$  و  $C'$  نقطه‌ی  $A$  می‌باشد برای رسم خطی از نقطه‌ی  $A$  گذشته به طوری که در دو دایره و ترها مساوی ایجاد کند کدام تبدیل به کار می‌رود؟

- (۱) بازتاب یکی از دایره‌ها به مرکز دایره‌ی کوچک‌تر.
- (۲) بازتاب یکی از دایره‌ها به مرکز  $A$ .
- (۳) بازتاب یکی از دایره‌ها به مرکز دایره‌ی بزرگ‌تر.
- (۴) بازتاب یکی از دایره‌ها به مرکز وسط خط‌المرکزین دو دایره.

**۳** دو دایره‌ی  $C(O, R)$  و  $C'(O', R')$  و نقطه‌ی  $A$  بیرون آن‌ها مفروضند برای رسم مثلث قائم‌الزاویه‌ی متساوی الساقین به رأس  $A$  بطوریکه دو رأس بعدی در دواير  $C$  و  $C'$  قرار داشته باشند کدام تبدیل به کار می‌رود؟

- (۱) انتقال
- (۲) دوران
- (۳) تجانس
- (۴) بازتاب

**۴** دوران یافته‌ی خط  $y - 3x = 2$  به مرکز مبدأ و زاویه‌ی  $-90^\circ$  کدام است؟

$$y + x + 2 = 0 \quad (۱) \qquad y - x + 2 = 0 \quad (۲) \qquad y + x = 2 \quad (۳) \qquad y - x = 2 \quad (۴)$$


۵	در دو دایره با شعاع‌های ۳ و ۵ و خط‌المرکزین ۸، فاصله‌ی مرکز تجانس مستقیم دو دایره تا مرکز دایره‌ی بزرگ‌تر کدام است؟
۱۲ (۱)	۱۵ (۲)
۲۰ (۴)	۱۸ (۳)

۶ تحت یک تبدیل، خط مفروض، یا تبدیل یافته آن، موازی است. در کدام حالت، نوع تبدیل کاملاً مشخص است؟ (سراسری-ریاضی-۸۵)

- (۱) تجانس
- (۲) دوران
- (۳) بازتاب نسبت به نقطه
- (۴) بازتاب نسبت به خط

کاربرد تبدیل هم پیرامونی

۷ زمینی به شکل زیر حصار کشی شده است و مساحت آن  $6 \times 6$  مترمربع است اگر بخواهیم بدون تغییر محیط زمین و با استفاده از تبدیل هندسی مناسب ، حصارها را طوری جابه جا کنیم تا مساحت زمین بیشترین مقدار ممکن شود، در این صورت حداقل مساحت زمین چند مترمربع است؟




۸۸ (۱)

۸۶ (۳)

۸۴ (۲)


۸۲ (۱)

۸ مطابق شکل اگر بخواهیم بدون تغییر محیط، مساحت چهارضلعی را افزایش دهیم، مقدار افزایش مساحت چقدر است؟

 $8\sqrt{5}$  (۲) $4\sqrt{5}$  (۱) $16\sqrt{5}$  (۳) $12\sqrt{5}$  (۴)

۹ دو نقطه  $A(-4, 9)$  و  $B(-4, 1)$  در طوفین محور  $y$  ها قرار دارند. دو نقطه  $C$  و  $D$  به فاصله دو واحد از هم روی محور  $y$  ها قرار دارند، حداقل طول خط

(مشابه داخل - ۹۹)

شکسته  $ACDB$  کدام است؟


۹ (۱)

۱۰ (۲)

۸ (۳)


۱۲ (۴)

۱۰ نقاط  $(4, 6)$  و  $(-2, -1)$  در طرفین محور  $x$  ها قرار گرفته اند و نقطه  $M$  روی محور  $x$  هامی لغزد، حداکثر  $|MA - MB|$  کدام است؟ (مشابه داخل - ۹۸)



- ۳ (۱)
- ۴ (۲)
- ۵ (۳)
- ۶ (۴)

۱۱ نقاط  $(5, 7)$  و  $(1, 4)$  در یک طرف محور  $y$  ها قرار گرفته اند و نقطه  $M$  روی محور  $y$  هامی لغزد، حداکثر  $|MA - MB|$  کدام است؟ (مشابه داخل - ۹۸)



- ۵ (۱)
- ۶ (۲)
- ۷ (۳)
- ۸ (۴)

نقاط ثابت:

ایزومتریک

همانی:

حفظ شب

ویژگی:

حفظ جهت

انتقال

نقاط ثابت:

ایزومتریک

همانی:

حفظ شب

ویژگی:

حفظ جهت

بازتاب

نقاط ثابت:

ایزومتریک

همانی:

حفظ شب

ویژگی:

حفظ جهت

دوران

نقاط ثابت:

ایزومتریک

همانی:

حفظ شب

ویژگی:





حفظ جهت

تجانس

## تبديل ها


آموزش را با دبیران برنده ایران تجربه کنید

## کاربرد تبدیل ها



ردیف	خرداد ۱۴۰۳	سوالات (پاسخ نامه دارد) – استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.	خرداد ۱۴۰۳									
نمره	فرage	سوالات فصل ۲										
۰.۷۵	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>گروه B</td></tr> <tr><td>دوران</td></tr> <tr><td>همانی</td></tr> <tr><td>بازتاب</td></tr> <tr><td>انتقال</td></tr> </table> <p>برای هر کدام از عبارات گروه A، تبدیل مناسب را از گروه B انتخاب کنید. (یک مورد از گروه B اضافی است).</p>	گروه B	دوران	همانی	بازتاب	انتقال	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>گروه A</td></tr> <tr><td>الف) تبدیلی که جهت شکل را حفظ نمی‌کند:</td></tr> <tr><td>ب) تبدیلی که نتیجهٔ دو بازتاب متواالی با محورهای متقاطع است:</td></tr> <tr><td>پ) تبدیلی که هر نقطهٔ صفحه را به خود آن نقطهٔ نظیر می‌کند:</td></tr> </table>	گروه A	الف) تبدیلی که جهت شکل را حفظ نمی‌کند:	ب) تبدیلی که نتیجهٔ دو بازتاب متواالی با محورهای متقاطع است:	پ) تبدیلی که هر نقطهٔ صفحه را به خود آن نقطهٔ نظیر می‌کند:	۴
گروه B												
دوران												
همانی												
بازتاب												
انتقال												
گروه A												
الف) تبدیلی که جهت شکل را حفظ نمی‌کند:												
ب) تبدیلی که نتیجهٔ دو بازتاب متواالی با محورهای متقاطع است:												
پ) تبدیلی که هر نقطهٔ صفحه را به خود آن نقطهٔ نظیر می‌کند:												
۱	<p>با توجه به شکل زیر نشان دهید در تبدیل انتقال، اندازهٔ هر پاره خط و اندازهٔ تصویر آن باهم برابرند.</p>	<p>(<math>AB \parallel \vec{V}</math>) و اندازهٔ <math>\vec{V}</math> از اندازهٔ پاره خط <math>AB</math> کوچک‌تر است.</p>	۸									
۰.۵	<p>نقاط <math>A'</math>, <math>B'</math> و <math>C'</math> به ترتیب دوران یافتهٔ نقاط <math>A</math>, <math>B</math> و <math>C</math> هستند. روش یافتن مرکز دوران را شرح دهید.</p>		۹									


در شکل رویه را اگر خط  $L$  را در تجانس به مرکز  $O$  و نسبت تجانس  $\frac{7}{4}$  تصویر کنیم و آن را  $L'$  بنامیم؛ مساحت بین خط  $L$  و  $L'$  و خطوط  $d$  و  $d'$  چقدر است؟




با توجه به شکل، نقطه  $M$  روی پاره خط  $HK=8$  را به گونه‌ای بباید که:

الف) مسیر  $AMB$  کوتاه‌ترین مسیر ممکن باشد.

ب) کمترین مقدار عددی  $AM+MB$  را محاسبه کنید.



در شکل زیر، می‌خواهیم بدون آن که محیط تغییر کند، مساحت را افزایش دهیم. میزان افزایش مساحت را حساب کنید.



# روابط طولی

نمره در امتحان نهایی


شش نمره

تعداد تست

یک تست

پیش نیاز


نسبت های مثلثاتی فصل ۲ ریاضی دهم  
هندرسه دهم فصل ۱



فصل سوم هندسه یازدهم

قضیه سینوس و کسینوس  
قضیه نیمساز  
قضیه هرون

مثلث قائم الزاویه



$$\frac{1}{h_a^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$$

قضیه سینوس ها

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

قضیه کسینوس ها

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

۱ در مثلث  $ABC$ ، زاویه  $\hat{A} = 30^\circ$  و  $b = a\sqrt{2}$ ، زاویه  $C$  چند درجه است؟


(۱) ۶۰

(۲) ۷۵


(۳) ۱۰۵

(۴) ۱۲۰

۲ در شکل رو به رو، چهارضلعی  $ABCD$  محاطی است. طول ضلع  $CD$  کدام است؟

(۱)  $\frac{5}{2}$ 

(۲) ۳

(۳)  $2\sqrt{3}$ (۴)  $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 

۳ در شکل مقابل اندازه زاویه  $A$  چقدر است؟

(۱)  $135^\circ$ (۲)  $105^\circ$ (۳)  $60^\circ$ (۴)  $75^\circ$ 

۴ در مثلثی به اضلاع ۸، ۱۵، ۱۷ اندازه شعاع دایره محیطی کدام است؟



(۱) ۹

(۲) ۹/۵

(۳) ۷/۵

(۴) ۸/۵

قضیه نیمساز و روابط مرتبط با آن



$$da = \frac{2bc \cos \frac{A}{2}}{b+c}$$

رابطه های میانه

$$b^2 + c^2 = \frac{a^2}{2} + 2ma^2$$


$$ma^2 = b^4 - \frac{a^2}{4}$$

$$[m_a^r] + [m_b^r] + [m_c^r] = \frac{r}{4} (\underline{a^r + b^r + c^r})$$

قضیه هرون

در شکل زیر، مقدار  $\cos \alpha$  چقدر است؟ سراسری دی ۱۴۰۱

۵



$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$


$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{10}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{10}$$

On

در شکل مقابل، اندازه x کدام است؟




$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad 1$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad 2$$

$$\frac{1}{2} - 1 \quad 3$$

$$\frac{1}{3} - 1 \quad 4$$

در چهارضلعی رو به رو، دو ضلع برهم عمودند.  $\sin \alpha$  کدام است؟ خارج کشور ۹۸ ۷



$$\frac{3}{5} \quad (۱)$$

$$\frac{4}{5} \quad (۲)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (۴)$$

۸ در مثلث ABC، حاصل  $b^2 \cos^2 \hat{C} + c^2 \sin^2 \hat{B}$  برابر با کدام است؟

$$a^2 \quad (۱)$$

$$b^2 \quad (۲)$$

$$c^2 \quad (۳)$$

$$bc \quad (۴)$$

۹ در یک مثلث قائم‌الزاویه به اضلاع قائم ۳ و ۷ واحد، طول نیمساز داخلی زاویه قائمه کدام است؟

سراسری ۹۵

$$2/\sqrt{8} \quad (۱)$$

$$1/\sqrt{4\sqrt{2}} \quad (۲)$$

$$2/\sqrt{1\sqrt{2}} \quad (۳)$$

$$2/\sqrt{1} \quad (۴)$$

۱۰ مساحت مثلثی با اضلاع ۱۲، ۹، ۷ کدام است؟

$$14\sqrt{5} \quad (۱)$$

$$12\sqrt{5} \quad (۲)$$

$$14\sqrt{3} \quad (۳)$$

$$15\sqrt{2} \quad (۴)$$

۱۱ در مثلثی با اضلاع  $x$ ,  $5$ ,  $2x$  اگر مجموع مربعات میانه‌ها برابر  $\frac{105}{2}$  باشد، محیط مثلث چقدر است؟

۱۴ (۴)

۱۲ (۳)

۱۵ (۲)

۱۷ (۱)


۱۲ در مثلثی با اضلاع  $7$ ,  $10$ ,  $13$  طول میانه وارد بر ضلع متوسط کدام است؟

۸ (۵)

۶ (۳)

۳۷۱۰ (۲)

۲۷۲۱ (۱)



۱۳ در شکل مقابل طول  $AD$  چقدر است؟

۲۷۲ (۱)

\sqrt{6} (۳)

۱۴ در مثلث  $ABC$  اگر  $BC=10$  و میانه‌های  $CN=9$  و  $BM=12$  باشد، مساحت مثلث کدام است؟

۱۰۸ (۴)

۱۴۴ (۳)

۷۲ (۲)

۳۶ (۱)

۱۵ در متوازی‌الاضلاعی اندازه دو قطر  $3$  و  $4$  و زاویه بین آن‌ها  $150^\circ$  است. مساحت متوازی‌الاضلاع چقدر است؟

۲۷۳ (۴)

۲۷۳ (۳)

۳ (۲)

۶ (۱)

سوالات فصل ۳

خرداد ۱۴۰۳

در مثلث  $ABC$ ،  $\hat{A} = 30^\circ$ ،  $BC = 10\text{ cm}$ ، مقدار شعاع دایره محیطی کدام است؟ ۵/۰ نمره

(الف) ۱۰      (ب) ۱۵      (ت) ۲۰      (پ) ۲۵

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad \text{در مثلث } ABC \text{ که } (\hat{A} < 90^\circ), \text{ ثابت کنید:}$$

مساحت مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع  $a$  را به کمک دستور هرون بیابید. ۱ نمره

در مثلث  $ABC$  که  $BC = 10$ ،  $AC = 4$ ،  $AB = 7$ ، طول نیمساز داخلی زاویه  $C$  را محاسبه کنید. ۱/۵ نمره

در مثلث  $ABC$  که  $AB = 4$ ،  $AC = 6$  و  $BC = 8$ ، نقطه  $M$  وسط ضلع  $BC$  است. محیط مثلث  $AMC$  را بدست آورید. ۱/۵ نمره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ

## هندسه (۲)

رشته ریاضی و فیزیک

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

هندسه(۲) - پایه یازدهم دوره دوم متوسطه - ۱۱۱۲۱۳  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری  
حمدیرضا امیری، علی ابرانمش، مهدی ابزدی، ناصر بروجردیان، محمدحسن بیژن‌زاده، خسرو  
داودی، زهرا رحیمی، محمدهاشم رستمی، ابراهیم ریحانی، محمدرضا سیدصالحی، میرشهرام صدر،  
اکرم قابل‌رحمت، طاهر قاسمی‌هنری و عادل محمدپور (اعضای شورای برنامه‌ریزی)  
محمدحسن بیژن‌زاده، زهرا رحیمی، محمدرضا سیدصالحی، هوشنگ شرقی و محمود نصیری  
(اعضای گروه تالیف) - محمد دانشگر (ویراستار)  
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
احمدرضا امینی (مدیر امور فنی و چاپ) - مجتبی زند (مدیر هنری، طراح جلد و صفحه‌آرا) -  
مریم دهقان‌زاده (رسام) - افسانه امیر احمدی، سیده‌فاطمه طباطبایی، سیف‌الله بیک‌محمد دلیوند،  
علی نجمی، کبری اجابتی (امور آماده‌سازی)  
تهران: خیلان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)  
تلفن: ۰۲۶۱۱۶۱-۸۸۸۳، دورنگار: ۰۹۶۶-۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹  
ویگاه: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران تهران: کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیلان ۶۱  
(داروپخش) تلفن: ۰۵-۱۶۱۱-۸۵۰۴، دورنگار: ۰۶-۸۵۱۶-۴۴۹۸، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»  
چاپ هفتم ۱۴۰۲


نام کتاب:  
بدیدآورنده:  
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:  
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:  
شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

ناشر:  
چاپخانه:  
سال انتشار و نوبت چاپ:

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۷۸۲-۲  
ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۷۸۳-۲

A black and white portrait of Ayatollah Ruhollah Khomeini. He is an elderly man with a long, full white beard and mustache. He is wearing a dark turban (ghutrah) and a light-colored, open-collared robe (jacket). He is looking slightly to his right with a serious expression. The background is a textured, light-colored wall.

جوان‌ها قدر جوانیشان را  
بدانند و آن را در علم و  
نقوی و سازندگی خودشان  
صرف کنند که اشخاصی  
امین و صالح بشوند.  
ملکت ما با اشخاص امین  
می‌تواند مستقل باشد.  
امام خمینی «قدس‌سره»

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌کیرند.

# فهرست

۹ .....	<b>فصل ۱ : دایره</b>
۱۰ .....	درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره
۱۸ .....	درس دوم : رابطه‌های طولی در دایره
۲۴ .....	درس سوم : چند ضلعی‌های محاطی و محیطی
۳۱ .....	<b>فصل ۲ : تبدیل‌های هندسی و کاربردها</b>
۳۲ .....	درس اول : تبدیل‌های هندسی
۵۰ .....	درس دوم : کاربرد تبدیل‌ها
۵۹ .....	<b>فصل ۳ : روابط طولی در مثلث</b>
۶۰ .....	درس اول : قضیه سینوس‌ها
۶۴ .....	درس دوم : قضیه کسینوس‌ها
۶۸ .....	درس سوم : قضیه نیمساز‌های زوایای داخلی و محاسبه طول نیمسازها
۷۱ .....	درس چهارم : قضیه هرون (محاسبه ارتفاع‌ها و مساحت مثلث)

# پیشگفتار

کتاب حاضر در راستای برنامه درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب‌های ریاضی دوره دوم متوسطه تألیف شده است. همانند پایه‌های قبلی، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است. از این میان «فعالیت‌ها» موقعیت‌هایی برای بادگیری و ارائه مفاهیم جدید ریاضی فراهم می‌کنند و این امر مستلزم مشارکت جدی دانش‌آموزان است. البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت‌ها به‌عهده دارد. با توجه به این که کتاب برای دانش‌آموزان سطح متوسط طراحی شده است، با درنظر گرفتن شرایط مختلف، امکان غنی‌سازی فعالیت‌ها و یا ساده‌سازی آنها به‌وسیله معلم وجود دارد. در هر حال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایند آموزش است. در همین راستا توجه به انجام فعالیت‌ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت‌وگو و دادن مجال به دانش‌آموزان برای کشف مفاهیم به‌طور جدی توصیه می‌شود.


زمان کلاس درس نباید به مباحثی خارج از اهداف کتاب درسی اختصاص یابد. همچنین نباید آزمون‌های مختلف خارج از مدرسه مبنای آموزش مفاهیم در کلاس درس واقع شوند، بلکه این کتاب درسی است که سطح و سبک آزمون‌ها را مشخص می‌کند. در بسیاری از موارد درباره یک مفهوم، حد و مرزهایی در کتاب رعایت شده است که باید به این موضوع در ارزشیابی‌ها و آزمون‌های رسمی توجه شود. رعایت این محدودیت‌ها موجب افزایش تناسب بین زمان اختصاص یافته به کتاب و محتوای آن خواهد شد. روند کتاب نشان می‌دهد که ارزشیابی باید در خدمت آموزش باشد. در واقع ارزشیابی باید براساس اهداف کتاب باشد و نه موضوعاتی که احياناً پیش از این سال‌ها به صورت سنتی ارائه شده‌اند.

ارتباط بین ریاضیات مدرسه‌ای و محیط پیرامون و کاربردهای این دانش در زندگی روزمره، که به وضوح در اسناد بالا دستی مورد تأکید قرار گرفته است، به صورت تدریجی خود را در کتاب‌های درسی نشان می‌دهد. تلاش برای برقراری این ارتباط در تصاویر کتاب نیز قابل مشاهده است که امید است مورد توجه معلمان و دانش‌آموزان عزیز قرار گیرد.

اگر مهم‌ترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم، دیگر استفاده افراطی از فرمول‌ها، الگوریتم‌ها، قواعد و دستورها بدون آگاهی از چگونگی و چرایی عملکرد آنها، جایگاهی در آموزش ریاضی مدرسه‌ای نخواهد داشت. فرصت حضور دانش‌آموز در کلاس درس را نباید به سادگی از دست داد. فرایندهای مانند استدلال، تعیین، حل مسئله، طرح مسئله و موضوعاتی نظیر مسائل باز پاسخ، بازنمایی‌های چندگانه و گفتمان ریاضی نقش مهمی در پرورش تفکر ریاضی داشت آموزان دارد.

مؤلفان از کلیه امکانات موجود نظیر سامانه اعتبارسنجی، سایت گروه ریاضی دفتر تألیف، ایمیل، دعوت از دیبران مجرب برای حضور در جلسات نقد و بررسی کتاب و دیگر رسانه‌های در دسترس برای دریافت دیدگاه‌ها، نقدها و نظرات دیبران محترم سراسر کشور بهره گرفته‌اند. پاره‌ای از تصاویر و عکس‌های مورد استفاده در کتاب را نیز دیبران ریاضی استان‌های مختلف کشور به گروه ریاضی ارسال کرده‌اند. لازم است از خدمات تمامی عزیزان همراه تشکر و قدردانی شود. اعضای تیم تألیف به حضور و مشارکت جدی همکاران ارجمند در امر نقد و بررسی کتاب افتخار می‌کنند. امید که همچنان شاهد این تعامل و ارتباط مؤثر باشیم. گروه تألیف آمادگی دریافت نظرات و دیدگاه‌های تمامی همکاران و اساتید را از طریق پست الکترونیکی و وبگاه واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی<sup>۱</sup> دارد. به علاوه بسیاری از مطالب مربوط به پشتیبانی کتاب از طریق وبگاه واحد ریاضی قابل دریافت است.

#### مؤلفان



فصل اول

## دایره



هندسه در ساخت استحکامات دفاعی، قلعه‌ها و برج و باروها از دیرباز کاربردهای بسیاری داشته است. یک قضیهٔ بنیادی در هندسه موسوم به «قضیهٔ همپیرامونی» می‌گوید در بین همهٔ شکل‌های هندسی بسته با محیط ثابت دایره دارای بیشترین مساحت است. این موضوع در طراحی دایره‌ای شکل قلعه‌ها اهمیت بسیاری دارد. قلعهٔ فلک‌الافلاک (شاپور خواست) که از دورهٔ ساسانیان در شهرستان خرم‌آباد بهجای مانده است نمونه‌گویایی از همین کاربردهاست.



## مفهوم‌های اولیه و زاویه‌ها در دایره


دایره یکی از شکل‌های مهم در هندسه است که در پایه‌های قبل با تعریف و برخی از ویژگی‌های آن آشنا شده‌اید. در ادامه با استفاده از شکل دایره، برخی موارد یادآوری شده‌است که از قبل با آنها آشنا بودیم.

همان‌طور که می‌دانید تمام نقاطی که روی دایره واقع‌اند از مرکز دایره به یک فاصله ثابت (اندازه شعاع دایره) هستند. معمولاً دایره  $C$  به مرکز  $O$  و شعاع  $r$  را به صورت  $C(O,r)$  نمایش می‌دهیم. با توجه به شکل دایره به سادگی می‌توان نشان داد که:

الف) اگر نقطه‌ای مانند  $B$  روی دایره  $C(O,r)$  باشد، فاصله آن تا مرکز دایره ..... شعاع دایره است.


ب) اگر نقطه‌ای مانند  $C$  بیرون دایره  $C(O,r)$  باشد، فاصله آن تا مرکز دایره ..... شعاع دایره است.

پ) اگر نقطه‌ای مانند  $A$  درون دایره  $C(O,r)$  باشد، فاصله آن تا مرکز دایره ..... شعاع دایره است.




### اوضاع نسبی خط و دایره


در پایه‌های قبل با اوضاع نسبی خط و دایره تا حدودی آشنا شدیم و دیدیم که یک خط و یک دایره می‌توانند یک یا دو نقطه اشتراک داشته، و یا هیچ نقطه اشتراکی نداشته باشند. در حالتی که خط و دایره تنها در یک نقطه مترک باشند، اصطلاحاً گفته می‌شود خط بر دایره مماس است و در حالتی که خط و دایره دو نقطه اشتراک داشته باشند، خط و دایره را متقطع می‌نامند. در این حالت خط را نسبت به دایره قاطع می‌نامیم.



### یادآوری

اگر خط  $d$  و نقطه  $A$  غیرواقع بر  $d$  داده شده، و نقطه  $H$  پای عمودی باشد که از  $A$  به  $d$  رسم می‌شود، اندازه پاره خط  $AH$  همان فاصله نقطه  $A$  از خط  $d$  است و فاصله نقطه  $A$  از دیگر نقاط خط  $d$  از این مقدار بزرگ‌تر است ( $AB > AH$ ).





اگر  $d$  یک خط و  $C(O,r)$  یک دایره و نقطه  $H$  پای عمودی باشد که از نقطه  $O$  به خط  $d$  رسم می شود، موارد زیر را کامل کنید.

الف) اگر فاصله خط  $d$  از مرکز دایره از شعاع کمتر باشد ( $r < OH$ )، خط و دایره نقطه اشتراک دارند؛ یعنی متقاطع‌اند .....

ب) اگر فاصله خط از مرکز دایره با شعاع برابر باشد ( $r = OH$ )، خط و دایره نقطه اشتراک دارند؛ یعنی .....

پ) اگر فاصله خط از مرکز دایره از شعاع بزرگ‌تر باشد ( $r > OH$ )، خط و دایره ..... .

### فعالیت

۱- فرض کنیم خط  $d$  بر دایرة  $C$  در نقطه  $F$  مماس است.

الف) تزدیک‌ترین نقطه خط  $d$  به نقطه  $O$  کدام است؟ چرا؟

ب) از  $O$  به  $d$  عمود کنید. این خط عمود، خط  $d$  را در کدام نقطه قطع می‌کند؟ چرا؟

پ) نتیجه: اگر  $F$  نقطه‌ای روی دایره باشد، شعاع  $OF$  و خط مماس بر دایره در نقطه  $F$  ..... .

۲- خط  $d$  در نقطه  $F$  به شعاع  $OF$  عمود است. با تعیین وضعیت همه نقاط خط  $d$  نسبت به دایرة  $C$  نشان دهید این خط با دایره فقط یک نقطه تماس دارد و بنابراین بر دایره مماس است.

۳- با توجه به قسمت‌های ۱ و ۲ اگر نقطه‌ای مانند  $F$  روی دایره داده شده باشد، چگونه می‌توانید خط مماس بر دایره را در نقطه  $F$  رسم کنید؟  
بنابراین :

یک خط و یک دایره بر هم مماس‌اند اگر و تنها اگر این خط در نقطه تماس با دایره بر شعاع آن نقطه عمود باشد.

### زوایای مرکزی، محاطی و ظلی

با تعاریف زوایای مرکزی و محاطی و کمان یک دایره در پایه‌های قبل آشنایی داشته باشید. در اینجا به یادآوری برخی مفاهیم می‌پردازیم.

۱- شعاع دایره: پاره‌خطی که یک سر آن مرکز دایره و سر دیگر آن نقطه‌ای روی دایره باشد.

۲- وتر دایره: پاره‌خطی که دوسر آن روی دایره باشد.

- ۳- **قطر دایره** : وتری از دایره که از مرکز دایره می‌گذرد.
- ۴- **زاویه مرکزی** : زاویه‌ای است که رأس آن بر مرکز دایره واقع باشد.
- ۵- **زاویه محاطی** : زاویه‌ای است که رأس آن روی دایره و اضلاع آن شامل دو وتر از دایره باشند.

۶- **کمان** : کمان دایره شامل دو نقطه روی دایره و تمام نقاط بین آن دو نقطه است؛ به این ترتیب هر دو نقطه از دایره مانند A و B، دو کمان  $\widehat{AB}$  را روی دایره مشخص می‌کنند. برای مشخص کردن آنها می‌توان از نقطه‌ای دیگر روی هر کمان استفاده کرد؛ مثلاً در شکل مقابل نقاط A و B دو کمان  $\widehat{ACB}$  و  $\widehat{ADB}$  را مشخص می‌کنند. معمولاً منظور از  $\widehat{AB}$  کمان کوچک‌تر مشخص شده توسط A و B است.

۷- **اندازه کمان**، همان اندازه زاویه مرکزی مقابل به آن کمان تعریف می‌شود و واحد آن درجه است.

۸- با توجه به شکل به سادگی دیده می‌شود که کمان‌های دایره‌های مختلف می‌توانند اندازه‌های برابر و طول‌های نابرابر داشته باشند.


### کاردر کلاس

۱- با توجه به اینکه محیط دایره یک کمان به اندازه  $36^\circ$  است، خواهیم داشت :

$$\frac{\text{اندازه کمان } AB}{36^\circ} = \frac{\text{طول کمان } AB}{\text{محیط دایره}}$$


۲- با توجه به شکل، اندازه کمان‌های زیر را بنویسید.  
 $\widehat{AB} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$       طول  $\widehat{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$   
 $\widehat{A_1B_1} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$       طول  $\widehat{A_1B_1} = \underline{\hspace{2cm}}$

۳- ناحیه‌ای از درون و روی دایره را، که به دو شعاع دایره و آن دایره محدود است یک قطاع دایره می‌نامند. اگر زاویه مرکزی قطاعی از دایره C(O,R) برحسب درجه مساوی  $\alpha$  باشد، شان دهید طول کمان AB برابر است با :  $L = \frac{\pi R}{180^\circ} \alpha$  و مساحت قطاع برابر است با :  $S = \frac{\pi R^2 \alpha}{360^\circ}$




### فعالیت

۱- فرض کنید اندازه‌های کمان‌های  $AB$  و  $CD$  از دایره  $(O,r)$  باهم برابرند. با تشکیل مثلث‌های  $AOB$  و  $COD$  نشان دهید وترهای  $AB$  و  $CD$  نیز باهم برابرند.



۲- فرض کنید دو وتر  $AB$  و  $CD$  از یک دایره باهم برابرند. ثابت کنید اندازه‌های کمان‌های  $AB$  و  $CD$  نیز باهم برابرند.




۳- وتر  $AB$  و قطری از دایره، که بر وتر  $AB$  عمود است، مانند شکل مقابل داده شده است. با تشکیل مثلث‌های  $AOH$  و  $BOH$  ثابت کنید قطر  $CD$  وتر  $AB$  و کمان  $AB$  را نصف می‌کند.

۴- این بار فرض کنید قطر  $CD$  وتر  $AB$  را نصف کرده است و نشان دهید  $CD$  بر  $AB$  عمود است و کمان  $AB$  را نصف می‌کند.

۵- حال فرض کنید قطر  $CD$  کمان  $AB$  را نصف کرده است. نشان دهید  $CD$  بر  $AB$  عمود است و آن را نصف می‌کند.

۶- اگر نقاط وسط وتر  $AB$  و کمان  $AB$  را داشته باشیم، چگونه می‌توانیم قطر عمود بر وتر  $AB$  را رسم کنیم؟



۱- در شکل مقابل  $\widehat{ADB}$  یک زاویه محاطی است که یک ضلع آن از مرکز دایره عبور کرده است.

- اگر از  $B$  به  $O$  وصل کنیم، زاویه  $AOB$  یک زاویه خارجی برای مثلث  $ODB$  است.

بنابراین:  $\widehat{AOB} = \widehat{ODB} + \dots = 2\widehat{ODB}$

$$\widehat{ODB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB} = \frac{1}{2} \text{.....}$$

### فعالیت

۲- در این شکل  $\widehat{ADB}$  یک زاویه محاطی است که دو ضلع آن در دو طرف O واقع شده‌اند.

- اگر قطر DE را رسم کنیم، طبق قسمت ۱ داریم:

$$\left. \begin{array}{l} \widehat{ADE} = \frac{1}{2} \dots \dots \\ \widehat{EDB} = \frac{1}{2} \dots \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{ADB} = \frac{1}{2} \dots \dots$$

۳- در این شکل  $\widehat{ADB}$  یک زاویه محاطی است که دو ضلع آن در یک طرف O واقع شده‌اند.

- اگر قطر DE را رسم کنیم، طبق قسمت ۱ داریم:

$$\left. \begin{array}{l} \widehat{ADE} = \frac{1}{2} \dots \dots \\ \widehat{BDE} = \frac{1}{2} \dots \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{ADB} = \frac{1}{2} \dots \dots$$

بنابراین:

**قضیه:** اندازه هر زاویه محاطی برابر است با نصف اندازه کمان مقابل به آن زاویه.

### زاویه ظلی

نوع دیگری از زاویه، که در دایره مطرح است، زاویه ظلی است. زاویه ظلی زاویه‌ای است که رأس آن روی دایره قرار دارد و یکی از اضلاع آن مماس بر دایره و ضلع دیگر آن شامل و تری از دایره باشد. در شکل مقابل  $\hat{BAC}$  یک زاویه ظلی است.





### فعالیت

۱- زاویه ظلی  $\widehat{CAB}$  را در نظر بگیرید و قطری از دایره را رسم کنید که شامل نقطه A هست.

الف)  $\widehat{DAC} = \frac{1}{2} \dots \dots^\circ$  و بنابراین:  $\widehat{DAC} = \dots \dots^\circ$

ب) زاویه  $\widehat{DAB}$  یک زاویه محاطی است.

بنابراین:  $\widehat{DAB} = \frac{1}{2} \dots \dots$





پ) از (الف) و (ب) داریم :  
و بنابراین  
ت) نشان دهید نتیجه قسمت (پ) برای یک زاویه ظلی منفرجه نیز برقرار است.  
بنابراین :

**قضیه:** اندازه هر زاویه ظلی برابر است با ..... کمان رویه و به آن زاویه.

### کاردرکلاس

- ۱- در شکل مقابله ترهای AB و CD موازی هستند.  
 الف) از A به D وصل کنید. زوایای BAD و ADC نسبت به هم چگونه‌اند؟ چرا؟  
 ب) کمان‌های  $\widehat{BD}$  و  $\widehat{AC}$  نسبت به هم چگونه‌اند؟ چرا؟



- ۲- در شکل مقابله کمان‌های EG و FH هم اندازه‌اند.  
 الف) ترهای EF و GH و پاره خط EH را رسم کنید.  
 ب) زوایای EHG و FEH نسبت به هم چگونه‌اند؟ چرا؟  
 پ) ترهای GH و EF نسبت به هم چگونه‌اند؟ چرا؟

### نتیجه


دو وتر که یکدیگر را درون دایره قطع نمی‌کنند با هم موازی‌اند، اگر و تنها اگر کمان‌های محدود بین آنها مساوی باشد.

تاکنون زاویه‌هایی را بررسی کردیم که رأس آنها روی دایره باشد و رابطه اندازه این زاویه‌ها را با اندازه کمان‌های ایجاد شده توسط آنها مشخص کردیم. حال به بررسی این موضوع برای زاویه‌هایی می‌پردازیم که رأس آنها درون یا بیرون دایره است و اضلاعشان کمان‌هایی روی دایره جدا می‌کنند.

### فعالیت

- ۱- فرض کنید رأس زاویه DAE مانند شکل مقابل بیرون دایره واقع شده، و کمان‌های DE و BC توسط اضلاع زاویه موردنظر مشخص شده باشد.  
 الف) از نقطه C خطی موازی خطا BD رسم کنید تا دایره را در نقطه‌ای مانند F قطع کند. علت هرکدام از تساوی‌های زیر را مشخص کنید.

$$\widehat{DAE} = \widehat{FCE} = \frac{1}{2} \widehat{FE} = \frac{1}{2} (\widehat{DE} - \widehat{DF}) = \frac{1}{2} (\widehat{DE} - \widehat{BC})$$



ب) از C به D وصل کنید و به کمک زاویه خارجی در مثلث ACD رابطه فوق را اثبات کنید.

۲- رأس زاویه DAE مانند شکل در درون دایره است و اضلاع این زاویه کمان‌های BC و DE را مشخص کرده‌اند.

الف) از نقطه B خطی موازی خط DC رسم کنید تا دایره را در نقطه‌ای مانند F قطع کند. علت هر کدام از تساوی‌های زیر را مشخص کنید.

$$\widehat{DAE} = \widehat{FBE} = \frac{1}{2} \widehat{FE} = \frac{1}{2} (\widehat{FD} + \widehat{DE}) = \frac{1}{2} (\widehat{BC} + \widehat{DE})$$


ب) از B به D وصل کنید و به کمک زاویه خارجی مثلث ABD رابطه فوق را اثبات کنید.



۱- در شکل‌های زیر ثابت کنید :

$\beta E \parallel AM \Rightarrow \widehat{AE} = \widehat{AB}$  ①  
راهنمایی: از نقطه B خطی موازی ضلع دیگر زاویه رسم کنید.

$AM \parallel BE / M_B \Rightarrow \widehat{M} = \widehat{B}$  ②  $n+y=34^\circ$




(۱)

$$\widehat{B}_r = \frac{\widehat{BE}}{2}$$

$$\widehat{B_r} = \frac{\widehat{ACB} - \widehat{AEC}}{2}$$

(۲)





$$\widehat{M} = \frac{\widehat{BC} - \widehat{AB}}{2}$$

$$\widehat{M_r} = \frac{\widehat{BEC}}{2}$$

$$\widehat{M_r} = \frac{\widehat{ACB} - \widehat{AEC}}{2}$$

$$\widehat{M_r} = \frac{\widehat{ACB} - \widehat{ADB}}{2}$$


تمرين



الف) ثابت کنید  $d_1 \parallel d_2$

$$\widehat{AC} = \widehat{AD} \quad \text{الله يعاصي}$$

$$\widehat{M} = \frac{\widehat{ACB} - \widehat{ADB}}{2}$$



۲- در شکل مقابله اندازه زاویه  $\alpha$  را بدست آورید.

$$\frac{n-y}{2} = 31 \rightarrow n-y = 62$$


$$\frac{n+y}{2} = 91 \rightarrow n+y = 182$$

$$n = 122$$

$$122 + y = 182$$

$$y = 60^\circ$$

$$\hat{A} = \alpha + \gamma$$




۳- در شکل اضلاع زاویه‌های B و C بر دایره مماس‌اند. اندازه زاویه  $\hat{A}$  چند درجه است؟

$$\begin{aligned} 180^\circ &= \alpha + \beta + \gamma - \delta \\ 180^\circ &= \alpha + \gamma + \delta - \beta \\ \frac{180^\circ}{2} &= \frac{\gamma + \delta}{2} \\ \nu_\Delta &= \frac{\gamma + \delta}{2} = \hat{A} \end{aligned}$$

۴- در دایره رسم شده شکل مقابل مقابله،  $CD \parallel AB$ ، اندازه کمان  $CD$  را به دست آورید.

$$\begin{aligned} \nu_\Delta &= n + \frac{n}{r} \Rightarrow \frac{\pi}{r} n = \nu_\Delta \\ n &= \nu_\Delta \end{aligned}$$




۵- در شکل مقابل، AB قطری از دایره است و وترهای AC و BD موازی‌اند.

$$\begin{aligned} \text{ثابت کنید: } AC &= BD : \quad \widehat{CB} = 180^\circ - \widehat{AB} \Rightarrow \widehat{AC} = \widehat{BD} \\ \widehat{CB} = \widehat{AD} \longrightarrow 180^\circ - \widehat{CB} &= 180^\circ - \widehat{AB} \Rightarrow \widehat{AC} = \widehat{BD} \\ \text{ویرایش نظریه مانعی} & \quad \boxed{\widehat{AC} = \widehat{BD}} \\ \text{برای بجای} & \end{aligned}$$

۶- دایرة C(O,R) مفروض است. از نقطه M در خارج دایره خطی چنان رسم

کردند ایم که دایره را در دو نقطه A و B قطع کرده است و  $MA = R = R$ ; نشان دهید:  $\beta = 3\alpha$




$$\begin{aligned} \text{مشتق اول فصل} \quad \widehat{D_1} &= \widehat{AC} = \alpha & M &= \frac{\widehat{BD} - \widehat{AC}}{r} \\ \widehat{O_1} - \widehat{M} &= \alpha \quad \text{کفر } \widehat{O_1} = \widehat{BD} = \beta & \alpha &= \frac{\beta - \alpha}{r} \Rightarrow 2\alpha = \beta - \alpha \\ \beta &= 3\alpha \end{aligned}$$

۷- در دایرة C(O,R) فاصله O از وتر AB  $= 1^\circ$  و  $\widehat{AB} = 60^\circ$ ، آورید.

$$\begin{aligned} \widehat{AB} &= 90^\circ \longrightarrow AB = R = 10 \\ OH^2 + \alpha^2 &= 10^2 \longrightarrow OH = \sqrt{10} \end{aligned}$$

۸- در دایرة C(O,R) نشان دهید  $AB > CD$  (اگر و تنها اگر  $OH < OH'$ )

(راهنمایی: از O به B و C وصل، و از قضیه فیثاغورس استفاده کنید.)



$$\begin{aligned} \widehat{AOH} : OH^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2 &= R^2 \\ OCH' : OH'^2 + \left(\frac{CD}{2}\right)^2 &= R^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AB > CD \rightarrow \frac{AB}{2} > \frac{CD}{2} \\ OH^2 < OH'^2 \rightarrow OH < OH' \end{aligned}$$

(فرض)

(حکم)

(فرض)

(حکم)

$$\begin{aligned} OH^2 + \frac{AB^2}{4} &= OH'^2 + \frac{CD^2}{4} \\ OH^2 < OH'^2 &\rightarrow \frac{AB^2}{4} > \frac{CD^2}{4} \rightarrow AB > CD \end{aligned}$$

## رابطه‌های طولی در دایره

اگر خط‌های شامل دو وتر از یک دایره، یکدیگر را در درون یا بیرون دایره قطع کنند بین اندازه‌پاره‌خط‌های حاصل روابطی داریم که به بررسی آنها می‌پردازیم.

### فعالیت

۱- دو وتر AB و CD در نقطه M در داخل دایره یکدیگر را قطع کرده‌اند.

الف) از A به D و از C به B وصل کنید و نشان دهید دو مثلث MAD و MBC متشابه‌اند.

$$\frac{AM}{CM} = \frac{DM}{BM} \dots\dots$$

۱ و در تنتیجه:  $AM \cdot DM = CM \cdot BM$

۲- خط‌های شامل دو وتر AB و CD در نقطه M در خارج دایره یکدیگر را قطع کرده‌اند.

الف) نقطه A را به D و نقطه C را به B وصل کنید و نشان دهید دو مثلث MCB و MCA متشابه‌اند.




$$\frac{MA}{MC} = \frac{MD}{MB} \dots\dots$$

۲ و در تنتیجه:  $MA \cdot MD = MC \cdot MB$

**قضیه:** هرگاه خط‌های شامل دو وتر دلخواه AB و CD در نقطه‌ای مانند M درون یا بیرون دایره یکدیگر را قطع کنند. آنگاه:  $MA \cdot MB = MC \cdot MD$

۳- فرض کنیم از نقطه M (خارج دایره) مانند شکل یک مماس و یک قاطع بر دایره رسم کرده‌ایم.

الف) T را به A و B وصل، و مشخص کنید چرا  $\widehat{MTA} = \widehat{TBM}$



(ب) علت تشابه دو مثلث MAT و MTB را مشخص، و با توجه به این تشابه رابطه زیر را کامل کنید.

$$\frac{MA}{MT} = \frac{MT}{MT'} \dots\dots$$

$$MT' = \dots\dots\dots\dots$$

بنابراین قضیه زیر را داریم :

**قضیه:** هرگاه M نقطه‌ای بیرون دایره باشد و از M مماس و قاطعی نسبت به دایره رسم کنیم، مربع اندازه مماس برابر است با حاصل ضرب اندازه‌های دو قطعه قاطع

يعني طول مماس واسطه هندسی بين دو قطعه قاطع است.

### ■ رسم مماس بر دایره از نقطه‌ای خارج دایره

اگر خط d در نقطه T بر دایره مماس باشد و A و M دو نقطه بر خط d در دو طرف نقطه T باشد، هر کدام از پاره خط‌های MT و AT بر دایره مماس‌اند.

اگر O مرکز دایره باشد،  $\Delta OMT$  در رأس T قائم الزاویه است؛ چرا؟



اگر N وسط پاره خط OM باشد،  $OM = NO = NT$ ؛ چرا؟

بنابراین دایره به مرکز N و قطر OM از نقطه T می‌گذرد.

از این ویژگی می‌توانیم در رسم مماس بر دایره از نقطه M خارج دایره بر آن استفاده کنیم.

پس برای رسم مماس بر دایره از نقطه M خارج دایره، ابتدا دایره‌ای به قطر OM (O مرکز دایره) رسم می‌کنیم.

این دایره، دایره مفروض را در دو نقطه T و T' قطع می‌کند. خط‌های MT و MT' بر دایره مماس‌اند؛ چرا؟



هرگاه از نقطه  $M$  خارج دایره  $C(O, R)$  دو مماس بر دایره رسم کنیم و  $T$  و  $T'$  نقاط

تماس باشند، ثابت کنید :

(الف) اندازه‌های دو مماس برابرند.


(ب) نیم خط  $MO$  نیمساز زاویه  $TMT'$  است.

### ■ حالت‌های دو دایره نسبت به هم و مماس مشترک‌ها

دو دایره  $C(O, R)$  و  $C'(O', R')$  را با فرض  $R' > R = d$  درنظر می‌گیریم.

حالت‌های مختلفی که این دو دایره می‌توانند نسبت به هم داشته باشند به صورت زیر است :


	$d > R + R'$	دو دایره برون هم (متخارج)
	$d = R + R'$	دو دایره مماس برون
	$R - R' < d < R + R'$	دو دایره متقاطع
	$d = R - R'$	دو دایره مماس درون
	$d < R - R'$	دو دایره متداخل
	$d = 0$	دایره‌های هم مرکز



هر خطی یا پاره خطی که بر هر دو دایره مماس باشد، مماس مشترک دو دایره است. اگر دو دایره در یک طرف خط باشند، آن را مماس مشترک خارجی، و اگر دو دایره در دو طرف خط باشند آن را مماس مشترک داخلی می‌نامند.

### فعالیت

۱- فرض کنیم مانند شکل خط  $m$  در نقاط  $T$  و  $T'$  بر دو دایره مماس است و شعاع‌های  $OT$  و  $O'T'$  رسم شده‌است. فرض کنیم فاصله بین مرکزهای دو دایره برابر  $d$  باشد؛ از  $O'$  خطی موازی خط  $m$  رسم می‌کنیم تا شعاع  $OT$  را در نقطه‌ای مانند  $H$  قطع کند.



الف)  $TT'H$  مستطیل است؛ چرا؟

ب) با توجه به قضیه فیثاغورس در مثلث  $O'H O$ ، تساوی زیر را توجیه کنید.

$$TT' = \sqrt{d^2 - (R - R')^2}$$


پ) با توجه به کار در کلاس قبل بگویید چرا اگر دو مماس مشترک  $m$  و  $n$  متقاطع باشند، نقطه تقاطع آنها روی خط  $O'O'$  خواهد بود؟

ت) به مرکز  $O$  و به شعاع  $R$ - $R'$  دایره‌ای رسم کنید. پاره خط  $H'O'$  برای دایره رسم شده چگونه خطی است؟


ث) فرض کنید دو دایره داده شده، و رسم مماس مشترک خواسته شده باشد. از آنجا که مرکزها و شعاع‌های دو دایره معلوم است، می‌توان دایره مطرح شده در قسمت (ت) را رسم کرد و سپس مماس  $H'O'$  را بر آن رسم کرد؛ در این صورت چگونه می‌توانید مماس  $TT'$  را رسم کنید؟

۲- دو مماس مشترک داخلی و خارجی بر دو دایره متساوی‌النطاق مطابق شکل رسم شده است.  
با به کار بردن قضیه فیثاغورس در  $\Delta O'OH$  نشان دهید :

$$TT' = \sqrt{d^2 - (R + R')^2}$$



۳- دو دایره مماس. دو دایره را که فقط یک نقطه مشترک داشته باشند، مماس نامند. در این نقطه مشترک یک خط بر هر دو مماس است. اگر مراکز دو دایره در دو طرف این مماس باشند، آن دو دایره، مماس برونوی است و اگر هر دو مرکز در یک طرف این مماس باشند، آنها را مماس درونی می‌نامند.



مماس خارجی؛  
سه مماس مشترک دارند.  
 $OO' = R + R'$

مماس داخلی؛  
 فقط یک مماس مشترک دارند.  
 $OO' = |R - R'|$

با استفاده از دستور محاسبه طول مماس مشترک خارجی، نشان دهید در دو دایره مماس خارجی،



$$TT' = 2\sqrt{RR'}$$

۴- دو دایره متقاطع. دو دایره را که دو نقطه مشترک داشته باشند، متقاطع می‌نامند.  
در این حالت دو دایره، فقط دو مماس مشترک دارند.  
 $|R - R'| < OO' < R + R'$ ؛ چرا؟

پاره خط AB، که دوسر آن روی هر دو دایره است، وتر مشترک دو دایره متقاطع است. چرا پاره خط OO' عمود منصف وتر مشترک AB است؟

۵- دو دایره متداخل. دو دایره را که تمام نقاط یکی درون دیگری باشد، متداخل می‌نامیم. دو دایره متداخل هیچ مماس مشترک ندارند و در آنها  $|R - R'| < OO'$  است.

- رسم مماس مشترک داخلی دو دایره از اهداف این کتاب نیست.



$$OO' < |R - R'|$$




۱- در دایره  $C(O,R)$  و تر  $AB$ ، و تر  $CD$  به طول  $9$  سانتی متر را به نسبت  $1$  به  $2$  تقسیم کرده است. اگر  $AB = 11\text{cm}$ ، آن گاه و تر  $CD$  و تر  $AB$  را به چه نسبتی قطع می کند؟

$$* 3x9 = x \times (11-x)$$

$$11x = 11m - m^2$$

$$m^2 - 11m + 11 = 0$$





۲- از نقطه  $P$  در خارج دایره ای، مماس  $PA$  به طول  $\sqrt{3} + 1$  را بر آن رسم کرده ایم (روی دایره است). همچنین خطی از  $P$  گذرانده ایم که دایره را در دو نقطه  $B$  و  $C$  قطع کرده است. طول های  $PB$  و  $PC$  را به دست آورید.

۳- در شکل مقابل، دو دایره برحهم مماس و دو قطر  $AB$  و  $CD$  از دایره بزرگ تر برحهم عمودند. اگر  $AM = 16$  و  $ND = 10$ ، شعاع های دو دایره را پیدا کنید.

۴- مطابق شکل مقابل، تمام دایره ها در نقطه  $T$  برحهم مماس اند و از نقطه  $M$  روی مماس مشترک آنها بر دایره ها مماس رسم کرده ایم؛ ثابت کنید


$$MT_1 = MT_2 = MT_3 = MT_4 = \dots$$

۵- طول شعاع های دو دایره متقاطع را به دست آورید که طول مماس مشترک خارجی آنها مساوی  $3\sqrt{7}$  و طول مماس مشترک داخلی آنها  $\sqrt{15}$  و طول خط مرکزین آنها مساوی  $8$  واحد است.




$$= 2\pi r$$

۶- سه دایره به شعاع های برابر  $r$  دو به دو برحهم مماس اند. مطابق شکل مقابل این سه دایره به وسیله نخی بسته شده اند. نشان دهید طول این نخ برابر  $6r + 2\pi r$  است. همچنین نشان دهید مساحت ناحیه محدود به سه دایره برابر  $(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2})r^2$  است.



۷- طول خط مرکزین دو دایره مماس درونی  $2$  سانتی متر مساحت ناحیه محدود بین آنها  $16\pi$  سانتی مترمربع است. طول شعاع های دو دایره را به دست آورید.



۸- مطابق شکل دایره به شعاع  $4$ ، مساحت ناحیه سایه زده را محاسبه کنید. این ناحیه، یک قطعه دایره نام دارد.

## چند ضلعی های محاطی و محیطی

چند ضلعی را محاطی می گوییم اگر و فقط اگر دایره ای باشد که از همه رئوس آن بگذرد؛ در این صورت دایره را دایرة محیطی آن چند ضلعی می نامیم.

به طور مثال ABCDE یک پنج ضلعی محاطی است.

می دانیم برای اینکه دایره ای از دو نقطه بگذرد، باید مرکز آن روی عمود منصف پاره خطی باشد که آن دو نقطه دو سر آن است؛ بنابراین :

یک چند ضلعی، محاطی است اگر و فقط اگر عمود منصف های همه ضلع های آن در یک نقطه همرس باشند.

این نقطه مرکز دایره محیطی چند ضلعی است. چرا؟

چند ضلعی را محیطی می گوییم اگر و فقط اگر دایره ای باشد که بر همه ضلع های آن مماس باشد؛ در این صورت دایره را دایرة محاطی این چند ضلعی می نامیم.

### فعالیت

فرض کنید دایره C بر دو ضلع زاویه ای مانند شکل مماس باشد.




(الف)

۱- پاره خط هایی که مرکز دایره را به نقاط تماس اضلاع با دایره وصل می کند، رسم کنید و آنها را OB و OA بنامید.



۲- پاره خط های OA و OB برای دایره چه نوع پاره خطی هستند؟

۳- فاصله نقطه O (مرکز دایره) تا ضلع های زاویه مفروض با طول پاره خط های رسم شده (OA و OB) چه رابطه ای دارد؟

۴- با توجه به (۲) و (۳) فاصله مرکز دایره از دو ضلع زاویه ..... و بنابراین نقطه O روی .....




۵- فرض کنید مانند شکل مقابل، دایره در یک چند ضلعی محاط شده باشد. چرا مرکز دایره، محل برخورد نیمسازهای زاویه‌های داخلی چند ضلعی است؟



ب) فرض کنید یک چند ضلعی مانند شکل مقابل به گونه‌ای باشد که نیمسازهای زوایای داخلی آن در نقطه O یکدیگر را قطع کرده باشند و OH پاره خط عمود به یک ضلع چند ضلعی باشد. دایره‌ای به مرکز O و شعاع OH برای چند ضلعی مفروض چه نوع دایره‌ای است؟ چرا؟


بنابراین: یک چند ضلعی، محیطی است اگر و فقط اگر همه نیمسازهای زاویه‌های آن در یک نقطه هم‌مرس باشند. این نقطه مرکز دایره محاطی چند ضلعی است.



### کاردکلاس

اگر در یک  $n$  ضلعی محیطی با مساحت  $S$  و محیط  $2P$  شعاع دایره محاطی برابر  $r$  باشد، نشان دهید  $S=rp$ .

راهنمایی: کافی است مساحت  $n$  مثلث را محاسبه، و با هم جمع کنید.




$$OA = OB = OC = R$$

### دایره‌های محیطی و محاطی مثلث

قبل‌آمدی سه عمود منصف یک مثلث را ثابت کردایم؛ بنابراین نقطه هم‌مرسی سه عمود منصف مثلث، تنها نقطه‌ای است که از سه رأس یک مثلث به یک فاصله است. پس اگر دایره‌ای به مرکز نقطه تلاقی سه عمود منصف و به شعاع فاصله این نقطه تا یک رأس رسم کنیم، این دایره از هر سه رأس مثلث می‌گذرد؛ یعنی دایره محیطی مثلث است. در نتیجه مثلث همواره محاطی است.

همچنین ثابت کردایم سه نیمساز زاویه‌های داخلی مثلث در نقطه‌ای درون مثلث هم‌مرس‌اند. در نتیجه مثلث، محیطی نیز هست. بنابر ویژگی نیمساز، این نقطه از هر سه ضلع مثلث به یک فاصله است.


پس مرکز دایره محاطی مثلث نقطه هم‌مرسی سه نیمساز است و شعاع این دایره، که آن را با  $r$  نشان می‌دهیم، فاصله این نقطه از هر یک از سه ضلع است. بنابر آنچه در مورد  $n$  ضلعی‌های محیطی نشان دادیم در مثلث نیز  $S=pr$  که مساحت  $P$  نصف محیط مثلث است.



$$OH = OH' = OH'' = r$$

اگر نیمساز زاویه A از  $\Delta ABC$  را رسم کنیم، نیمساز زاویه خارجی C را در نقطه‌ای مانند O قطع می‌کند. این نقطه از خط BC و خط‌های AC و AB به یک فاصله است؛ چرا؟ بنابراین O نیز مرکز دایره‌ای است که بر ضلع BC و خط‌های شامل دو ضلع دیگر مماس است. این دایره را دایره محاطی خارجی نظیر رأس A می‌نامند.

شعاع این دایره را با  $r_a$  نشان می‌دهند؛ به همین ترتیب دو دایره محاطی خارجی دیگر نظیر دو رأس B و C وجود دارد.



اکنون در فعالیت زیر محاسبه شعاع دایره محاطی خارجی را بررسی می‌کنیم.

### فعالیت


در شکل داریم  $S(ABC) = S(OAC) + S(OAB) - S(OBC)$ : اگر مساحت  $2p$  را به  $S$  شان دهیم،  $S = \frac{1}{2}r_a(p-a)$ . اگر محیط مثلث را با  $2p=a+b+c$  نشان دهیم، داریم  $S = r_a(p-a)$ : پس  $r_a = \frac{S}{p-a}$ ؛ در نتیجه  $r_a = r_b = r_c$  باشند. بنابراین به طور مشابه برای اضلاع دیگر داریم:

$$r_a = \frac{S}{p-a}$$

$$r_b = \frac{S}{p-b}$$


$$r_c = \frac{S}{p-c}$$

برخلاف مثلث، همه چند ضلعی‌های دیگر، لزوماً محاطی یا محیطی نیستند. در بخش بعد به شرایط محاطی یا محیطی بودن یک چهارضلعی می‌پردازیم.



## ■ چهار ضلعی های محاطی و محیطی

قضیه: یک چهار ضلعی محاطی است، اگر و فقط اگر دو زاویه متقابل آن مکمل باشند.




### اثبات

۱- فرض کنیم چهار ضلعی ABCD محاطی باشد؛ مجموع اندازه های  $\hat{C}$  ،  $\hat{A}$  نصف مجموع اندازه های کمان های DCB و DAB است؛ اما مجموع اندازه های این دو کمان ..... است و در نتیجه مجموع اندازه های  $\hat{A}$  ،  $\hat{C}$  برابر ..... است. به همین ترتیب  $\hat{B}$  ،  $\hat{D}$  مکمل اند.

۲- فرض کنیم  $\hat{A}$  ،  $\hat{C}$  مکمل باشند. با برهان خلف ثابت می کنیم چهارضلعی ABCD محاطی است. از سه نقطه B, C و D همواره یک دایره می گذرد؛ چرا؟

اگر این دایره از A نگردد، خط AD را در نقطه ای دیگری مانند  $A'$  قطع می کند که  $A'$  بین A و D یا  $A'$  و A است. اکنون چهارضلعی  $A'BCD$  ..... است؛ پس  $\hat{C}$  و  $\widehat{BA'D}$  مکمل اند؛ در نتیجه باید  $\hat{A}$  و  $\hat{A}'$  همان اندازه باشند و این ممکن نیست؛ چرا؟

در نتیجه  $A'$  همان A است.



قضیه: یک چهارضلعی محیطی است اگر و فقط اگر مجموع اندازه های دو ضلع متقابل، برابر مجموع اندازه های دو ضلع دیگر باشند.

اساس اثبات بر این است که اگر از نقطه ای بیرون دایره دو مماس بر دایره رسم کنیم دو پاره خط مماس همان اندازه اند.

### اثبات

۱- اگر چهارضلعی  $ABCD$  محیطی باشد،  
 $AB+CD=AM+\dots+PC+\dots=AQ+\dots+CN+\dots=AD+BC$   
 عکس این قضیه نیز با برهان خلف ثابت می شود.

۲- فرض کنید :  $AB+CD=BC+AD$

نیمسازهای دو زاویه  $B$  و  $C$  همیگر را در نقطه‌ای مانند  $I$  قطع می‌کنند. با توجه به ویژگی نیمساز، چرا نقطه  $I$  از سه ضلع  $CD$  و  $BC$  و  $AB$  به یک فاصله است؟ ( $IM=IN=IP$ )  
 چرا دایره‌ای به مرکز  $I$  و شعاع  $IM$  بر  $AB$  و  $CD$  مماس است؟ حال اگر این دایره بر  $AD$  هم مماس باشد، حکم ثابت شده است.

اما اگر این دایره بر  $AD$  مماس نباشد از  $A$  بر آن مماسی رسم می‌کنیم تا خط  $CD$  را در نقطه‌ای مانند  $E$  قطع کند؛ در این صورت  $E$  بین  $P$  و  $D$  یا  $D$  بین  $E$  و  $P$  واقع می‌شود.  
 پس،  $AB+EC=AE+BC$ ؛ (چرا؟) از این رابطه با استفاده از رابطه فرض چگونه نتیجه می‌گیرید :  $AD=DE+AE$  ؟

این رابطه امکان ندارد؛ (چرا؟) پس  $E$  همان  $D$  است و دایره بر ضلع  $AD$  نیز مماس است.

### کاردرکلاس



جدول زیر را کامل کنید.


کایت	ذوزنقه متساوی الساقین	ذوزنقه مستطیل	لوزی	متوازی الاضلاع	ذوزنقه	مربع	
...	...	...	...	...	...	✓	محاطی
...	...	...	...	...	...	✓	محیطی

از دیگر چندضلعی‌های محاطی و محیطی، چندضلعی‌های منتظم است.

یک چندضلعی محدب را منتظم می‌نامند، هرگاه تمام ضلع‌های آن هماندازه و تمام زاویه‌های آن نیز هماندازه باشند.

مثلث متساوی الاضلاع سه ضلعی منتظم و مربع چهارضلعی منتظم است.





در فعالیت زیر نشان می‌دهیم هر چندضلعی منتظم، هم محاطی و هم محیطی است :

### فعالیت

فرض کنید اندازه هر زاویه  $n$  ضلعی منتظم ...،  $ABCD \dots$  باشد؛ عمود منصف‌های دو ضلع  $AB$  و  $BC$  را رسم می‌کنیم. فرض کنیم در  $O$  متقاطع‌اند. بنابراین  $OA = \dots = OC$ .

$\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \widehat{OBC} = \widehat{OCB} = \alpha$  چرا؟  $\Delta OAB \cong \Delta OBC$   
اکون از  $D$  به  $O$  وصل می‌کنیم. چرا اندازه  $\widehat{OCD}$  برابر  $\alpha$  است؟ چرا  
 $OA = OB = OC = OD$  و  $\Delta OCD \cong \Delta OCB$

با ادامه این روند داریم :

$OA = OB = OC = OD = \dots$  و  $OH = ON = OM = \dots$  بنابراین،  $O$  از همه رأس‌ها به یک فاصله است؛ پس مرکز دایره‌ای است که از تمام رأس‌های  $n$  ضلعی منتظم می‌گذرد.

به همین ترتیب  $O$  از تمام ضلع‌ها به یک فاصله است؛ پس مرکز دایره‌ای است که بر تمام ضلع‌های  $n$  ضلعی منتظم مماس است.

### تمرین

۱- ثابت کنید یک ذوزنقه، محاطی است، اگر و تنها اگر متساوی الساقین باشد.

۲- مساحت مثلث متساوی الاضلاعی را به دست آورید که در دایره‌ای به شعاع  $R$  محاط شده باشد.

۳- ثابت کنید عمود منصف یک ضلع هر مثلث و نیمساز زاویه مقابل به آن ضلع، یکدیگر را روی دایره محیطی مثلث قطع می‌کنند.

۴- یک ذوزنقه، هم محیطی است و هم محاطی. ثابت کنید مساحت این ذوزنقه برابر است با میانگین حسابی دو قاعده آن ضرب در میانگین هندسی آنها.

۵- اگر  $r_a$ ,  $r_b$  و  $r_c$  شعاع‌های سه دایره محاطی خارجی مثلث و  $r$  شعاع دایره محاطی داخلی باشد، نشان دهید.

$$\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} = \frac{1}{r}$$

به همین ترتیب اگر  $h_a, h_b$  و  $h_c$  اندازه‌های سه ارتفاع باشند، نشان دهید:

$$\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{r}$$


۶- اگر نقاط تماس دایره محاطی داخلی مثلث ABC با اضلاع آن K و M و N باشند و T و T' نقطه‌های تماس یک دایره محاطی خارجی با خط‌های شامل دو ضلع باشند، نشان دهید:

$$AM = AN = P - a$$



$$BN = BK = P - b, CM = CK = P - c$$

$$AT = AT' = P$$

۷- یک دایره به شعاع  $r$  و  $n$  ضلعی‌های منتظم محاطی و محیطی در آن در نظر بگیرید. نشان دهید اگر AB و CD اندازه‌های ضلعی‌های  $n$  ضلعی منتظم محیطی و محاطی باشند، آن‌گاه  $CD = 2r \sin \frac{18^\circ}{n}$  و  $AB = 2r \tan \frac{18^\circ}{n}$ .



۸- دو قطر عمود بر هم AC و BD از یک دایره را رسم می‌کنیم؛ چهارضلعی ABCD یک مربع است؛ چرا؟ عمود منصف‌های ضلع‌های این مربع را رسم کنید تا دایره را قطع کنند. نشان دهید هشت ضلعی AMBQCPDN منتظم است.





## تبديل‌های هندسی و کاربردها



عکس: محمد رضا دوستیگیان

تبديل‌های هندسی با بسياري از مفاهيم هندسي از جمله همنهشتی ارتباط نزديکی دارند. همچنين کاربردهای فراوانی در صنعت، معماری و هنر دارند. خلق بناهای تاریخی که از دستاوردهای با ارزش بشر به شمار می‌آيد، بدون به کارگیری تبدیل‌های هندسی ميسر نمی‌شد. عمارت مسجد نصیرالملک در شيراز نمونه‌ای زيبا از اين مطلب است.



## تبديل‌های هندسی

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده‌های اطرافمان نظیر طراحی پارچه، نقش فرش، کاشی کاری، گچ بری و ... شکل‌های مختلف، طبق الگویی خاص تکرار می‌شود. در این فصل وضعیت‌های مختلفی را که هر شکل مشخص در اثر حرکت مجموعه نقاط در صفحه پیدا می‌کند، مطالعه و بررسی خواهیم کرد.

این حرکت‌ها می‌توانند دارای ویژگی‌های خاص قابل تعریف باشد؛ حرکاتی که سال‌های قبل با نمونه‌هایی از آن آشنا شده‌اید و با توجه به نوع این ویژگی‌ها، آنها را انتقال، بازتاب (تقارن محوری) یا دوران نامیده‌اید. انتقال، بازتاب و دوران را تبدیل‌های هندسی می‌نامیم.

تبديل‌های مطرح شده در این کتاب می‌توانند **موقعیت<sup>۱</sup>** (جاگاه شکل در صفحه) یا **اندازه<sup>۲</sup> شکل** را تغییر دهد.  
تبديل یافته یک شکل را، **تصویر** آن می‌نامیم.

در سال‌های گذشته با مفاهیم بازتاب، انتقال و دوران تا حدودی آشنا شدید. در این فعالیت، این تبدیل‌ها و برخی ویژگی‌های آنها را به‌طور شهودی مرور و یادآوری خواهیم کرد.

### فعالیت

۱- به تصویر رویه را دقت کنید.

اگر چهارضلعی‌های ۱، ۲ و ۳ را تبدیل یافته چهارضلعی رنگ شده بدانیم :



الف) کدام چهارضلعی، انتقال یافته چهارضلعی رنگ شده است؟

ب) کدام چهارضلعی بازتاب چهارضلعی رنگ شده است؟

پ) کدام شکل، دوران یافته شکل رنگ شده است؟

۱ – Position

۲ – Size






۲- الف) بازتاب شکل رو به رو را نسبت به خط  $d$  رسم کنید.  
(توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید. در این حالت خط  $d$  نسبت به پاره خطی که هر نقطه را به تصویرش نظیر می‌کند، چه وضعیتی دارد؟)

ب) آیا این تبدیل، موقعیت شکل اولیه را تغییر می‌دهد؟  
اندازه‌ها را چطور؟

پ) آیا در این تبدیل، شیب هر پاره خط باشیب پاره خط متناظر در تصویر آن برابر است؟  
ت) آیا حالت وجود دارد که بازتاب، شیب خط را حفظ کند؟




۳- الف) تصویر شکل رو به رو را تحت انتقال با بردار  $v$  رسم کنید (توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید).


در این حالت پاره خط‌هایی که هر نقطه را به تصویرش نظیر می‌کنند، نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟

ب) آیا این تبدیل، موقعیت شکل اولیه را حفظ می‌کند؟  
اندازه‌ها را چطور؟

پ) آیا در این تبدیل، شیب هر پاره خط باشیب پاره خط متناظر در تصویر آن برابر است؟  
ت) آیا با انجام این تبدیل اندازه زاویه‌ها ثابت می‌ماند؟



۴- در سال‌های گذشته دیدید که برای دوران دادن هر شکل به مرکز دوران  $O$  به اندازه زاویه  $\alpha$ ، کافی است هر نقطه از شکل، مثل نقطه  $A$  را به مرکز دوران یعنی  $O$  وصل کنیم؛ سپس در جهت خواسته شده به کمک  $OA$  زاویه‌ای برابر  $\alpha$  رسم، و روی ضلع دیگر این زاویه پاره خطی به اندازه  $OA$  جدا کنیم تا نقطه  $A'$  به دست آید.



می‌خواهیم مثلث  $ABC$  را حول مرکز  $O$ ،  $90^\circ$  درجه در جهت حرکت عقربه‌های ساعت دوران دهیم؛ به ترتیبی که گفته شد نقاط  $A$  و  $B$  را دوران داده‌ایم.

الف) به همین ترتیب تصویر نقطه  $C$  را پیدا، و شکل را کامل کنید.  
ب) آیا این تبدیل، موقعیت شکل اولیه را حفظ می‌کند؟  
اندازه‌ها را چطور؟

پ) آیا در این تبدیل، همواره شیب پاره خط اولیه با شیب پاره خط تصویر آن برابر است؟

ت) آیا می‌توانید زاویه دوران را طوری تعیین کنید که دوران تحت آن، شیب خط را حفظ کند؟

به طور شهودی می‌توان دید که بازتاب، انتقال و دوران، می‌توانند موقعیت شکل را تغییر دهند ولی اندازه پاره‌خطها و زاویه‌ها را تغییر نمی‌دهند.

در ادامه این فصل با تبدیل آشنا خواهید شد که در آن اندازه زاویه‌ها حفظ می‌شود ولی برخلاف سه تبدیل صفحه‌قبل، اندازه پاره‌خط‌ها می‌تواند تغییر کند. این تبدیل را تجانس می‌نامیم. حال که به طور شهودی، برخی ویژگی‌های تبدیل‌های مختلف را مرور کردیم در ادامه با دقت بیشتری به تعریف تبدیل، معرفی، ویژگی‌ها و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

**تعریف: تبدیل  $T^1$**  در صفحه  $P$ ، تابعی است که به هر نقطه  $A$  از صفحه  $P$  دقیقاً یک نقطه مانند  $A'$  را از همان صفحه نظیر می‌کند و بر عکس؛ هر نقطه  $A'$  از صفحه  $P$ ، تصویر دقیقاً یک نقطه  $A$  از همان صفحه است.

اگر تبدیل را با حرف  $T$  نمایش دهیم به اختصار چنین می‌نویسیم:

$$T: P \rightarrow P$$

$$T(A) = A'$$

پیش از این به طور شهودی دریافتیم که بازتاب، انتقال و دوران طول پاره‌خط را حفظ می‌کنند؛ یعنی اندازه پاره‌خطی مثل  $AB$  در شکل اولیه با اندازه پاره‌خط  $A'B'$  در تصویر آن برابر است. این ویژگی را اصطلاحاً طولپایی یا ایزومنتری می‌نامیم.

**تعریف: تبدیل‌هایی که طول پاره‌خط را حفظ می‌کنند، تبدیلات طولپایی (ایزومنتری) نامیده می‌شوند.**

به عبارتی اگر داشته باشیم:  $AB = A'B'$  و  $T(A) = A'$  و  $T(B) = B'$ ، آن‌گاه داریم:

پیش از این به طور شهودی پذیرفتیم که در تبدیل‌هایی که مرور شد، اندازه زاویه حفظ می‌شود. در این فعالیت برای تبدیلات طولپایی این ادعا را اثبات می‌کنیم و در ادامه طولپایی بودن بازتاب، انتقال و دوران را به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

### فعالیت


می‌خواهیم شان دهیم هر تبدیل طولپایاندازه زاویه را حفظ می‌کند.  
فرض کنید  $T$  تبدیلی طولپایاست.

و داریم:

$$T(A) = A'$$

$$T(B) = B'$$

$$T(O) = O'$$





دلیل همنهشتی دو مثلث  $OAB$  و  $O'A'B'$  را بنویسید و از آنجا برابری زاویه‌های  $\angle AOB$  و  $\angle O'A'B'$  را نتیجه بگیرید.  
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:

**قضیه:** در هر تبدیل طولپا، تبدیل یافته هر زاویه، زاویه‌ای هماندازه آن است.


در تبدیلهای مطرح شده در این کتاب، می‌توان ثابت کرد که تبدیل یافته هر خط، یک خط است. بنابراین برای پیدا کردن تبدیل یافته یک خط، کافی است تبدیل یافته دو نقطهٔ دلخواه از آن را پیدا و خط گذرنده از آن دو را رسم کنیم. این مطلب برای یک پاره‌خط هم صادق است. کافی است تبدیل یافته دو نقطهٔ ابتداء و انتهای پاره‌خط را به دست آوریم و به هم وصل کنیم.<sup>۱</sup>

حال با استدلال دقیق‌تری بازتاب، انتقال، دوران و تجانس را بررسی خواهیم کرد.

## ■ بازتاب



همان‌طور که پیش از این اشاره شد برای پیدا کردن بازتاب یک نقطهٔ مثل  $A$  نسبت به خط  $d$  کافی است از نقطه  $A$  به خط داده شده عمودی وارد کنیم و پای عمود را بنامیم. حال  $AH$  را از سمت  $H$  به اندازهٔ خودش امتداد می‌دهیم تا  $A'$  به دست آید.



در این صورت  $A'$  را بازتاب یا قرینهٔ  $A$  نسبت به خط  $d$  می‌نامیم و می‌نویسیم:  
 $S(A) = A'$

در چنین حالتی خط  $d$  عمود منصف پاره خط  $AA'$  خواهد بود.  
خط  $d$ ، خط بازتاب یا محور بازتاب نامیده می‌شود.

۱- اثبات این مطلب که تبدیل یافته یک خط (یک پاره‌خط)، یک خط (یک پاره‌خط) است، جزء اهداف درسی این کتاب نیست و برای شناسان دادن این مطلب، استناد به همین قادر کافی است.

اگر نقطه‌ای روی خط بازتاب باشد، تصویر آن بر خودش منطبق می‌شود؛ به عبارتی  $A'$  همان  $A$  است.

**تعريف:** در هر تبدیل، نقطه‌ای را که تبدیل یافته آن بر خود آن نقطه منطبق می‌شود، نقطه ثابت تبدیل می‌نامند.

بنابراین بازتاب نسبت به خط، بی‌شمار نقطه ثابت تبدیل دارد.

### فعالیت

می‌خواهیم با استدلال دقیق‌تری نشان دهیم بازتاب، تبدیلی طولپا است. حالات‌های مختلف یک پاره‌خط را نسبت به خط بازتاب  $d$  در نظر می‌گیریم و در هر حالت نشان می‌دهیم که اندازه پاره‌خط با اندازه تصویر آن برابر است.


(الف) ابتدا مسئله را برای حالتی در نظر می‌گیریم که  $AB$  با خط  $d$  موازی است. بازتاب  $A$  و  $B$  را نسبت به خط  $d$  پیدا می‌کنیم و آن را  $A'$  و  $B'$  می‌نامیم.

چهارضلعی  $ABA'B'$  چه چهارضلعی است؟ چرا؟

طول پاره‌خط‌های  $AB$  و  $A'B'$  نسبت به هم چگونه‌اند؟

(ب) حال فرض می‌کنیم که فقط یکی از نقاط انتهایی پاره‌خط داده شده روی خط بازتاب باشد.

(اگر هر دو نقطه ابتداء و انتهایی پاره‌خط داده شده روی خط بازتاب باشد، اثبات بدیهی است؛ چرا؟)




بازتاب  $A$  نسبت به خط  $d$ ، نقطه  $A'$  و بازتاب  $M$ ، خود  $M$  است.

به عبارتی:  $S(M) = M$  و  $S(A) = A'$

آیا می‌توانید به کمک هم نهشتی مثلث‌ها، دلیلی برای تساوی  $MA = MA'$  ارائه کنید؟

آیا می‌توانید این تساوی را به روش دیگری نشان دهید؟ (از خاصیت عمود منصف یک پاره‌خط کمک بگیرید).



پ) در حالتی که پاره خط AB با خط بازتاب d، نه موازی و نه متقاطع باشد، پاره خط AB را امتداد می‌دهیم تا خط بازتاب را در نقطه M قطع کند. نقطه B' بازتاب نقطه B را نسبت به خط بازتاب پیدا، و پاره خط MB' را رسم می‌کنیم. ادعا می‌کنیم که تصویر نقطه A نیز روی خط MB' واقع می‌شود؛ چرا؟

حال داریم :

$$\left. \begin{array}{l} AB = MB \\ A'B' = \dots \\ MB = \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \dots = \dots$$

و  $MA = \dots$  با توجه به قسمت ب

ت) در حالتی که پاره خط AB خط بازتاب را در نقطه‌ای مثل M قطع کند، بازتاب نقطه A را نسبت به خط d پیدا می‌کنیم و آن را نقطه A' می‌نامیم. پاره خط MA' را رسم می‌کنیم و امتداد می‌دهیم و ادعا می‌کنیم که بازتاب نقطه B' یعنی نقطه B هم بر امتداد MA' واقع است؛ چرا؟

حال داریم :

$$\left. \begin{array}{l} AB = AM + \dots \\ A'B' = \dots + \dots \\ MB = \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \dots = \dots$$

و  $AM = \dots$  با توجه به قسمت ب

تذکر: حالتی که پاره خط AB بر خط بازتاب عمود است، به عنوان تمرین به شما و اگذار شده است.

نتیجه این مراحل را می‌توان در قالب این قضیه بیان کرد :

**قضیه:** در هر بازتاب، اندازه هر پاره خط و اندازه تصویر آن با هم برابرند.

به عبارتی این قضیه نشان می‌دهد که بازتاب، تبدیلی طولپا است و برای هر دو نقطه A

$$AB = A'B' \quad S(B) = B' \quad S(A) = A' \quad \text{داریم}$$

### فعالیت

می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا بازتاب، شب خط را هم حفظ می‌کند.

مسئله را برای سه حالت کلی در نظر می‌گیریم : وقتی خط داده شده با خط بازتاب موازی باشد، وقتی عمود باشد و وقتی نه عمود باشد و نه موازی.

الف) اگر خط n موازی خط بازتاب d باشد، تصویر آن را تحت بازتاب، خط n' نامیم. خطوط n و n' نسبت به هم چه وضعی دارند؛ چرا؟ آیا در این حالت بازتاب، شب خط را حفظ می‌کند؟

- ب) اگر خط  $n$  بر خط بازتاب  $d$  عمود باشد، تصویر آن تحت بازتاب چگونه خواهد بود؟  
آیا در این حالت بازتاب، شیب خط را حفظ می کند؟
- پ) اگر خط  $n$  با خط بازتاب  $d$  عمود و موازی نباشد، خطهای  $d$ ،  $n$  و  $n'$  در نقطه‌ای مثل  $M$  متقاطع می شوند؛ پس  $n$  و  $n'$  موازی نیستند و در این حالت بازتاب، شیب خط را ..... بنابراین:

..... در حالت کلی، بازتاب شیب خط را .....

دیدیم که طولپاها اندازه زاویه را هم حفظ می کنند. بنابراین به طور کلی هر چند ضلعی و تصویر آن تحت تأثیر یک طولپا از جمله بازتاب با هم همنهشت هستند.

### کاردرکلاس

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید :

الف) وقتی  $A'$  بازتاب  $A$  نسبت به خط  $d$  است، بازتاب  $A'$  نسبت به خط  $d$ ، کدام نقطه است؟ ..... چرا؟

ب) قرینه قرینه هر نقطه چیست؟ .....

در واقع : .....  $= S(S(A)) = S(.....)$  و به زبان ساده‌تر .....  $(A')' = .....$

پ) در هر بازتاب تبدیل یافته یک مثلث، یک ..... است که با مثلث اولیه ..... است.

ت) در حالتی که پاره خط  $AB$  نسبت به خط بازتاب ..... باشد، بازتاب شیب خط را حفظ می کند.

ث) در هر بازتاب نسبت به خط  $d$  تبدیل یافته تمام نقاط روی خط ..... است؛ بنابراین تعداد نقاط ثابت تبدیل در هر بازتاب ..... است.

در ادامه به کمک ویرگی‌های انتقال و دوران ثابت می کنیم که این دو تبدیل نیز طولپا هستند.





### انتقال


#### یادآوری

۱— در شکل مقابل یک بردار، ابتداء، انتهای، اندازه و راستای آن مشخص شده است.

۲— دو بردار، که هماندازه، هم راستا و همجهت باشند، دو بردار برابر هستند.



در سال‌های گذشته دیدید که برای انتقال دادن یک شکل، کافی است تصویر هر نقطه از شکل را به کمک بردار انتقال پیدا کنیم؛ یعنی اگر نقطه  $A$  تصویر نقطه  $A'$  باشد، آن‌گاه  $\vec{AA'} = \vec{v}$




**تعریف:** انتقال  $T^1$  تحت بردار  $\vec{v}$ ، تبدیلی از صفحه است که در آن، تصویر هر نقطه  $A$  از صفحه  $P$ ، نقطه‌ای مانند  $A'$  در همان صفحه است که  $\vec{AA'} = \vec{v}$

### فعالیت

۱- می‌خواهیم نشان دهیم انتقال، تبدیل طولپاست.

الف) اگر پاره خط  $AB$  با بردار  $\vec{v}$  موازی باشد، تبدیل یافته  $AB$  را با بردار  $\vec{v}$  رسم کنید و آن را  $A'B'$  بنامید و نشان دهید :  $AB = A'B'$

راهنمایی: می‌دانیم که اگر در یک چهارضلعی، دو ضلع روبرو موازی و مساوی باشند، آن چهارضلعی متوازی‌الاضلاع است.



ب) اگر پاره خط  $AB$  با بردار  $\vec{v}$  موازی باشد به کمک مجموع یا تفاضل پاره خط‌ها

در هر دو حالت زیر نشان دهید :  $AB = A'B'$  (۱)

$$\left. \begin{array}{l} AB = AA' + \dots \\ A'B' = \dots + \dots \\ AA' = \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \dots = \dots$$

(۲)

$$\left. \begin{array}{l} AB = AA' - \dots \\ A'B' = \dots - \dots \\ AA' = \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \dots = \dots$$

تذکر: در حالتی که طول بردار  $\vec{v}$  با پاره خط  $AB$  برابر است به کمک هر یک از روش‌های فوق می‌توان درستی رابطه را نشان داد.


بنابراین :

**قضیه:** در هر انتقال، اندازه هر پاره خط و اندازه تصویر آن با هم برابرند.

به عبارتی این قضیه نشان می‌دهد که انتقال، تبدیل طولپا است و برای هر دو نقطه  $A$  و  $B$  از صفحه  $P$  که  $T(A) = A'$  و  $T(B) = B'$  داریم :  $AB = A'B'$


۲- در هر یک از حالت‌های قبل نشان دهید انتقال، شبیه خط را هم حفظ می‌کند.

## دوران



دیدیم که برای دوران دادن شکل به مرکز دوران  $O$  و به اندازه زاویه  $\alpha$ ، هر نقطه از شکل، مثل  $A$  را به مرکز دوران یعنی  $O$  وصل می‌کنیم؛ سپس در جهت خواسته شده به کمک  $OA$  زاویه‌ای برابر  $\alpha$  رسم کرده، و روی ضلع دیگر این زاویه، پاره خطی به اندازه  $OA$  جدا می‌کنیم تا  $A'$  به دست آید.




بدین ترتیب :



**تعريف:** دوران  $R'$  به مرکز نقطه ثابت  $O$  و زاویه  $\alpha$ ، تبدیلی از صفحه است


که در آن اگر  $A'$  تصویر نقطه  $A$  باشد، داریم:

$$OA = OA' \text{ و } \widehat{AOA'} = \alpha$$



### فعالیت


می‌خواهیم نشان دهیم دوران، تبدیلی طولپاست.  
برای دوران دادن هر پاره خط نظیر  $AB$  کافی است نقاط  $A$  و  $B$  را دوران دهیم تا نقاط  $A'$  و  $B'$  حاصل شود و پاره خط  $A'B'$  را رسم کنیم.





مسئله را برای حالت‌های مختلف در نظر می‌گیریم :  
 الف) مرکز دوران O بر پاره خط AB و امتداد آن واقع نباشد و زاویه دوران از زاویه  $\widehat{AOB}$  بیشتر باشد.

با توجه به شکل  $O_1 + \dots = O_2 + \dots = \alpha$

پس می‌توان مدعی شد که  $\dots = \dots$   
 به کمک همنهشتی دو مثلث  $OAB$  و  $OA'B'$  نشان دهید  $AB = A'B'$  هم اندازه‌اند.



ب) به طور مشابه نشان دهید که اگر O بر پاره خط AB واقع نباشد ولی زاویه دوران از زاویه  $\widehat{AOB}$  کمتر باشد، باز هم تساوی  $AB = A'B'$  برقرار است.  
 تذکر: در حالتی که  $\widehat{AOB}$  با زاویه دوران  $\alpha$  برابر است با هریک از روش‌های فوق می‌توان درستی رابطه را نمایش داد.



پ) اگر نقطه O روی پاره خط AB باشد :

$$\left. \begin{array}{l} AB = AO + \dots \\ A'B' = \dots + \dots \\ AO = \dots \text{ و } OB = \dots \text{ طبق تعريف دوران} \end{array} \right\} \Rightarrow \dots = \dots$$

ت) به طریق مشابه نشان دهید اگر نقطه O روی امتداد پاره خط AB باشد، حکم برقرار است.

بنابراین :

**قضیه:** در هر دوران، اندازه هر پاره خط و تصویر آن با هم برابرند.


به عبارتی این قضیه نشان می‌دهد که دوران، تبدیلی طولپا است و برای هر دو نقطه A و B از صفحه P که  $AB = A'B'$  و  $R(B) = B'$  داریم :  $R(A) = A'$

**کاردرکلاس**

دوران یافته هر شکل را رسم کنید.

الف) دوران به مرکز A و با زاویه  $90^\circ$  در جهت حرکت عقربه‌های ساعت


ب) دوران به مرکز O و با زاویه  $120^\circ$  در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت





۱- در حالتی که پاره خط  $AB$  در راستای عمود بر خط بازتاب قرار دارد، ثابت کنید که اگر  $A'B'$  بازتاب  $AB$  باشد،  $AB$  و  $A'B'$  هم اندازه‌اند.


۲- در شکل زیر چهار ضلعی  $A'B'C'D'$  تصویر چهارضلعی محدب  $ABCD$  تحت بازتاب است. در شکل اولیه وقتی به ترتیب از  $A$  به  $B$ ,  $C$  و  $D$  می‌رویم، جهت حرکت، موافق جهت حرکت عقربه‌های ساعت است. جهت حرکت در بازتاب این نقاط چگونه است؟ آیا می‌توان گفت بازتاب، جهت شکل را حفظ می‌کند؟



۳- به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) در شکل مقابل نقطه  $A'$  دوران یافته نقطه  $A$  در دوران به مرکز  $O$  و زاویه  $\alpha$  است. نشان دهید عمودمنصف  $'AA'$  از نقطه  $O$  می‌گذرد.

ب) اگر بدانیم  $\triangle A'B'C'$  دوران یافته  $\triangle ABC$  است، چگونه می‌توان مرکز دوران را مشخص کرد؟



۴- در شکل،  $d_1$  به موازات  $d_2$  و به فاصله  $m$  از آن قرار دارد و مثلث  $A'B'C'$  بازتاب  $A''B''C''$  مثلث  $A'B'C$  نسبت به خط  $d_1$  است. بازتاب مثلث  $A''B''C''$  را نسبت به خط  $d_2$  رسم کنید و آن را  $A'''B'''C'''$  بنامید.


الف) نشان دهید  $AA''=2m$ :


ب) اندازه  $BB''$  و  $CC''$  چقدر است؟

پ) با چه تبدیلی می‌توان مثلث  $A''B''C''$  را تصویر  $\triangle ABC$  دانست؟ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

حاصل دو بازتاب به دو محور موازی

به بین انفعال بازداری به طول ۲ برابر محاصل  
سین دو محور بازتاب





دورانی ب مرکز تلاشی ده گور  
و زاره  $\theta$



۵- در شکل، دو خط  $d_1$  و  $d_2$  با زاویه  $\theta$  یکدیگر را قطع کرده‌اند. مثلث  $\triangle A'B'C'$  بازتاب مثلث  $\triangle ABC$  نسبت به خط  $d_1$  است. بازتاب مثلث  $\triangle A'B'C'$  را نسبت به خط  $d_2$  رسم کنید و آن را  $\triangle A''B''C''$  بنامید.

(الف) نشان دهید:  $\widehat{AOA''} = 2\theta$

(ب) اندازه  $\widehat{BOB'}$  و  $\widehat{COC'}$  چقدر است؟

(پ) با چه تبدیلی می‌توان مثلث  $\triangle A''B''C''$  را تصویر  $\triangle ABC$  دانست؟ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۶- نقطه A به فاصله  $2\sqrt{6}$  از خط d قرار دارد. تصویر نقطه A را تحت بازتاب نسبت به خط d، نقطه  $A'$  می‌نامیم. نقطه A را حول نقطه  $A'$  به اندازه  $120^\circ$  درجه دوران می‌دهیم تا نقطه  $A''$  حاصل شود. طول پاره خط  $AA''$  را محاسبه کنید.

۷- نقطه  $A'$  تصویر نقطه A در بازتاب نسبت به خط 1 است. اگر  $AA' = 16$  و نقطه O روی خط 1 و  $OA = 1$  باشد، فاصله نقطه A از خط  $OA'$  چقدر است؟

## تجانس

در شکل‌های متشابه دیدید که طول پاره خط‌ها الزاماً با هم یکسان نیستند؛ اما با یک نسبت، اندازه همه پاره خط‌ها بزرگ‌تر یا کوچک‌تر می‌شوند. ساده‌ترین تبدیل از این نوع را تجانس می‌نامیم. در تجانس ابعاد شکل با نسبت  $k \neq 1$ ، آن را نسبت تجانس (مقیاس) می‌نامیم، بزرگ یا کوچک می‌شود.

تعريف دقیق‌تر تجانس بدین شکل است:

**تعريف:** اگر O نقطه‌ای ثابت در صفحه و  $k \neq 1$  یک عدد حقیقی باشد، نقطه  $M'$  را مجاز نظره M در تجانس به مرکز O و نسبت تجانس k گوییم؛ هرگاه سه شرط زیر برقرار باشد:

(الف) سه نقطه O، M و  $M'$  روی یک خط راست باشند.

$$OM' = |k| \cdot OM$$

- اگر k مثبت باشد،  $M'$  روی نیم خط OM و نقاط M و  $M'$  در یک طرف نقطه O قرار دارند.

$$\left. \begin{array}{l} k = 2 \quad O \text{---} M \text{---} M' \quad OM' = 2 \cdot OM \\ k = \frac{1}{2} \quad O \text{---} M' \text{---} M \quad OM' = \frac{1}{2} \cdot OM \end{array} \right\} \text{مثال: } (پ)$$

- اگر k منفی باشد، نقطه O بین نقاط M و  $M'$  قرار می‌گیرد.

$$k = -2 \quad M' \text{---} O \text{---} M \quad OM' = 2 \cdot OM \quad \text{مثال: }$$

به عبارتی، هرگاه بخواهیم در تجانس به مرکز  $O$  و نسبت  $k$ ، تصویر نقطه‌ای مثل  $M$  را پیدا کنیم، ابدا از  $M$  به  $O$  وصل می‌کنیم؛ اگر  $k$  مقداری مثبت باشد، روی نیم خط  $OM$ ، نقطه  $M'$  را چنان می‌یابیم که  $OM' = k \cdot OM$  و اگر  $k$  عددی منفی باشد، نقطه  $M'$  را روی خط  $OM$  به گونه‌ای جدا می‌کنیم که نقطه  $O$  بین نقاط  $M$  و  $M'$  باشد و  $|OM'| = |k| \cdot |OM|$ . در تجانس به مرکز  $O$  و نسبت  $k$ ، نقطه  $M'$  مجانس نقطه  $M$  به نسبت  $k$  و نقطه  $M'$  مجانس نقطه  $M$  با نسبت  $\frac{1}{k}$  است؛ چرا؟


### فعالیت

۱- این دو شکل، نمونه‌ای از تجانس را نشان می‌دهند که در یکی، مرکز تجانس داخل شکل اولیه و در دیگری خارج آن در نظر گرفته شده است.  
 الف) به کمک صفحه شطرنجی در هر شکل نسبت تجانس را مشخص کنید.

ب) آیا تجانس طولپاست؟ چرا؟

پ) در این شکل‌ها، طول هر پاره خط را با طول تصویر آن مقایسه کنید. به چه نتیجه‌ای می‌توان رسید؟

ت) مساحت هر شکل را با مساحت تصویر آن مقایسه کنید. چه نسبتی با هم دارند؟  
 ۲- در هر دو حالت فوق، نسبت تجانس مقداری بیش از یک است؛ به عبارتی:  $k > 1$ .  
 حال مسئله را برای مقادیر مختلف  $k$  بررسی می‌کنیم.  
 الف) در هر حالت مراحل باقی‌مانده را کامل کنید.



$k$	$k = 1$	$0 < k < 1$	$-1 < k < 0$
مثال	$k = 1$	$k = \frac{1}{2}$	$k = -\frac{1}{3}$

$k$	$k = -1$	$k < -1$
مثال		

ب) با توجه به تصاویر صفحه قبل به طور شهودی، درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید :

مساحت شکل حفظ می شود.	جهت شکل حفظ می شود.	شیب خط حفظ می شود.	اندازه زاویه حفظ می شود.	طولپاست	تجانس		
				✗	$k > 1$		
					$k = 1$	$k > 0$	
					$0 < k < 1$		
		✓			$-1 < k < 0$		
					$k = -1$	$k < 0$	
					$k < -1$		

پ) شرط اینکه تجانس طولپا باشد، این است که .....

ت) خطوطی که هر نقطه را به تصویر آن نظیر می کند، یعنی خطوط  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  و ... نسبت به هم چه وضعی دارند؟

ث) اگر  $\triangle ABC$  مجانس  $\triangle A'B'C'$  باشد، مرکز تجانس را چگونه می توان پیدا کرد؟

در تجانس به مرکز O و نسبت k:

اگر  $k > 1$  تجانس را، **تجانس مستقيم** می‌نامیم.

اگر  $k < 1$  تجانس را **تجانس معکوس** می‌نامیم.

اگر  $|k| > 1$  تصویر شکل **کوچکتر**... می‌شود و آن را **انقباض** می‌نامیم.

اگر  $0 < k < 1$  تصویر شکل، بزرگ‌تر می‌شود و آن را **انبساط** می‌نامیم.

$$k < 1 \quad k > 1$$

حال که به طور شهودی با تجانس و چگونگی عملکرد آن روی شکل‌های هندسی آشنا شدید با استدلال دقیق‌تری ثابت خواهیم کرد که تجانس تبدیلی است که در حالت کلی شبی خط و اندازه زاویه را حفظ می‌کند.

### فعالیت

می‌خواهیم نشان دهیم تجانس، شبی خط را حفظ می‌کند. برای این منظور، تجانس D'، با مرکز تجانس O و نسبت تجانس k و خط AB را در نظر می‌گیریم؛ دو حالت اتفاق می‌افتد :

الف) نقطه O روی خط AB است.

**حل :** در این حالت بدیهی است که نقاط A' و B' مجازنهای نقاط A و B، روی خط AB واقع می‌شوند؛ بنابراین A'B' بر AB واقع است و شبی خط تغییری نمی‌کند.

ب) نقطه O غیر واقع بر خط AB است.


**حل :** در این صورت اگر نقاط A' و B' به ترتیب، مجازنهای نقاط A و B باشند، طبق تعریف داریم :

$$\begin{cases} OA' = k \cdot OA \\ OB' = ..... \end{cases} \Rightarrow \frac{OA'}{OA} = \frac{.....}{.....} = .....$$

$$\Rightarrow AB \parallel A'B' \quad (\text{چرا؟})$$

پس در این حالت نیز خط و تصویر آن باهم موازی‌اند و شبی دو خط، برابر است؛ بنابراین :

**قضیه:** تجانس، شبی خط را حفظ می‌کند.



تذکر: حالتی که  $k=1$  په عنوان تمرین به شما واگذار شده است.

## فعالیت

می خواهیم نشان دهیم تجانس، اندازه زاویه را حفظ می کند.  
تجانس D با مرکز تجانس O و نسبت تجانس k و زاویه  $\widehat{ABC}$  را در نظر می گیریم.  
تجانس این زاویه، یعنی زاویه  $\widehat{A'B'C'}$  را رسم می کنیم.  
به کمک قضیه قبل و شکل داده شده، ثابت کنید:  $\widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'}$ .



نتیجه این فعالیت را در قالب قضیه زیر مطرح می کنیم:

**قضیه:** تجانس، اندازه زاویه را حفظ می کند.

تذکر: اثبات در حالتی که  $k < 0$  به عنوان تمرین به شما واگذار شده است.

## کاردکلاس

۱- الف) فرض کنید پاره خط  $A'B'$  مجانس پاره خط AB در تجانس به مرکز O و نسبت k باشد؛ نشان دهید:  $|k| = \frac{|A'B'|}{|AB|}$  (نقطه O را خارج AB در نظر بگیرید.)

ب) اگر  $A'_1 A'_2 \dots A'_n$  مجانس  $A_1 A_2 \dots A_n$  باشد، نشان دهید این دو مجموعی با هم متشابه‌اند.

۲- با توجه به ویژگی‌های تجانس و به کمک مثال نقض نشان دهید دو شکل متشابه، الزاماً متجانس نیستند.

## فعالیت

پیش از این دیدیم که اگر نقطه‌ای روی خط بازتاب باشد، تصویر آن بر خودش منطبق می‌شود؛ به عبارتی  $A' = A$  است و داریم  $S(A) = A' = A$ ؛ این نقاط را نقاط ..... نامیدیم. اما برخی از تبدیل‌ها، هر نقطه صفحه را به خود آن نقطه نظیر می‌کند؛ چنین تبدیل‌هایی را تبدیل همانی می‌نامیم.

**تعریف:** تبدیل T را **تبدیل همانی** گوییم، هر گاه به از ای هر نقطه A از صفحه P داشته باشیم  $T(A) = A$ .

معمولآً تبدیل‌های همانی را با I نمایش می‌دهند؛ پس  $I(A) = A$ .

دقت کنید که در بازتاب به جز نقاطی که روی خط بازتاب قرار دارند، تصویر هر نقطه مثل A' است که در طرف دیگر خط بازتاب قرار دارد. بنابراین بازتاب هیچ‌گاه، تبدیل همانی نیست.

الف) در چه شرایطی انتقال، دوران و تجانس، می‌توانند تبدیل همانی باشند؟

ب) آیا تبدیل همانی طولپاست؟

پ) توضیح دهید که در هر یک از تبدیل‌های زیر، آیا می‌توان نقاط ثابت تبدیل داشت؟

۱- انتقال غیرهمانی :

۲- دوران غیرهمانی :

۳- تجانس غیرهمانی :

### کاردرکلاس

۱- درستی یا نادرستی هر عبارت را داخل جدول مشخص کنید.

مساحت شکل را حفظ می‌کند.	جهت شکل را حفظ می‌کند.	شیب خط را حفظ می‌کند.	اندازه زاویه را حفظ می‌کند.	طول پاره خط را حفظ می‌کند.	
					بازتاب
					انتقال
					دوران
					تجانس

### تمرین

۱- در تجانسی با نسبت  $k = 2$  و مرکز تجانس O (نقطه O را خارج AB در نظر بگیرید) شان دهید :

الف) تجانس شیب خط را حفظ می‌کند.

ب) تجانس زاویه بین خطوط را حفظ می‌کند.

۲- دایره C(O,R) و نقطه M خارج این دایره مفروض است. مجانس این دایره را نسبت به نقطه M در هر حالت رسم کنید.


(راهنمایی: تصویر مرکز و یک نقطه دلخواه از دایره را تحت تجانس پیدا کنید.)

$$k=2$$


$$k=-2$$

$$k=\frac{1}{2}$$

۳- یک مربع را در تجانسی با نسبت تجانس  $\frac{2}{3}$  و به مرکز محلی تلاقي قطرها تصویر کرده‌ایم. اگر مساحت بین مربع و تصویرش ۵ باشد، محیط مربع اولیه را محاسبه کنید.



۴- در شکل رویه‌رو اگر خط ۱ را در تجانس به مرکز O و نسبت تجانس  $\frac{7}{4}$  تصویر کنیم و آن را ۱' بنامیم، مساحت بین خط ۱ و ۱' و خطوط d و d' چقدر است؟




تصاویر زیر، نمونه‌هایی از نقاشی‌های دانشآموزان است که استفاده از بازتاب در آن نقشی عمدۀ دارد.



## کاربرد تبدیل‌ها

تبدیل‌های هندسی شامل بازتاب، انتقال، دوران و تجانس به طور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی واقعی کاربرد دارد؛ برای مثال در سال‌های گذشته با کاربرد برشی تبدیل‌ها در کاشی کاری آشنا شدید. آیا می‌توانید با تأمل در محیط اطراف خود به نمونه‌هایی اشاره کنید که تبدیل‌های هندسی در آن به کار رفته‌اند؟

به این تصاویر دقت کنید. کدام یک از تبدیل‌های هندسی بر زیبایی خوشنویسی‌های زیر افزوده است؟



## ■ کاربردهایی از بازتاب (قرینه‌یابی)


بازتاب علاوه بر شاخه‌های مختلف ریاضی در دیگر علوم نظیر هنر، معماری، فیزیک و... کاربرد دارد. در علم فیزیک، ویژگی‌های بازتاب همان ویژگی‌های آینهٔ تخت است. کاربردهای دیگری از بازتاب را در ادامه خواهیم دید.




دریاچه‌ای در قله سبلان | استان اردبیل



۱- می‌خواهیم کیکی به شکل زیر را به‌طور مساوی بین دو نفر تقسیم کنیم. نمای بالای کیک از مربع BCDE و کمان AE از یک دایره تشکیل شده است به طوری که A و B و E روی یک خط هستند.




اگر نمای بالای کیک به شکل رو به رو بود، تقسیم آن کار ساده‌ای بود؛ چرا که می‌توانستیم از روی خط بازتاب m کیک را برش بزنیم و آن را به دو نیمة مساوی تقسیم کنیم.



این شکل، راه ساده‌ای برای برش زدن کیک و تقسیم آن به دو سهم برابر ارائه می‌کند. توضیح دهد که بازتاب به حل این مسئله چه کمکی کرده است.

۲- یکی از کاربردهای بازتاب، حل مسائلی است که به مسائل همپیرامونی یا هم‌محیطی معروف است. در این گونه مسائل، هدف این است که بدون اینکه محیط یک چندضلعی تغییر کند، مساحت آن چندضلعی را تغییر دهیم.

برای مثال فرض کنید که زمینی به شکل چندضلعی ABCDE داریم که دور آن را حصار کشیده‌ایم. حال می‌خواهیم با ثابت نگهداشتن محیط و ثابت نگهداشتن تعداد اضلاع چندضلعی، بدون اینکه اندازه حصار کشی تغییر کند، مساحت زمین را افزایش دهیم.



به کمک این تصویر توضیح دهید که این عمل را چگونه می‌توان انجام داد.

چرا محيط چندضلعی  $ABCDE$  با محيط چندضلعی  $ABC'D'E'$  يكى است؟

### ■ مسائل پيدا کردن کوتاه‌ترین مسیر

**الف)** هرون، رياضي‌دانی است که به او دایرة‌المعارف رياضي و فيزيك لقب داده‌اند. او که در فاصله زمانی ۲۵ تا ۱۵ سال قبل از ميلاد مسيح در مصر زندگي می‌کرد برای نخستين بار به کمک بازتاب، دستور پيدا کردن کوتاه‌ترین مسیر را در شرایط خاص ارائه کرد.  
او با اين مسئله روبه‌رو شده بود که :

«مردي می‌خواهد برای برداشت آب از خانه به ساحل رودخانه‌اي که لبه مستقيمي دارد برود و بعد سطبل آب را به اسطبل<sup>۱</sup> بيرد که در همان سمت رودخانه است. او از کدام نقطه از ساحل آب بردارد که مسافتی که در مجموع طی می‌کند، کمترین حالت ممکن باشد؟»

مسئله، پيدا کردن نقطه  $M$  روی خط  $d$  است به گونه‌اي که  $AM+MB$  کمترین مقدار ممکن باشد.

هرون ابتدا بازتاب  $A$  را نسبت به خط پيدا کرد و آن را  $A'$  ناميد. خط فرضی  $A'B$  خط بازتاب را در نقطه‌اي مثل  $M$  قطع می‌کند. او مدعی شد که  $M$  جواب مسئله است و  $AM+MB$  کوتاه‌ترین مسیر ممکن است.

با هم دليل ادعای هرون را بررسی می‌کنیم:

۱- برای هر نقطه دلخواه دیگری نظير  $M$  داريم  $M,A'=M,A'$  (و به همين ترتيب  $AM=A'M$ )؛ چرا؟





۲- در مثلث  $A'MB$  داريم  $A'M+M,B > A'B$ ؛ چرا؟


از تساوي  $A'B=A'M+MB$  و (۱) و (۲) ادعای هرون را اثبات کنيد.

**سؤال:** در روش هرون نقطه  $A'$  طرف دیگر رودخانه قرار دارد. اگر در عمل به دنبال یافتن کوتاه‌ترین مسیر مورد نظر باشيم و امكان رفتن به طرف دیگر رودخانه نباشد، چگونه نقطه  $M$  را می‌توان پيدا کرد؟


(راهنمایي: از تشابه دو مثلث  $AHM$  و  $BH'M$  کمک بگيريد و توجه داشته باشيد که اندازه‌های  $AH$  و  $BH'$  دو مقدار معلوم هستند).

۱- جاي سريوشيده برای نگهداري چهارپيان به ويزه اسب






ب) دو شهر A و B مطابق شکل در یک طرف رودخانه‌ای واقع‌اند. می‌خواهیم جاده‌ای از A به B بسازیم به طوری که ۴ کیلومتر از این جاده در ساحل رودخانه ساخته شود. این ۴ کیلومتر را در چه قسمتی از رودخانه بسازیم تا مسیر ACDB کوتاه‌ترین مسیر ممکن باشد؟



**حل:** مسئله را در چند مرحله حل می‌کنیم.

۱- اگر جاده ساحلی را از صورت مسئله حذف کنیم، به عبارتی اگر  $CD = 0^\circ$ ، این مسئله به کدام یک از مسائلی شبیه است که قبل‌آید؟

۲- با توجه به شرایط مسئله، مسیر مورد نظر، باید مسیری به شکل مسیر ACDB باشد؛ اما :




$(چرا؟) \text{ طول مسیر } ACB'B = \text{ طول مسیر } ACDB$

$4 + \text{طول مسیر } ACB' = \text{طول مسیر } ACDB$


بنابراین :

۳- پس کافی است برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر ممکن به شکل ACDB مسیر را به گونه‌ای انتخاب کنیم که طول  $ACB'$  کوتاه‌ترین طول ممکن باشد.




۴- به کمک مراحل ۱ تا ۳ و شکل رو به رو توضیح دهید که رسم کوتاه‌ترین مسیر ACDB چگونه است.

### کاردرکلاس



اگر دو شهر A و B دو طرف رودخانه باشند و بخواهیم جاده‌ای از A به B بسازیم به طوری که پل MN بر راستای رودخانه عمود باشد، محل احداث پل را کجا در نظر بگیریم که مسیر AMNB کوتاه‌ترین مسیر ممکن باشد؟




راهنمایی: به کمک فعالیت قبل و با توجه به تصویر داده شده، طریقه رسم مسیر AMNB را شرح دهید و مشخص کنید چرا این مسیر، کوتاه‌ترین مسیر ممکن است.




۱- دور زمین‌های مطابق شکل حصارکشی شده است. چطور می‌توان بدون کم و زیاد کردن حصارها، مساحت زمین را افزایش داد؟

(ب)





(الف)



۲- می‌خواهیم کنار رودخانه‌ها، ۳ اسکله بسازیم. جای ۲ اسکله A و B مطابق شکل مشخص است. اسکله M را در چه نقطه‌ای از ساحل رودخانه بسازیم که قایق‌ها هنگام طی مسیر MABM کوتاه‌ترین مسیر را طی کنند؟

۳- سه خط دو به دو ناموازی  $l$  و  $l'$  در صفحه مفروض اند. پاره‌خطی به طول ۵ سانتی‌متر رسم کنید که دو سر آن روی  $l$  و  $l'$ ، و موازی  $l$  باشد.






۴- فرض کنید G محل برخورد میانه‌های مثلث ABC (مرکز تقلیل آن) باشد و مثلث A'B'C' مجانس مثلث ABC در تجانس به مرکز G و نسبت  $\frac{1}{2}$  باشد.

(الف) جایگاه رأس‌های A' و B' و C' نسبت به مثلث ABC کجاست؟


(ب) مساحت مثلث A'B'C' چه کسری از مساحت مثلث ABC است؟

۵- زمینی به شکل زیر داریم، می‌خواهیم بدون آنکه محیط این زمین تغییر کند مساحت‌ش را افزایش دهیم در هر مورد میزان افزایش مساحت را حساب کنید.






## تبدیل‌های تقارنی یک شکل هندسی



در بسیاری از مناظر طبیعی، گیاهان و جانوران، ساختار اتم‌ها، معماری، هنرهای مختلف دستی و نیز شکل‌های هندسی می‌توان نوعی نظم و تعادل مشاهده کرد. در این بخش تبدیل‌هایی را مرور می‌کنیم که یک شکل را به خود آن شکل نظیر می‌کنند. چنین تبدیل‌هایی را تبدیل‌های تقارنی آن شکل می‌نامیم. فعالیت صفحه بعد برای روشن‌تر شدن این موضوع، طراحی شده است.



مثلث متساوی‌الاضلاعی را در نظر بگیرید :

الف) بازتاب این مثلث نسبت به خط داده شده چگونه است؟.....


ب) آیا تحت این بازتاب تصویر هر نقطه از شکل لزوماً خود آن نقطه است؟.....

پ) آیا تحت این بازتاب، تصویر هر نقطه از شکل، روی خود شکل است؟

ت) آیا خط بازتاب دیگری برای این مثلث سراغ دارد؟.....

این مثلث چند خط بازتاب دارد؟.....

ث) آیا غیر از بازتاب، تبدیل دیگری سراغ دارد که هر نقطه از شکل را به نقطه‌ای از همان شکل ببرد؟.....



برای مثال آیا با مرکز O (نقطه همرسی نیمسازها) می‌توانید دوران‌هایی معرفی کنید که شکل را بر خودش منطبق کند؟.....  
اگر  $\alpha \leq 360^\circ$  زاویه دوران باشد، چند دوران به مرکز O و زاویه  $\alpha$  می‌توانید مشخص کنید؟.....

**تعریف:** اگر شکلی تحت یک بازتاب بر خودش منطبق شود، گوییم آن شکل **تقارن بازتابی (خطی)** دارد و اگر آن شکل تحت دورانی با زاویه  $\alpha \leq 360^\circ$  بر خودش منطبق شود، گوییم **تقارن دورانی (چرخشی)** دارد.

همان‌گونه که در این فعالیت دیدید در مثلث متساوی‌الاضلاع، سه بازتاب و سه دوران متفاوت می‌توان معرفی کرد که نقاط این مثلث را به نقاطی از همین مثلث نظیر کند.


به عبارتی، تحت این تبدیل‌ها تصویر این مثلث بر خودش منطبق می‌شود؛ چنان تبدیل‌هایی را تبدیل‌های تقارنی این مثلث می‌نامیم. در اینجا برای شناسایی تبدیل‌های تقارنی یک شکل، شکل را تنها در یک جهت (خلاف یا موافق جهت حرکت عقربه‌های ساعت) دوران می‌دهیم؛ با این تعریف، مثلث متساوی‌الاضلاع دارای ۶ تبدیل تقارنی است. وقت کنید که دوران  $360^\circ$ ، تبدیل انتقال با بردار صفر و تبدیل تجانس با نسبت تجانس  $k=1$ ، علاوه بر اینکه هر شکل را به خود آن شکل نظیر می‌کنند هر نقطه از شکل را نیز به خود آن نقطه نظیر می‌کنند. که پیش از این، آنها را «تبدیل‌های همانی» نامیدیم. بنابراین تمام تبدیل‌های همانی فقط یک تبدیل تقارنی به شمار می‌روند.

**تعریف:** تبدیل طولپای T را **تبدیل تقارنی** شکل F می‌نامیم به شرط اینکه تبدیل یافته شکل F، تحت آن تبدیل بر خود شکل F منطبق شود؛ یعنی داشته باشیم:  $T(F) = F$


**تعریف:** تقارن دورانی با زاویه  $180^\circ$  را **تقارن مرکزی** نیز می‌نامند.  
در این حالت مرکز دوران را **مرکز تقارن** شکل می‌گویند.

### مثال

شش ضلعی منتظم، ۶ تقارن بازتابی و ۶ تقارن دورانی دارد.  
تقارن‌های بازتابی :



تقارن‌های دورانی :



همان طور که اشاره شد تقارن دورانی با زاویه  $36^\circ$ ، انتقال با بردار صفر و تجانس با نسبت تجانس  $k=1$  تبدیل های همانی هستند.

تبدیل های همانی را تقارن همانی نیز می نامند؛ با این تعریف، هر شکلی دارای تقارن همانی است.

شکل های زیر را به عنوان تصویر دو بعدی در نظر بگیرید و جدول را کامل کنید :

تعداد کل تقارن ها	تعداد تقارن های بازتابی	تقارن های دورانی
.....	.....	$72^\circ, \dots$

تعداد تبدیل های تقارنی را در هر شکل مشخص کنید.

الف) پاره خط      ب) خط      پ) دایره

#### مسائلی برای علاقه مندان

۱- الف) با تکمیل جدول زیر تعداد تبدیل های تقارنی  $n$  ضلعی منتظم را مشخص کنید.

ضلعی منتظم	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	...	$n$
تعداد تقارن های بازتابی								
تعداد تقارن های دورانی								
تعداد کل تبدیل های تقارنی								
آیا شکل مرکز تقارن دارد؟								

ب)  $n$  ضلعی منتظم در چه صورتی مرکز تقارن دارد؟

پ) الگویی برای پیدا کردن زاویه های دوران در تقارن های دورانی یک  $n$  ضلعی منتظم ارائه کنید.

- ۲- تقارن‌های خطی و دورانی متوازی‌الاضلاع، مستطیل، لوزی، مثلث متساوی‌الساقین و ذوزنقه متساوی‌الساقین را مشخص کنید و در جدولی بنویسید.
- کدام یک از این شکل‌های هندسی، مرکز تقارن دارند؟

۳- الف) شکلی رسم کنید که خط بازتاب داشته باشد، ولی مرکز تقارن نداشته باشد (یعنی تقارن خطی داشته باشد، اما تقارن دورانی غیرهمانی نداشته باشد).

ب) شکلی رسم کنید که مرکز تقارن داشته باشد، ولی خط بازتاب نداشته باشد (یعنی تقارن دورانی غیرهمانی داشته باشد، اما تقارن خطی نداشته باشد).


۴- نشان دهید اگر شکلی دو خط بازتاب عمود بر هم داشته باشد، محل تلاقی این دو خط، مرکز تقارن شکل است (در واقع هر شکل که دارای دو تقارن بازتابی باشد که دو خط بازتاب آن بر هم عمود باشند، دارای تقارن دورانی است).

۵- جدول زیر را کامل کنید.

شکل					
تقارن بازتابی					
تقارن دورانی					
تعداد تبدیل‌های تقارنی					

## فصل سوم

# روابط طولی در مثلث



تصویر: فریده کوچکی



تئودولیت (زاویه‌یاب) یکی از ابزارهای لازم برای این‌گونه محاسبات عملی است.

محاسبه فاصله‌های غیرقابل دسترس یکی از مهم‌ترین کاربردهای روابط طولی در هندسه است. از جمله آنها محاسبه ارتفاع کوه‌های بلند است. رشته‌کوه اشترانکوه که ارتفاع آن در برخی نقاط به بیش از  $4500$  متر می‌رسد در استان لرستان واقع است.



## قضیه سینوس‌ها

### یادآوری

منظور از روابط طولی، رابطه‌هایی است که در مورد اندازه‌های پاره خط‌ها و زاویه‌ها در شکل‌های مختلف، بحث می‌کند. در سال گذشته روابط طولی زیر را در مثلث قائم‌الزاویه دیدیم :

$$AB' = BC \cdot BH \quad ۱$$


$$AC' = BC \cdot CH \quad ۲$$

$$AH' = BH \cdot CH \quad ۳$$

$$AB' + AC' = BC' \quad ۴$$

$$AB \cdot AC = BC \cdot AH \quad ۵$$

اینک به ادامه بحث در مثلث‌های دلخواه می‌پردازیم.



### ۱ فعالیت


در کتاب ریاضی ۱ (پایه دهم) با تعریف نسبت‌های مثلثاتی در مثلث قائم‌الزاویه آشنا شدید. با توجه به تعریف سینوس زاویه در مثلث قائم‌الزاویه ABC، جاهای خالی را پر کنید :

$$\sin B = \frac{...}{...} \Rightarrow \frac{b}{\sin B} = ...$$

$$\sin C = \frac{...}{...} \Rightarrow \frac{c}{\sin C} = ...$$

$$\sin A = \sin 90^\circ = \dots \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = ...$$

بنابراین داریم :



در هر مثلث قائم‌الزاویه، نسبت اندازه هر ..... به ..... برابر است با اندازه .....

## فعالیت ۲

در کتاب هندسه ۱ دیدیم که عمودمنصف‌های اضلاع هر مثلث در یک نقطه همساند و در این کتاب دیدیم که این نقطه، مرکز دایرهٔ محیطی مثلث است. دایرةٔ محیطی مثلث قائم‌الزاویه ABC را رسم می‌کیم. مرکز این دایره، کجاست و چرا قطر آن با وتر مثلث برابر است؟

با توجه به نتیجهٔ فعالیت (۱) می‌توانیم بگوییم:

در هر مثلث قائم‌الزاویه، نسبت اندازهٔ هر ضلع به سینوس زاویهٔ روبرو به آن ضلع برابر است با اندازهٔ ..... دایرةٔ محیطی مثلث.

## فعالیت ۳

(الف) مثلث ABC با زاویه‌های حاده، A و B و C و دایرةٔ محیطی آن به مرکز O (که درون مثلث است) را در نظر می‌گیریم. قطر BD را رسم و D را به A به وصل می‌کنیم.

۱- زوایای  $\hat{C}$  و  $\hat{D}$  چرا با هم برابرند؟

۲- چرا مثلث ABD در رأس A قائم‌الزاویه است؟

۳- با توجه به دو قسمت قبل، داریم:

$$\sin C = \sin D \quad \text{and} \quad \sin D = \dots \Rightarrow \sin C = \dots \Rightarrow \frac{C}{2R} = \frac{\sin C}{\sin C}$$

۴- به طور مشابه (با وصل کردن A و C به مرکز و رسم قطرهای گذرنده از آن نقاط) خواهیم داشت:

$$\frac{a}{\sin A} = \dots \quad \text{and} \quad \frac{b}{\sin B} = \dots$$




(ب) حال فرض می‌کنیم یکی از زوایای مثلث، مثلاً  $\hat{A} > 90^\circ$ ، منفرجه باشد (در این صورت O، مرکز دایرةٔ محیطی مثلث، بیرون مثلث است و نقطهٔ 'A را روی کمان BC طوری در نظر می‌گیریم که O درون مثلث A'BC بیفتند (یعنی مثلث A'BC حاده‌الزاویا باشد).

۱- زوایای  $\hat{A}$  (از مثلث ABC) و  $\hat{A}'$  نسبت بهم چگونه‌اند؟ چرا؟

$\hat{A} + \hat{A}' = 180^\circ$  بنابراین با توجه به آن‌چه از مثلثات می‌دانیم، نتیجه می‌شود:  $\sin A = \sin(\dots - \hat{A}') = \dots$

و در مثلث A'BC مطابق نتیجهٔ قسمت (الف) می‌توانیم بنویسیم:

$$\frac{a}{\sin A'} = \dots \Rightarrow \frac{a}{\sin A} = \dots$$



۲- قطر CD را رسم می‌کنیم، چرا مثلث ADC در رأس A قائم‌الزاویه است؟ زاویه

$\hat{A}$  در این مثلث، با کدام زاویه از مثلث ABC برابر است؟ چرا؟

۳- با توجه به تعریف نسبت‌های مثلثاتی در مثلث قائم‌الزاویه ADC می‌توان نوشت:

$$\sin D = \frac{b}{2R} \Rightarrow \sin B = \frac{b}{2R}$$

و به طریق مشابه (با رسم قطر گذرنده از B) می‌توان ثابت کرد:

$$\sin C = \frac{c}{2R}$$


### نتیجه

در هر مثلث دلخواه، نسبت اندازه هر ..... به ..... زاویه روبرو به آن برابر است با .....

**قضیه سینوس‌ها:** در مثلث ABC با اضلاع AB=c، AC=b، BC=a داریم:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

که R شعاع دایره محیطی مثلث است.



**مثال ۱ :** در مثلث ABC،  $BC=1\text{ cm}$  و  $\hat{A}=12^\circ$  و  $\hat{C}=10^\circ\sqrt{6}$  مقدار شعاع

دایره محیطی مثلث و اندازه زوایای  $\hat{B}$  و  $\hat{C}$  را به دست آورید.

**حل:** به کمک قضیه سینوس‌ها می‌توان نوشت:

$$\frac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow \frac{10}{\sin 12^\circ} = 2R \text{ و } \sin 12^\circ = \sin(18^\circ - 6^\circ) = \sin 6^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$2R = \frac{10}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \text{ و } R = \frac{10\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = 2R \Rightarrow \frac{10\sqrt{6}}{\sin B} = \frac{20\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \sin B = \frac{10\sqrt{6}}{20\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$


$$\Rightarrow B=45^\circ \text{ و } \hat{A}=12^\circ \text{ یا } 125^\circ \Rightarrow \hat{B}=45^\circ \Rightarrow \hat{C}=15^\circ$$

**مثال ۲ :** از یک بلوار افقی، یک خیابان فرعی باریک با زاویه  $6^\circ$


جدا شده است. اکنون شهرداری منطقه می‌خواهد یک خیابان فرعی دیگر

به طول  $80\text{ m}$  بنا کند تا با زاویه  $45^\circ$  از خیابان فرعی اول جدا، و به بلوار

منتھی شود. این خیابان از چه فاصله‌ای از رأس زاویه  $6^\circ$  باید شروع



شود و با بلوار چه زاویه‌ای می‌سازد؟



**حل:** با یک شکل مناسب مسئله را مدل سازی می کنیم. اولاً با توجه به مجموع اندازه های زوایای داخلی مثلث، روشن است که  $\hat{B} = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$ ؛ یعنی خیابان فرعی باید با زاویه  $75^\circ$  از بلوار جدا شود. ثانیاً به کمک قضیه سینوس ها در مثلث ABC داریم :

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \frac{80.0}{\sin 60^\circ} = \frac{BC}{\sin 45^\circ} \Rightarrow BC = \frac{80.0 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{80.0 \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{80.0 \sqrt{6}}{3} \approx 65.3 / 2 \text{ m}$$


یعنی خیابان فرعی را باید از فاصله تقریبی  $65.3/2$  متر با زاویه  $75^\circ$  بنا کنیم.

### کاردکلاس

می خواهیم روی یک رودخانه عمیق بین دو نقطه A و B در دو طرف رودخانه، پلی بنا کنیم. برای محاسبات مربوط به احداث پل، باید فاصله ابتدا و انتهای آن (یعنی طول AB) را به دست بیاوریم؛ اما امکان اندازه گیری مستقیم (به دلیل وجود رودخانه) وجود ندارد. برای این کار از نقطه A در جهتی حرکت می کنیم تا با عبور از قسمت کم عمق رودخانه (DE) به نقطه C برسیم و طول BC را اندازه گیری می کنیم؛ سپس با زاویه یاب (تعویلیت) زاویه دید AC از نقطه B ( $\hat{B}$ ) و زاویه دید C از AB ( $\hat{C}$ ) را اندازه می گیریم. به صورت زیر نشان دهید با داشتن طول BC و زوایای  $\hat{B}$  و  $\hat{C}$  می توان فاصله AB را به دست آورد :

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{.....} \Rightarrow \frac{BC}{\sin(180^\circ - (..... + .....))} = \frac{AB}{.....} \Rightarrow AB = \frac{..... \times .....}{\sin(.....)}$$


اگر  $BC = 3 \text{ km}$  و  $\hat{B} = 70^\circ$  و  $\hat{C} = 60^\circ$  به کمک ماشین حساب طول AB را به دست آورید.



### تمرین

۱- ثابت کنید در هر مثلث قائم الزاویه ABC ( $\hat{A} = 90^\circ$ ) با ارتفاع  $AH = h_a$  داریم :

$$\frac{1}{h_a^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$$



۲- دو ایستگاه رادار، که در فاصله ۲۰ کیلومتری از هم واقع اند، هواپیمایی را با زاویه های  $30^\circ$  و  $45^\circ$  درجه رصد کرده اند. فاصله هواپیما را از دو ایستگاه به دست آورید.

## قضیه کسینوس‌ها

می‌دانیم که در مثلث قائم‌الزاویه  $(AB=c)$  با داشتن طول‌های دو ضلع  $(\hat{A}=90^\circ)$  را بحسب  $b$  و  $c$  به دست آوریم:  $a^2=b^2+c^2$ .  
می‌توانیم اندازه وتر مثلث  $(BC=a)$  را بحسب  $b$  و  $c$  به دست آوریم:  $\hat{A}$  مساوی  $90^\circ$  هم نباشد، می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

### فعالیت ۱

در مثلث  $ABC$  ( $\hat{A} < 90^\circ$ ), ارتفاع  $BH$  را رسم کرده‌ایم. با توجه به تعریف نسبت‌های مثلثاتی در مثلث‌های قائم‌الزاویه، جاهای خالی را پر کنید:


$$\cos A = \frac{AH}{AB} \Rightarrow AH = AB \cdot \cos A \quad \text{و} \quad CH = b - AH = b - AB \cdot \cos A$$

$$\sin A = \frac{CH}{AC} \Rightarrow CH = AC \cdot \sin A = c \cdot \sin A$$

$$\Delta BHC: BC^2 = BH^2 + CH^2 \Rightarrow a^2 = (AB \cdot \cos A)^2 + (c \cdot \sin A)^2$$

حال به کمک اتحادهای جبری و اتحاد مثلثاتی  $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ , نشان دهید:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$




اکنون در مثلث  $ABC$  ( $\hat{A} > 90^\circ$ ) ارتفاع  $BH$  را در بیرون مثلث رسم می‌کنیم.  
اگر  $\hat{A}_1$  زاویه خارجی رأس  $A$  باشد با توجه به اینکه  $\hat{A}_1 = 180^\circ - \hat{A}$  داریم:  
 $\cos A_1 = \frac{AH}{AB}$  و  $\sin A_1 = \frac{CH}{AC}$  و در مثلث  $ABH$   $\cos A_1 = \frac{AH}{AB}$  و  $\sin A_1 = \frac{CH}{AC}$  نیز با توجه به تعریف نسبت‌های مثلثاتی می‌توان نوشت:

$$\cos A_1 = \frac{AH}{AB} \quad \text{و} \quad \sin A_1 = \frac{CH}{AC} \Rightarrow AH = AB \cdot \cos A_1 \quad \text{و}$$

$$BH = AB \cdot \sin A_1 \quad \text{و} \quad CH = AC - AH = AC - AB \cdot \cos A_1$$


$$\Delta BHC: BC^2 = BH^2 + CH^2 \Rightarrow a^2 = (AB \cdot \sin A_1)^2 + (AC - AB \cdot \cos A_1)^2$$



و با ساده کردن عبارت‌ها نشان دهید :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$


**سؤال :** در حالتی که زاویه  $A$  قائم باشد، این رابطه به چه صورت در می‌آید؟



**قضیه کسینوس‌ها:** در هر مثلث، مربع اندازه هر ضلع برابر است با مجموع مربع‌های اندازه‌های دو ضلع دیگر، منهای دو برابر حاصل‌ضرب اندازه آن دو ضلع در کسینوس زاویه بین آنها:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A, \quad b^2 = \dots + \dots - \dots$$

$$c^2 = \dots + \dots - \dots$$



**مثال :** دو قایق از یک نقطه در دریاچه‌ای با سرعت‌های  $6^{\circ} \text{ km/h}$  و  $10^{\circ} \text{ km/h}$  و با زاویه  $120^{\circ}$  از هم دور می‌شوند. نیم ساعت بعد دو قایق در چه فاصله‌ای از یکدیگر هستند؟

**حل :** با توجه به نقطه شروع دو قایق و سرعت‌های ثابت، نیم ساعت بعد، مسافت طی شده توسط هر قایق محاسبه می‌شود :

$$OA = 6 \times 0.5 = 3^{\circ} \text{ km} \quad \text{and} \quad OB = 10 \times 0.5 = 5^{\circ} \text{ km}$$

حال به کمک قضیه کسینوس‌ها می‌نویسیم :

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 120^{\circ} = -\frac{1}{2}$$

$$AB^2 = 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \left( -\frac{1}{2} \right) = 49 \Rightarrow$$

$$AB = 7^{\circ} \text{ km}$$

### کاردرکلاس


در مثلث  $ABC$  با  $\hat{A} = 60^{\circ}$  و  $AC = \sqrt{6} + \sqrt{2}$  و  $AB = 2\sqrt{2}$ ، طول ضلع  $BC$  را به کمک قضیه کسینوس‌ها بدست آورید.

۱- طول ضلع  $BC$  را به کمک قضیه کسینوس‌ها بدست آورید.

$$BC^2 = \dots^2 + \dots^2 - 2 \times \dots \times \dots \times \dots \Rightarrow$$

$$BC^2 = \dots + \dots - \dots \Rightarrow$$

$$BC^2 = \dots \text{ و } BC = \dots$$



۲- اندازه  $\hat{C}$  را به کمک قضیه سینوس‌ها به دست آورید و از آنجا اندازه  $\hat{B}$  را هم بیابید.

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A} \Rightarrow \frac{2\sqrt{2}}{\sin C} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} \Rightarrow \sin C = \dots \quad \hat{C} = \dots$$


$$\Rightarrow \hat{B} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{C}) = \dots$$




### تمرین

۱- یک درخت کج از نقطه A روی زمین، که در فاصله ۱۵ متری از نوک درخت است به زاویه  $60^\circ$  دیده می‌شود. اگر فاصله A تا پای درخت ۲۰ متر باشد، مطلوب است :


- الف) طول درخت
- ب) سینوس زاویه‌ای که درخت با سطح زمین می‌سازد.
- پ) فاصله نوک درخت از زمین



۲- در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC به ضلع ۸ واحد، نقطه D ، که به فاصله ۷ واحد از رأس A قرار دارد از B و C چه فاصله‌ای دارد؟ (CD > BD؟) نقطه E ، که به فاصله ۵ واحد از C قرار دارد از D به چه فاصله‌ای است؟ اندازه زاویه AED چند درجه است؟




۳- یک کشتی از یک نقطه با سرعت  $60$  کیلومتر در ساعت در یک جهت در حرکت است و یک ساعت بعد با  $30^\circ$  انحراف به راست با سرعت  $40$  کیلومتر در ساعت به حرکت خود ادامه می‌دهد و یک ساعت و نیم پس از آغاز حرکتش در یک بندرگاه پهلو می‌گیرد. فاصله بندرگاه از مبدأ حرکت کشتی چند کیلومتر است؟



۴- در مثلث  $ABC$ ، میانه  $AM$  را رسم کرده‌ایم ( $MB = MC = \frac{a}{2}$ ). با نوشتن قضیه کسینوس‌ها در دو مثلث  $AMB$  و  $AMC$ ،  $b^2$  و  $c^2$  را محاسبه، و با جمع کردن دو تساوی حاصل، درستی تساوی زیر را ثابت کنید :

$$b^2 + c^2 = 2AM^2 + \frac{a^2}{2} \quad (\text{قضیه میانه‌ها})$$


در حالت خاص  $AB=4$  و  $AC=6$  و  $BC=8$ ، طول میانه  $AM$  را به دست آورید.



۵- در مثلث  $ABC$ ، نقطه دلخواه  $D$  روی  $BC$  مفروض است. به کمک قضیه کسینوس‌ها در دو مثلث  $ADB$  و  $ADC$  درستی تساوی زیر را ثابت کنید :

$$AB^2 \cdot DC + AC^2 \cdot DB = AD^2 \cdot BC + DB \cdot DC \cdot BC \quad (\text{قضیه استوارت})$$

به کمک قضیه استوارت، درستی قضیه میانه‌ها را نتیجه گیری کنید.



۶- مسئله ۲ را بار دیگر، این‌بار به کمک قضیه استوارت حل کنید.

## قضیه نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبه طول نیمسازها

### ۱- قضیه نیمسازهای زوایای داخلی

**قضیه ۱:** در هر مثلث، نیمساز هر زاویه داخلی، ضلع روبرو به آن زاویه را به نسبت اندازه های ضلع های آن زاویه تقسیم می کند.

فرض :  $\widehat{A_1} = \widehat{A_2}$

حکم :  $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$

اثبات : مطابق شکل از نقطه C خطی موازی نیمساز AD رسم می کنیم تا امتداد AB را در نقطه E قطع کند.

الف) چرا  $\widehat{A_1} = \widehat{C}$  و چرا  $\widehat{A_2} = \widehat{E}$  ؟

ب) با توجه به فرض، چه نتیجه ای درباره زوایای E و C می توان گرفت؟  
مثلث AEC چه نوع مثلثی است؟

پ) با توجه به قضیه تالس در مثلث EBC ( $AD \parallel EC$ ) نسبت  $\frac{BD}{CD}$  با کدام نسبت برابر است؟ با توجه به نتیجه قسمت (ب) اثبات را کامل کنید :

$$AD \parallel EC \Rightarrow \frac{BD}{CD} = \frac{AB}{.....} = \frac{AC}{.....}$$



یکی از نتایج فوری این قضیه این است که در هر مثلث به سادگی می توان طول های قطعاتی را که هر نیمساز روی ضلع مقابل ایجاد می کند با داشتن طول های اضلاع مثلث، محاسبه کرد :

**مثال :** در مثلث ABC،  $AB=7$ ،  $AC=5$  و  $BC=8$  است. طول های دو قطعه ای را به دست آورید که نیمساز زاویه B روی ضلع مقابل ایجاد می کند.



حل :

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{CD} = \frac{7}{8} \Rightarrow \frac{AD+CD}{CD} = \frac{7+8}{8} \Rightarrow \frac{AC}{CD} = \frac{15}{8} \Rightarrow$$

$$CD = \frac{8 \times 5}{15} = \frac{8}{3} , AD = AC - CD = 5 - \frac{8}{3} = \frac{7}{3}$$



در شکل رو به رو نیمساز زاویه  $C$  را رسم کنید و طول های دو قطعه ای را به دست آورید که این نیمساز روی  $AB$  جدا می کند.



## ۲- محاسبه طول نیمسازهای زوایای داخلی مثلث

در مثلث  $ABC$  برای محاسبه طول نیمساز داخلی زاویه  $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$ ، یعنی  $AD$  را امتداد می دهیم تا دایره محیطی مثلث را در  $E$  قطع کند و  $E$  را به  $C$  وصل می کنیم.

$$\text{الف) } \hat{E} = \hat{B}$$

ب) چرا مثلث های  $ABD$  و  $AEC$  مشابه اند؟

پ) نسبت های اضلاع متناظر آنها را بنویسید.

$$\frac{AC}{...} = \frac{AE}{...} = \frac{...}{BD}$$


ت) از تناسب اول نتیجه می گیریم :

$$AB \cdot AC = AD \cdot AE = AD(AD+DE) = AD^2 + AD \cdot DE$$

و چون  $AD \cdot DE = BD \cdot DC$  (چرا؟) بنابراین :

$$AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$$

**قضیه ۲:** در هر مثلث، مربع اندازه هر نیمساز داخلی برابر است با حاصل ضرب اندازه دو ضلع زاویه، منهای حاصل ضرب اندازه دو قطعه ای که نیمساز روی ضلع مقابل ایجاد می کند.



**مثال:** در مثلث  $ABC$ ،  $AB=3$ ،  $AC=5$  و  $BC=7$  است. طول نیمساز زاویه  $A$  را باید.

**حل:** به کمک قضیه (۱) طول های  $BD$  و  $CD$  را به دست می آوریم :

$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{BD+CD}{CD} = \frac{8}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{BC}{CD} = \frac{8}{5} \Rightarrow \frac{7}{CD} = \frac{8}{5} \Rightarrow CD = \frac{35}{8}, \quad BD = 7 - \frac{35}{8} = \frac{21}{8}$$

حال با توجه به قضیه (۲) داریم :

$$AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot CD = 3 \times 5 - \frac{35}{8} \times \frac{21}{8} =$$

$$15 - \frac{735}{64} = \frac{225}{64} \Rightarrow AD = \frac{15}{8}$$

۱- در مثلث ABC، M وسط BC و MQ و MP نیمسازهای زوایای A و C است.

$PQ \parallel BC$  ثابت کنید :  $\angle AMB = \angle AQC$

۲- در مثلث ABC،  $AB=7$ ،  $AC=4$  و  $BC=10$  است. طول نیمساز زاویه داخلی C را بدست آورید.

۳- با پر کردن جاهای خالی با فرض اینکه در شکل مقابل AD نیمساز زاویه  $\hat{A}$  است، روش دیگری برای اثبات قضیه نیمسازهای زوایای A و C است.



الف) چرا  $DH = DH'$  ؟

$$\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = \frac{\frac{1}{2}DH' \times \dots}{\frac{1}{2}DH \times \dots} = \dots \quad (1)$$

ب)

$$\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = \frac{\frac{1}{2}BD \times \dots}{\frac{1}{2}CD \times \dots} = \dots \quad (2)$$

از مقایسه (1) و (2) نتیجه می شود :




## قضیه هرون (محاسبه ارتفاع‌ها و مساحت مثلث)

با مسئله زیر در کتاب هندسه ۱ مواجه شدید :

در مثلث ABC با اضلاع ۱۳، ۱۴، ۱۵، ارتفاع AH رسم شده است. به کمک قضیه فیثاغورس در مثلث‌های AHB و AHC اندازه‌های x و y را به دست آورید و از آنجا مساحت مثلث را نیز محاسبه کنید :

به عنوان یادآوری، مسئله را با هم حل می‌کنیم :



$$\left. \begin{array}{l} CH^2 + AH^2 = \dots \\ BH^2 + AH^2 = \dots \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x^2 + y^2 = \dots \\ (14-x)^2 + y^2 = \dots \end{array} \right.$$

طرفین این دوتساوی را از هم کم می‌کنیم که با حذف  $y^2$  معادله‌ای بر حسب x به دست می‌آید :

$$x^2 - (14-x)^2 = \dots \Rightarrow x^2 - 196 - x^2 + 28x = \dots$$

$$\Rightarrow x = \dots, y = \dots, S = \frac{1}{2} BC \cdot AH = \dots$$

اگر همین روش را در حالت کلی در مثلث ABC، که AB=c، BC=a و AC=b به کار ببریم، نتیجه می‌شود :

$$S = \sqrt{P(P-a)(P-b)(P-c)} \quad (\text{دستور هرون})$$

که در این دستور  $P = \frac{a+b+c}{2}$  نصف محیط مثلث است.

(اثبات کامل این دستور را می‌توانید در مجله ریاضی انتهای فصل ببینید.)

**مثال :** مساحت مثلث با اضلاع به طول‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به کمک دستور هرون برابر است با :

$$2P = 13 + 14 + 15 = 42 \Rightarrow P = 21$$

$$S = \sqrt{21 \times 6 \times 7 \times 8} = \sqrt{7^2 \times 3^2 \times 2^4} = 84$$


و طول‌های سه ارتفاع مثلث نیز برابرند با :

$$h_a = \frac{2s}{a} = \frac{2 \times 14}{14} = 12, \quad h_b = \dots, \quad h_c = \dots$$

### کاردرکلاس

چهارضلعی ABCD یک مزرعه کشاورزی را نشان می‌دهد که تنها دو ضلع آن بر هم عمودند. طول‌های اضلاع زمین به سادگی قابل اندازه‌گیری، و اندازه‌های آنها در شکل مشخص شده‌است. با انجام دادن مراحل زیر مساحت این زمین را به دست آورید :

الف) اگر B را به D وصل کنیم، طول BD را چگونه به دست می‌آورید؟  
 $BD = \dots + \dots + \dots = \dots + \dots = \dots \Rightarrow BD = \dots$



ب) مساحت مثلث ABD را چگونه به دست می‌آورید؟

$$S_{ABD} = \frac{\dots \times \dots}{2} = \dots$$

پ) مساحت مثلث CBD را به کمک دستور هرون به دست آورید.

$$P = \frac{\dots + \dots + \dots}{2} = \dots, \quad S_{CBD} = \dots$$

ت) مساحت زمین کشاورزی برابر است با :

$$S = \dots + \dots = \dots$$

### فعالیت

می‌خواهیم دستور دیگری برای محاسبه مساحت مثلث به کمک نسبت‌های مثلثاتی به دست آوریم.

۱- در مثلث ABC، ارتفاع BH را رسم کرده‌ایم.

$$\sin A = \frac{\dots}{\dots} \Rightarrow BH = \dots$$


۲- مساحت مثلث ABC را به کمک ارتفاع BH بنویسید.


$$S_{ABC} = \frac{1}{2} BH \times AC = \dots$$

### نتیجه

مساحت هر مثلث برابر است با نصف حاصل‌ضرب اندازه‌های هر دو ضلع در سینوس زاویه بین آنها:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} b c \cdot \sin A = \frac{1}{2} a b \cdot \sin C = \frac{1}{2} a c \cdot \sin B$$





۱- مثلث  $ABC$  با اضلاع ۳ و ۵ و ۷ مفروض است. مساحت مثلث را با استفاده از دستور هرون به دست آورید.


$$P = \frac{.... + .... + ....}{2} = .... \Rightarrow S = \sqrt{P(P-a)(P-b)(P-c)} = ....$$

۲- مساحت مثلث را با استفاده از دستور  $S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A$  بنویسید.

۳- از مقایسه نتایج ۱ و ۲، اندازه زاویه منفرجه  $\hat{A}$  را به دست آورید.


### تمرین

۱- در مثلث  $ABC$ ،  $AC=6$  و  $\hat{A}=60^\circ$ . الف) طول  $BC$  را به دست آورید. ب) مساحت مثلث را تعیین کنید. پ) مقدار  $\sin B$  را پیدا کنید.



۲- دو زمین کوچک به شکل مثلث با یک دیوار به طول ۱۳ متر مطابق شکل از هم جدا شده‌اند. ابعاد زمین‌ها هم در شکل مشخص شده‌اند. اگر با برداشتن دیوار، دو زمین به یک زمین تبدیل شود، مساحت آن چقدر می‌شود؟  
نشان دهید دیوار مشترک با اضلاع ۴ متری و ۱۱ متری زاویه‌های برابر می‌سازد.  
 $(\alpha=\beta)$

۳- دستور محاسبه مساحت مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع  $a$  را به کمک دستور هرون به دست آورید.



۴- در شکل مقابل، اولاً طول  $BC$  را به دست آورید. ثانیاً مساحت چهارضلعی  $DECB$  را بیابید.

۵- در شکل صفحه بعد  $AD$  نیمساز زاویه  $\hat{A}$  است.  
با پر کردن جاهای خالی، دستوری دیگر برای محاسبه طول نیمساز زاویه  $A$  به دست آورید.

$$S_{ABC} = S_{ABD} + S_{ACD} \Rightarrow$$


$$\frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdots \times \cdots \times \sin \frac{A}{2} + \frac{1}{2} \cdots \times \cdots \times \sin \frac{A}{2}$$

$$\Rightarrow AB \cdot AC \cdot \sin A = AD \cdot \sin \frac{A}{2} (\cdots + \cdots)$$


$$\Rightarrow AD = \frac{AB \cdot AC \cdot \sin A}{(\cdots + \cdots) \sin \frac{A}{2}} = \frac{2AB \cdot AC \cdot \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}}{(\cdots + \cdots) \sin \frac{A}{2}}$$

$$\Rightarrow AD = \dots \Rightarrow d_a = \frac{2bc \cdot \cos \frac{A}{2}}{b+c}$$

- ۶- در مثلث ABC به اضلاع ۵ و ۶ و ۷ سانتی متر، نقطه‌ای که از اضلاع به طول‌های ۵ و ۶، به فاصله ۲ و ۳ سانتی متر است از ضلع بزرگ‌تر چه فاصله‌ای دارد؟  
راهنمایی: از مساحت مثلث استفاده کنید.



- ۷- در شکل، اولاً اندازه زاویه A را به دست آورید. ثانیاً مساحت چهارضلعی ABCD را بابد.  
راهنمایی: B را به D وصل کنید.



- ۸- ثابت کنید مساحت هر متوازی‌الاضلاع برابر است با حاصل ضرب دو ضلع مجاور در سینوس زاویه بین آن دو ضلع.

۹- به کمک قضیه کسینوس‌ها ثابت کنید در مثلث ABC :

$$\text{الف) } \hat{A} > 90^\circ \text{ و تنها اگر } a^2 > b^2 + c^2$$

$$\text{ب) } \hat{A} < 90^\circ \text{ و تنها اگر } a^2 < b^2 + c^2$$



$$\text{پ) } \hat{A} = 90^\circ \text{ اگر و تنها اگر } a^2 = b^2 + c^2$$

- ۱۰- به کمک نتیجه تمرین ۹، حاده (ند)، قائمه یا منفرجه (باز) بودن زاویه A را در هر یک از مثلث‌های زیر تعیین کنید :

$$\text{الف) } BC=9, AC=6, AB=10^\circ$$

$$\text{ب) } BC=9, AC=4, AB=8^\circ$$

$$\text{پ) } BC=17, AC=15, AB=8^\circ$$



### اثبات دستور هرون (برای محاسبه مساحت مثلث)

در مثلث  $ABC$ ،  $AB=c$  و  $AC=b$  و  $BC=a$  و  $AH=y$  و  $BH=x$  و  $CH=a-x$ . با نوشتن قضیه فیثاغورس در مثلث های قائم الزاویه  $ACH$  و  $ABH$  و تفاضل روابط به دست آمده خواهیم داشت:

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = c^2 \\ (a-x)^2 + y^2 = b^2 \end{array} \right. \Rightarrow b^2 - c^2 = (a-x)^2 - x^2 = a^2 + x^2 - 2ax - x^2 = a^2 - 2ax \Rightarrow x = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$$

$$y = \sqrt{c^2 - x^2} = \sqrt{c^2 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}\right)^2}$$

با ساده کردن این عبارت جبری و تجزیه آن به کمک اتحادهای جبری نتیجه می شود:

$$y = AH = \sqrt{\frac{4a^2c^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2}{4a^2}} = \frac{1}{2a} \sqrt{(2ac + a^2 + c^2 - b^2)(2ac - a^2 - c^2 + b^2)}$$

$$= \frac{1}{2a} \sqrt{[(a+c)^2 - b^2][(b-a)^2]} =$$

$$\frac{1}{2a} \sqrt{(a+c+b)(a+c-b)(b+a-c)(b+c-a)}$$

حال با فرض  $a+b+c=2p$  خواهیم داشت:

$$a+c-b=a+c+b-2b=2p-2b=2(p-b)$$

و به همین صورت:

$$b+c-a=2(p-a) \quad , \quad b+a-c=2(p-c)$$

و بنابراین:

$$AH = \frac{1}{2a} \sqrt{2p \times 2(p-a) \times 2(p-b) \times 2(p-c)} =$$

$$\frac{1}{a} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad , \quad S = \frac{1}{2} AH \cdot a = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

# منابع

- ادوین را، موئیز، هندسه مقدماتی از دیدگاه پیشرفته، ترجمه امیر خسروی و محمود نصیری (۱۳۷۷)، انتشارات مبتکران : تهران.
- حاجی بابایی، جواد و همکاران، (۱۳۹۳)، کتاب درسی هندسه ۲ پایه سوم ریاضی و فیزیک، تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، چاپ هجدهم.
- حسن زاده ماکویی، علی، طاهری، هوشنگ و فیروزنا، احمد، (۱۳۷۱)، کتاب درسی مثلثات پایه سوم ریاضی و فیزیک، تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- خسروی، امیر، دارابی، ابراهیم و نصیری، محمود (۱۳۷۱)، کتاب درسی هندسه ۱، تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- خسروی، امیر، دارابی، ابراهیم و نصیری، محمود (۱۳۷۱)، کتاب درسی هندسه ۲، تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
- گرینبرگ، ماروین. جی. هندسه‌های اقلیدسی و ناقلیدسی، ترجمه م. ه. شفیعیها، (۱۳۶۱)، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی : تهران.
- گویا، زهرا و همکاران، (۱۳۹۳)، کتاب درسی هندسه ۱ پایه دوم ریاضی و فیزیک، تهران : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، چاپ بیستم.
- نصیری، محمود، (۱۳۹۴)، هندسه متوسطه مبانی و مفهوم‌ها، انتشارات مبتکران.
- هاورد، ایوز، (۱۳۷۹). آشنایی با تاریخ ریاضیات (جلد اول)، ترجمه : محمدقاسم وحیدی اصل، تهران : مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم.

- Byer, O., Lazebnik, F., & Smeltzer, D. L. (2010). Methods for Euclidean geometry. MAA.
- Dodge, C. W. (2012). Euclidean geometry and transformational. Courier Corporation.
- Hvidsten. M. (2005). Geometry with geometry explorer<sup>TM</sup>. McGraw–Hill,
- Kinsey, L. C., Moore. T. E., & Prassidis. S. (2011). Geometry & symmetry. John Wiley & Sons.
- Libeskind, S. (2008). Euclidean and transformational geometry: A deductive inquiry. Jones & Bartlett Publishers.
- Martin, G. E. (2012). The foundations of geometry and the non–Euclidean plane. Springer Science & Business Media.
- O'Leary, M.L. (2010). Revolutins of Geometry (Vol. 87). John Wiley & Sons.
- Posamentier. A. S. (1984). Excursions in advanced Euclidean geometry Addison – Wesley.
- Tapp, K. (2011). Symmetry: a mathematical exploration. Springer Science & Business Media.
- Umble, R. N., & Han, Z. (2014). Transformational Plane Geometry. CRC Press.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتواهای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی، دبیرخانه راهبردی دروس و مدیریت محترم پروژه آفای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسمی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با اراده نظرات خود سازمان را در بهبود محتواهای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

## کتاب هندسه ۲ با کد ۱۱۱۲۱۳

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	محمد نیازی	چهارمحال و بختیاری	۲۳	اکرم حبیب اللهی	سمنان
۲	زهراء صیدی	ایلام	۲۴	مولود حاج رفیعی	قزوین
۳	لیلی دوستی	آذربایجان شرقی	۲۵	زهرا اصلانی	شهرستانهای تهران
۴	مرضیه خدابی	سمنان	۲۶	محمد سعید حکیمی	کردستان
۵	ماریا عزیزی	ایلام	۲۷	میترا سلماسی	خراسان شمالی
۶	نرگس اصلانی	آذربایجان شرقی	۲۸	علی خالقی	فارس
۷	عیسی دار	همزگان	۲۹	فاطمه محمدیها	شهر تهران
۸	کیانوش کمانی	مرکزی	۳۰	معصومه موذن زاده	هرمزگان
۹	جمال نوین	بیزد	۳۱	علی نصیری	قزوین
۱۰	نسرين رنجبران	همدان	۳۲	کمیل ایزدپناه	گلستان
۱۱	شهریار ساکنیان دهکردی	چهارمحال و بختیاری	۳۳	مصطفی سمیع اثاراتانی	گیلان
۱۲	حمیدرضا مومنی	کرمان	۳۴	یوسف کرمی	اربدیل
۱۳	مصطفی عرب پور داهوئی	کرمان	۳۵	راضیه کاظمی	خراسان جنوبی
۱۴	علی مراد سبزه کار	خراسان جنوبی	۳۶	فرخ حسن زاده	کهگیلویه و بویراحمد
۱۵	قاسم شعبانی چالوسر	مازندران	۳۷	محمد نبرد رحمنی	کردستان
۱۶	ایرج پویا	آذربایجان غربی	۳۸	جابر عامری	خوزستان
۱۷	قباد خالدی کوره	آذربایجان غربی	۳۹	لیلا محرابی نسب	خراسان شمالی
۱۸	نسرين دخت نجیبی	فارس	۴۰	مسعود منعی	مازندران
۱۹	شیرین جهانگیری	کرمانشاه	۴۱	کبری پور قبادی	لرستان
۲۰	سیما حقیقی اذر	گلستان	۴۲	بهرام وره نوی	اربدیل
۲۱	محسن حجاجی	شهر تهران	۴۳	حامد رنجبر کهخا	سیستان و بلوچستان
۲۲	شهناز مترجم	کرمانشاه			



