




کارنامه خرد

جزوه ریاضی دوازدهم

سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

استاد سهیل بابازاده





تابع

تعریف رابطه

مجموعه‌ای از تعدادی زوج مرتب را رابطه می‌نامند.


$$R = \{ (2, 3), (3, 5), (2, 6) \}$$

تابع نیست

تعریف تابع

هر تابع از مجموعه A به مجموعه B ، رابطه‌ای است که در آن به هر عضو از مجموعه A دقیقاً یک عضو از مجموعه B نظیر می‌شود (نه بیشتر و نه کمتر)


مثال: دستگاه زیر هر عضو مجموعه $A = \{ 3, 5, 6, 7, 1 \}$ را ابتدا دو برابر کرده و سپس یک واحد از حاصل به دست آمده کم می‌کند.



مجموعه خروجی‌های دستگاه عبارت است از:

$$B = \{ 5, 9, 11, 13, 1 \}$$

چون این رابطه هر عضو A را فقط به یک عضو از مجموعه B نسبت می‌دهد، پس این رابطه، یک تابع است. این تابع را به شکل‌های مختلفی نمایش می‌دهند.



نمایش پیکانی تابع

الف: نمایش تابع به شکل پیکانی

ب: نمایش تابع به شکل زوج‌های مرتب

$$\{ (3, 5), (5, 9), (6, 11), (7, 13), (1, 1) \}$$

ج: نمایش تابع به شکل جدول

x	3	5	6	7	1
y	5	9	11	13	1


د: نمایش تابع به شکل ضابطه

چون مقدار y برابر $2x - 1$ است، پس داریم: $y = 2x - 1$

$$\left\{ \begin{array}{l} f: A \rightarrow B \\ f(x) = 2x - 1 \end{array} \right.$$

هم دانه
هم دانه
برد زیر مجموعه
هم دامنه است

ه: نمایش تابع به شکل مختصات دکارتی



$$y = 3x - 1$$


نمایش دکارتی تابع

تعریف تابع (نمودار ون): یک رابطه به صورت نمودار ون زمانی تابع می‌باشد که از هر عضو مجموعه A دقیقاً یک پیکان خارج شود.


نکته: نیاز نیست که به هر عضو B دقیقاً یک پیکان وارد شود. ممکن است به یک عضو از مجموعه B اصلاً پیکانی وارد نشده، یک پیکان وارد شود و یا اینکه بیش از یک پیکان وارد شود. مجموعه A را دامنه و B را هم‌دامنه (مقصد) تابع می‌نامیم. برد تابع زیرمجموعه‌ای از هم‌دامنه آن است و مجموعه‌ی اعضای را شامل می‌شود که به آن‌ها پیکان وارد شده باشد.

نکته: در حالت کلی برد تابع همواره زیرمجموعه هم‌دامنه آن است. یعنی $R_f \subseteq B$ و در حالتی که $R_f = B$ باشد، گویند تابع پوشا می‌باشند.


تمرین: کدام یک از نمودارهای زیر یک تابع را مشخص می‌کند؟




(۱)




(۲)




(۳)



(۴)



(۵)



(۶)

$D_h = \{a, b, c\}$
 $B = \{m, n, p\}$
 $R_h = \{m, n\}$

تعریف زوج مرتبی تابع:

رابطه‌ای را که مؤلفه‌های اول تکراری نداشته باشد، یعنی به ازای هر x فقط یک y داشته باشد، را تابع می‌گویند و یا اینکه اگر مؤلفه‌های اول تکراری دارد، الزاماً مؤلفه‌های دوم آن‌ها نیز با هم برابر باشند.

مثال: اگر رابطه $f = \{(-1, m^2 - 3), (-1, 1), (2m, 3), (4, 6)\}$ تابع باشد، مقدار m را بیابید.


$$m^2 - 3 = 1 \Rightarrow m^2 = 4 \Rightarrow m = \pm 2$$

$$\times m = 2 \Rightarrow (2m, 3) = (4, 3) \neq (4, 6)$$

$$\boxed{m = -2} \Rightarrow (2m, 3) = (-4, 3)$$

تعریف تابع از روی نمودار: اگر به ازای هر خط موازی محور x ها، نمودار تابع f حداکثر در یک نقطه

قطع شود (یا اینکه قطع نشود) نمودار رسم شده، نمایشگر یک تابع می‌باشد.



توجه: در تابع به ازای هر ورودی (x)، فقط یک خروجی (y) داریم.

نکته: در برخی از موارد می‌توان با مثال نقض، تشخیص داد که یک رابطه تابع نیست.

مثال: کدام یک از روابط زیر نمایش دهنده یک تابع می‌باشد؟

$$[y] = x \xrightarrow{x=2} [y]=2 \Rightarrow 2 \leq y < 3 \text{ تابع نیست}$$

$$\sin y = \sqrt{x} \xrightarrow{x=0} \sin y = 0 \Rightarrow \{y = k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \text{ تابع نیست}$$

$$y^4 = x^3 \xrightarrow{x=1} \sqrt[4]{y^4} = \sqrt[4]{1} \rightarrow |y| = 1 \Rightarrow y = \pm 1 \quad (1, -1), (1, +1) \text{ تابع نیست}$$

$$|y| = x^4 \xrightarrow{x=2} |y| = 16 \rightarrow y = \pm 16 \quad (2, -16), (2, +16) \text{ تابع نیست}$$

$$y^3 - y = x^2 \xrightarrow{x=0} y(y^2 - 1) = 0 \rightarrow (y)(y+1)(y-1) = 0 \text{ تابع نیست}$$

$y=0 \quad y=-1 \quad y=+1$



نکته: هر رابطه به صورت $f(x) = a_1 y^1 + a_3 y^3 + a_5 y^5$ با ضرایب مثبت ($a_i > 0$) تابع است.

$$y^5 = \sqrt{x} \quad , \quad y^5 + 3y = \sin x \quad , \quad y^3 + y = x$$

نکته: اگر y درون قدرمطلق باشد، تابع نیست مگر آن که عبارت ساده شده و قدرمطلق از بین برود.

مثال: کدام عبارت زیر تابع است؟

$$|y+1| = x \xrightarrow{x=1} |y+1|=1 \Rightarrow y+1=\pm 1 \Rightarrow \begin{cases} y+1=1 \\ y+1=-1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=0 \\ y=-2 \end{cases} \quad (1,0), (1,-2)$$

$$|y+1| = \sin \pi[x] \xrightarrow[\substack{x \in \mathbb{R} \\ [x] \in \mathbb{Z}}]{\text{صفر}} |y+1|=0 \rightarrow y+1=0 \rightarrow y=-1, x \in \mathbb{R}$$



مقدار تابع: اگر $(a, b) \in f(x)$ باشد، در این صورت $f(a) = b$ بوده و گوییم مقدار تابع $f(x)$ در نقطه‌ی $x = a$ برابر با b است.

مثال: اگر $-f\left(\frac{x-1}{2}\right) + x = f(2)$ باشد، حاصل $f(3)$ را بیابید.

$$-f\left(\frac{x-1}{2}\right) + x = f(2) \quad \text{یا} \quad \frac{x-1}{2} = 2 \Rightarrow x=5$$

$$\frac{x-1}{2} = 2 \Rightarrow x-1=4 \Rightarrow x=5$$

$$-f(2) + 5 = f(2) \Rightarrow f(2) = \frac{5}{2}$$

$$5 - \frac{5}{2} = f(3) \Rightarrow f(3) = \frac{5}{2}$$

مثال: اگر $f(x) + x f(2) = x^2 + 5$ باشد، حاصل $f(1)$ را بیابید.

$$f(2) + 2f(2) = 2^2 + 5 \Rightarrow 3f(2) = 9 \Rightarrow f(2) = 3$$

$$f(x) + x f(2) = x^2 + 5$$

$$\xrightarrow{x=1} f(1) + 3 = 1 + 5 \Rightarrow f(1) = 3$$

مثال: اگر رابطه زیر یک تابع باشد، مقدار $f(2)$ چند است؟

$$f(x) = \begin{cases} 4x^2 + a & x \geq 1 \\ x + 4 & x \leq 1 \end{cases} \quad \left. \begin{aligned} f(1) &= 4(1)^2 + a = a + 4 \\ f(1) &= 1 + 4 = 5 \end{aligned} \right\} \Rightarrow a + 4 = 5 \Rightarrow a = 1$$

$$D_{f_1} \cap D_{f_2} = \{1\}$$

$$f(2) = 4(2)^2 + 1 = 17 \Rightarrow f(2) = 17$$

مثال: اگر $f(x) + \underbrace{[f(x)]}_{\in \mathbb{Z}} = 2 \underbrace{\left[x^2 + \frac{1}{2} \right]}_{\in \mathbb{Z}}$ رابطه زیر یک تابع باشد، مقدار $f(1)$ چند است؟

الزاماً $\Rightarrow f(x) \in \mathbb{Z}$

$[f(x)] = f(x)$

$f(x) + f(x) = 2 \left[x^2 + \frac{1}{2} \right] \Rightarrow$

$\boxed{x=1}: 2f(1) = 2(1) \rightarrow \boxed{f(1)=1}$

مثال: اگر $f(x) = 3 + \sqrt{2x}$ ، آن گاه $f(8)$ کدام است؟

(تقریبی ۱۶)

۸ (۴)

۷ (۳) ✓

۳ (۲)

۵ (۱)

$f(8) = 3 + \sqrt{2 \times 8} = 3 + 4 = 7$

مثال: ضابطه تابع قطعه‌ای f به صورت $f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 7 & x \geq 1 \\ 2x - 1 & x < 1 \end{cases}$ است، برای چند مقدار a ،

(ریاضی تیر ۱۴۰۳)

$f(1 - |a|) = f(2 + |a|)$ است؟

۱ (۴)

۲ (۳) ✓

۳ (۲)

۴ (۱)

$\boxed{a \neq 0}$:

$1 - |a| < 1 \xrightarrow{\text{بنا}} f(1 - |a|) = 2(1 - |a|) - 1 = 1 - 2|a|$

$2 + |a| > 1 \xrightarrow{\text{تایید}} f(2 + |a|) = (2 + |a|)^2 - (2 + |a|) - 7$

$4 + |a|^2 + 4|a| - 2 - |a| - 7 = 1 - 2|a| \Rightarrow$

$|a|^2 + 3|a| - 6 = 0 \rightarrow \begin{cases} |a| = 1 \\ |a| = -6 \end{cases} \rightarrow \boxed{a = \pm 1}$

$a = 0 \Rightarrow$

$f(1) \neq f(2) \Rightarrow -7 \neq -5$

نابرابرند

نکته: اگر بزرگ‌ترین توان y زوج باشد، عبارت مورد نظر تابع نیست.

نکته: برد توابع درجه فرد $\mathbb{R}$ است.

$y = -x^3 + 5x - 7$

$x \rightarrow \infty \Rightarrow -(+\infty)^3 = -\infty$

$x \rightarrow -\infty \Rightarrow -(-\infty)^3 = +\infty$



$R_f = [\min, +\infty)$

دامنه تابع:

حدود تعییرات متغیر x را دامنه تابع می‌نامیم.

دامنه تابع بصورت زوج مرتب:

مجموعه مؤلفه‌های اول یک تابع زوج مرتبی را دامنه می‌نامیم.

$f = \{ (3, 5), (5, 9), (6, 11), (7, 13), (1, 1) \} \Rightarrow D_f = \{ 1, 3, 5, 6, 7 \}$

دامنه توابع دکارتی:

اگر یک تابع در دستگاه مختصات دکارتی ترسیم شده باشد، تصویر نمودار بر روی محور x ها را دامنه تابع می نامیم.

$$D_f = [-5, 0] \cup (2, +\infty)$$

$$R_f = \{-3\} \cup [-2, +\infty)$$

تعیین دامنه تابع از روی ضابطه:

الف) دامنه توابع چندجمله ای:

$$f(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots \Rightarrow D_f = \mathbb{R}$$

$$f(x) = 2x - 3 \rightarrow D_f = \mathbb{R}$$

ب) دامنه توابع گویا:

اگر توابع $p(x)$ و $q(x)$ چندجمله ای باشند $g(x) = 4x^5 - 3x^2 + 4x - 5 \rightarrow D_g = \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{x \mid q(x) = 0\}$$

مثال: دامنه توابع زیر را بیابید.

$$f(x) = \frac{1}{x^4 - 4x^2} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{-2, 0, +2\} = \mathbb{R} - \{\pm 2, 0\}$$

$$x^4 - 4x^2 = 0 \Rightarrow (x^2)(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow (x)^2(x-2)(x+2) = 0$$

$x=0$ مضاعف $x=2$ ساده $x=-2$ ساده

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x} - 1} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{\frac{1}{8}\}$$

$$\sqrt[3]{x} - 1 = 0 \Rightarrow \sqrt[3]{x} = 1 \Rightarrow x = 1^3 \Rightarrow x = 1$$

$$f(x) = \frac{5}{[x] + 2} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - [-2, -1) = (-\infty, -2) \cup [-1, +\infty)$$

$$[x] + 2 = 0 \Rightarrow [x] = -2 \Rightarrow -2 \leq x < -1$$

مخرج نامعنی نشد



$$f(x) = \frac{3x + 6}{|x - 1| - 2} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{-1, 3\}$$

$$|x - 1| - 2 = 0 \Rightarrow |x - 1| = 2 \Rightarrow x - 1 = \pm 2 \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3 \\ x - 1 = -2 \Rightarrow x = -1 \end{cases}$$

مثال: اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{2}{x^2 + x + m + 1}$ برابر $\mathbb{R}$ باشد، حدود m را بیابید. کسی
 $D_f = \mathbb{R} - \{\text{ریشه معرج}\}$

$$x^2 + x + m + 1 = 0$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow (1)^2 - 4(1)(m+1) < 0 \Rightarrow 1 - 4m - 4 < 0 \Rightarrow$$

$$-3 < -4m \Rightarrow \boxed{m > -\frac{3}{4}}$$

مثال: اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{6}{2x^2 + mx + n}$ برابر $\mathbb{R} - \{3\}$ باشد، مقادیر m و n را بیابید.

تنهاریشه معرج
 $x=3 \Rightarrow 2(x-3)^2 = 2x^2 - 12x + 18$




$D_f = \mathbb{R} - \{3\} \Rightarrow \text{معرج} = 2(x-2)(x-5) = 2x^2 - 14x + 20 \Rightarrow \begin{cases} m = -14 \\ n = 20 \end{cases}$

پ) دامنه توابع رادیکالی: رادیکال فرجه زوج بر دامنه تابع بی تأثیر است و می توانیم آن را در نظر نگیریم ولی در مورد رادیکال فرجه زوج باید به این نکته توجه کنیم که عبارت زیر رادیکال فرجه زوج نباید منفی باشد.


مثال: دامنه توابع زیر را بیابید.

$$f(x) = \sqrt{x^6 - x^4} \Rightarrow x^4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2(1-x^2) \geq 0$$



$$D_f = (-\infty, 1]$$

$$f(x) = \sqrt{|x|(x-3)} \Rightarrow |x|(x-3) \geq 0 \Rightarrow D_f = [3, +\infty) \cup \{0\}$$




$$f(x) = \frac{3}{\sqrt{x-1} - 1} \Rightarrow x-1 \geq 0 \Rightarrow \boxed{x \geq 1}$$

$$\sqrt{x-1} - 1 \neq 0 \Rightarrow \sqrt{x-1} \neq 1 \Rightarrow x-1 \neq 1 \Rightarrow \boxed{x \neq 2}$$

$$D_f = [1, 2) \cup (2, +\infty)$$

مثال: دامنه تابع $f(x) = \sqrt{\frac{9-x^2}{2x}}$ را بیابید.

$$\frac{9-x^2}{2x} \geq 0 \Rightarrow \frac{(3-x)(3+x)}{2x} \geq 0$$



$$D_f = (-\infty, -3] \cup (0, 3]$$

مثال: اگر دامنه تابع $f(x) = \sqrt{x^2 - x - m}$ برابر $\mathbb{R}$ باشد، حدود m را بیابید.

$$x^2 - x - m \geq 0$$

بسی

$$a > 0 \rightarrow 1 > 0$$

$(\Delta = 0) \cup (\Delta < 0) = \Delta \leq 0 \Rightarrow 1 - 4(-m) \leq 0 \Rightarrow 4m \leq -1 \Rightarrow m \leq -\frac{1}{4}$

مثال: اگر $f(x) = \sqrt{\cos \pi x - 1}$ رابطه زیر یک تابع باشد، مقدار $f\left(\frac{3}{2} - f(x)\right)$ چند است؟

$$\cos \pi x - 1 \geq 0 \Rightarrow \cos \pi x \geq 1 \rightarrow \cos \pi x = 1 \Rightarrow f(x) = 0$$

بنده یا مساوی

$$f\left(\frac{3}{2} - f(x)\right) = \sqrt{\cos \pi \left(\frac{3}{2} - f(x)\right) - 1} = \sqrt{-\sin \pi \left(\frac{3}{2} - f(x)\right) - 1} = \sqrt{-1} \notin \mathbb{R}$$

ت) دامنه توابع لگاریتمی:

$$f(x) = \log_{h(x)} g(x) \Rightarrow D_f = \{x \mid g(x) > 0, h(x) > 0, h(x) \neq 1\}$$

مثال: دامنه تابع $f(x) = \log_{(x-1)} |x|$ را بیابید.

$$\begin{aligned} ① \quad |x| > 0 &\Rightarrow \mathbb{R} - \{0\} \\ ② \quad x - 1 > 0 &\Rightarrow x > 1 \\ ③ \quad x - 1 \neq 1 &\Rightarrow x \neq 2 \end{aligned}$$

حذف

$$D_f = (1, +\infty) - \{2\} = (1, 2) \cup (2, +\infty)$$

دامنه توابع مثلثاتی:

توابع سینوسی و کسینوسی همانند فرجه فرد بر دامنه تابع تأثیری ندارند و برای تعیین دامنه توابع به صورت تانژانت و کتانژانت، عبارت را به صورت کسری می نویسیم.


$$f(x) = \sin(g(x)) \Rightarrow D_f = D_g$$

$$f(x) = \cos(g(x)) \Rightarrow D_f = D_g$$

$$f(x) = \tan(g(x)) \Rightarrow D_f = \left\{x \mid g(x) \neq k\pi + \frac{\pi}{2}\right\}$$

$$f(x) = \cot(g(x)) \Rightarrow D_f = \{x \mid g(x) \neq k\pi\}$$

$$\tan(g(x)) = \frac{\sin(g(x))}{\cos(g(x))}$$



مثال: دامنه توابع زیر را بیابید.

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{[x]}\right) \Rightarrow [x] = 0 \Rightarrow 0 \leq x < 1 \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - [0, 1) = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$$

مخرج را منفی نشد

$$f(x) = \tan(\pi x) = \frac{\sin(\pi x)}{\cos(\pi x)}$$

$$D_f = \mathbb{R} - \left\{x = \frac{(2k+1)}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$$


$\cos(\pi x) \neq 0 \Rightarrow \pi x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x \neq \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbb{Z} \dots, -\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \dots$

مثال: دامنه تابع $f(x) = \sqrt[4]{\frac{2}{x^2} - \frac{9}{2}} + \sqrt[3]{2x - x^2}$ کدام است؟

(تقریبی خارج ۹۶)

$$\frac{2}{x^2} - \frac{9}{2} \geq 0 \Rightarrow \frac{4 - 9x^2}{2x^2} \geq 0$$

مضاعف



(۱) $\left[\frac{2}{3}, 2\right]$ X

(۲) $\left[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]$ X

(۳) $\left[-\frac{2}{3}, 0\right) \cup (0, 2]$ X

(۴) $\left[-\frac{2}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{2}{3}\right]$ ✓

$x=1 \Rightarrow 2 - \frac{9}{2} \geq 0$ ✗


مثال: دامنه تابع با ضابطه $f(x) = \log_2(|x^2 - 2| - x)$ کدام است؟

(تقریبی خارج ۱۴۰۰)

$$|x^2 - 2| - x > 0$$

$x=0 \Rightarrow 2 > 0$ ✓

$x=1.5 \Rightarrow 0.25 - 1.5 > 0$ ✗



(۱) $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (2, +\infty)$ X

(۲) $(-\infty, 1) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ X

(۳) $[-1, 1) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ X

(۴) $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ ✓



مثال: دامنه تابع $f(x) = \sqrt{1 - \log(x^2 - 3x)}$ کدام است؟

(ریاضی ۹۵)

$x^2 - 3x > 0 \rightarrow x(x-3) > 0$ $(-\infty, 0) \cup (3, +\infty)$

(۱) $[-2, 0) \cup (3, 5]$ ✓

(۲) $[-2, 0] \cup (3, 5)$ X

(۳) $[-2, 3)$ X

(۴) $(0, 5]$ X

$1 - \log(x^2 - 3x) \geq 0 \rightarrow \log(x^2 - 3x) \leq 1$

$x=0 \rightarrow 0 > 0$ ✗

$\log(x^2 - 3x) \leq \log 10$

$x=2 \rightarrow -2 > 0$ ✗

بزرگتر از ۱ نیست
دهانه کدش نمی باشد

$x^2 - 3x \leq 10 \rightarrow x^2 - 3x - 10 \leq 0$

$(x-5)(x+2) \leq 0$ $[-2, 5]$



مثال: دامنه تغییرات تابع $f(x) = \log_6 \left(\frac{1}{6 + \sqrt{|x|} - |x|} \right)$ ، کدام است؟ (ریاضی ۱۴۰۰)


- (۱) $(-9, 9)$ ✓ (۲) $(-4, 9)$ ✗ (۳) $(4, 9)$ ✗ (۴) $(-4, 4)$ ✗

$x=0 \Rightarrow \frac{1}{6} > 0$ ✓ $x=5 \Rightarrow \frac{1}{1+\sqrt{5}} > 0$ $x=-5 \Rightarrow \frac{1}{1+\sqrt{5}} > 0$

$\frac{1}{6 + \sqrt{|x|} - |x|} > 0$



مثال: اگر شکل روبه‌رو نمودار $y = f(x)$ باشد، دامنه $\sqrt{x} f(x)$ کدام است؟ (ریاضی ۹۲)



$f(-1) < 0$
 $x f(x) \geq 0$
 $x=0$ $-3, 1, 2$


x	-4	-3	0	1	2
$f(x)$	-	+	-	+	+
$x f(x)$	-	+	0	+	+

- (۱) $[-3, 2]$ ✗
 (۲) $[0, 2]$ ✗
 (۳) $[-4, -3] \cup [1, 2]$ ✗
 (۴) $[-3, 0] \cup [1, 2]$ ✓✓

$x=-1$ + ✓
 $x=-1.5$ - ✗

مثال: شکل زیر، نمودار تابع با ضابطه $y = f(x)$ است. دامنه تابع غیرنقطه‌ای $\sqrt{(x+1)} f(x)$ ،

(ریاضی خارج ۹۷)



$x=0 \Rightarrow \sqrt{1 \times f(0)} = \sqrt{-} \notin \mathbb{R}$
 $x=3 \Rightarrow \sqrt{4 \times f(3)} = \sqrt{+} \text{ OK}$

- کدام است؟
 (۱) $[-3, 2]$ ✗
 (۲) $[-1, +\infty)$ ✗
 (۳) $(-\infty, -1]$ ✗
 (۴) $\mathbb{R} - (-3, 2)$ ✓



توابع چندجمله‌ای:


هر تابع به صورت $f(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + cx + d$ را که در آن ضرایب اعداد حقیقی بوده و n یک عدد صحیح نامنفی باشد، یک تابع چندجمله‌ای از درجه n می‌نامیم.

به بزرگترین توان مطرح شده در متغیر مستقل (x) تابع چندجمله‌ای، درجه چندجمله‌ای می‌گوییم. x^{24} x^{18} x^{12} x^6 x^2 x

مثلاً تابع $f(x) = x^5 + 6x^4 + 12x + 4$ از درجه ۵ می‌باشد.

$f(x) = (x^2 - 8x)^{12} (5x^3 + 2x^2)^6$

نکته: توابع درجه زوج می‌توانند ریشه نداشته باشند یعنی نمودار این توابع امکان دارد محور افقی را قطع نکند اما هر تابع چندجمله‌ای که از درجه فرد باشد، بطور قطعی حداقل یک ریشه خواهد داشت.



تابع درجه ۳:

تابع چندجمله‌ای با ضابطه $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) یک تابع درجه ۳ است که در این تابع چون درجه فرد است، الزاماً یک ریشه دارد یعنی نمودار آن محور افقی را حداقل در یک نقطه قطع می‌کند. اینجا به طور خاص تابع $f(x) = x^3$ را بررسی می‌کنیم. دامنه و برد این تابع کل مجموعه اعداد حقیقی می‌باشد. ابتدا نمودار تابع را به کمک نقطه‌یابی رسم می‌کنیم.

x	$f(x) = x^3$
-۲	-۸
-۱	-۱
$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$
۰	۰
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$
۱	۱
۲	۸

$y = ax^3 + \dots$


$2(2)^3 = +16$

$y = 2x^3 + \dots$

$(2, 16)$

$(1, 1)$

$2 \times 1 = 2$



$(x+1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$


$(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

$(x+3)^3 = x^3 + 9x^2 + 27x + 27$

$(2x+1)^3 = 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$

مثال: با رسم توابع $f(x) = x^2$ و $f(x) = x^3$ بیان کنید در چه بازه‌هایی نمودار تابع درجه ۳ پایین‌تر از

نمودار تابع سهمی قرار می‌گیرد؟



رسم تابع به کمک تبدیلات:

اگر نمودار تابع $f(x)$ را داشته باشیم، در این صورت:

- ۱- برای رسم نمودار تابع $f(x) + k$ ($k > 0$)، نمودار تابع $f(x)$ را k واحد به سمت بالا منتقل می‌کنیم.
- ۲- برای رسم نمودار تابع $f(x) - k$ ($k > 0$)، نمودار تابع $f(x)$ را k واحد به سمت پایین منتقل می‌کنیم.
- ۳- برای رسم نمودار تابع $af(x)$ ($a > 1$)، نمودار تابع $f(x)$ در امتداد محور y ها، با ضریب a کشیده می‌شود. (انبساط عمودی)
- ۴- برای رسم نمودار تابع $af(x)$ ($0 < a < 1$)، نمودار تابع $f(x)$ در امتداد محور y ها، با ضریب a فشرده می‌شود. (انقباض عمودی)
- ۵- برای رسم نمودار تابع $f(x+k)$ ($k > 0$)، نمودار تابع $f(x)$ را k واحد به سمت چپ منتقل می‌کنیم.
- ۶- برای رسم نمودار تابع $f(x-k)$ ($k > 0$)، نمودار تابع $f(x)$ را k واحد به سمت راست منتقل می‌کنیم.

۷- برای رسم نمودار تابع $f(ax)$ ($a > 1$)، نمودار تابع $f(x)$ در امتداد محور x ها، با ضریب $\frac{1}{a}$ فشرده می‌شود. (انقباض افقی)


۸- برای رسم نمودار تابع $f(ax)$ ($0 < a < 1$)، نمودار تابع $f(x)$ در امتداد محور x ها، با ضریب $\frac{1}{a}$ کشیده می‌شود. (انبساط افقی)

۹- برای رسم نمودار تابع $-f(x)$ ، نمودار تابع $f(x)$ نسبت به محور x ها، قرینه می‌شود.

۱۰- برای رسم نمودار تابع $f(-x)$ ، نمودار تابع $f(x)$ نسبت به محور y ها، قرینه می‌شود.

۱۱- برای رسم نمودار تابع $-f(-x)$ ، نمودار تابع $f(x)$ نسبت به مبدأ مختصات قرینه می‌شود.




مثال: اگر نمودار تابع $f(x)$ به صورت مقابل باشد، مطلوبست دامنه و برد و رسم توابع زیر:




پ) $y = f(x - 1) - 1$

ب) $y = f(-x)$

الف) $y = f(2x)$



مثال: نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. اگر تابع $g(x) = 3\left(\frac{1}{2}x\right) + 1$ باشد، آن گاه:




الف) دامنه و برد تابع g را به صورت بازه بنویسید.

ب) اگر $A(-2, 1)$ یک نقطه از نمودار تابع f باشد،

آن گاه نقطه متناظر A روی نمودار تابع g را بنویسید.

مثال: فرض کنید نمودار تابع $y = f\left(-\frac{1}{2}x\right)$ به صورت زیر باشد. نمودار تابع $y = 3f(-2x)$ را رسم

کرده و دامنه و برد آن را مشخص نمایید.




مثال: با استفاده از نمودار تابع $f(x) = x^3$ ، نمودار توابع زیر را رسم کنید.

پ) $y = -x^3 - 2$

ب) $y = (x + 2)^3$


الف) $y = -(x - 2)^3$

مثال: اگر نمودار تابع $f(x) = (x - m)^3 + h$ به صورت شکل زیر باشد، آن گاه نمودار تابع $f(x) = -(x - h)^3 + m$ از کدام ناحیه دستگاه مختصات عبور نمی کند؟



مثال: به ازای چه مقداری از k ، تابع $f(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + k$ از ناحیه دوم دستگاه مختصات نمی گذرد؟





مثال: اگر نمودار تابع $f(x) = (x + a)(x^2 + bx + c)$ به صورت مقابل باشد، حاصل $a.b + c$ را بیابید.



مثال: اگر دامنه و برد تابع $f(x)$ به صورت $D_f = [-1, 2]$ و $R_f = (-3, 1]$ باشد، دامنه و برد تابع $y = 2f(2x - 1)$ را بیابید.

مثال: نمودار تابع $f(x) = |x^3 - 1|$ کدام است؟





(موج آزمون نشر الگو)



(IQ کاج)



مثال: نمودار تابع $f(x) = \sqrt{-2 + |2x|}$ کدام است؟



مثال: نمودار تابع $y = \sqrt{x^2 - 2|x| + 1}$ و خط $y = \frac{1}{2}$ در چند نقطه متقاطع اند؟

(1Q)

(۴) ۴



(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) صفر

مثال: نمودار تابع $y = \frac{x}{|x|} \sqrt[3]{x+1}$ کدام است؟






(موج آزمون نشر الگو)








مثال: نمودار تابع $y = f(x)$ در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $y = 2f(x-1)$

(موج آزمون نشر الگو)






کدام است؟



مثال: شکل مقابل، نمایش نمودار تابع $y = f(x)$ است. نمودار تابع $y = 1 - 2f(-2x)$ کدام است؟
(فوشوان)



مثال: نمودار تابع $y = f(x)$ در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع $g(x) = -2f(x) + |f(x)|$ کدام است؟
(موج آزمون نشر الگو)



مثال: اگر نقطه $A(3, -1)$ روی نمودار $y = f(x)$ باشد، نقطه متناظر با A روی نمودار تابع $y = 3f(2x + 1) + 5$ کدام است؟
(IQ کج)

- (1) $(3, 2)$ (2) $(7, 2)$ (3) $(1, 2)$ (4) $(1, -8)$

مثال: نمودار تابع $y = x^3$ را به کمک انتقال به نمودار $y = x^3 - 6x^2 + 12x$ منطبق می‌کنیم.
در این صورت نقطه‌ای به طول $x = 1$ در نمودار اولیه به کدام نقطه در نمودار ثانویه تبدیل می‌شود؟

(1Q)

- (۱) $(-3, 9)$ (۲) $(-3, -9)$ (۳) $(3, -9)$ (۴) $(3, 9)$

مثال: اگر نقطه $(4, 0)$ روی نمودار تابع $y = 2f(3x - 4) + 6$ باشد، کدام نقطه روی نمودار تابع

$$y = \frac{1}{3}f(-1 - 3x) + 1 \text{ است؟}$$

- (۱) $(-3, 0)$ (۲) $(3, 0)$ (۳) $(3, 3)$ (۴) $(-3, 3)$

مثال: طول نقاط روی نمودار تابع $y = f(x)$ را نصف می‌کنیم و عرض آن‌ها را سه برابر می‌کنیم. سپس نمودار را دو واحد به سمت چپ می‌بریم و در آخر نسبت به محور عرض‌ها قرینه می‌کنیم. ضابطه تابعی که نمودار آن رسم شده کدام است؟

(موج آزمون نشر الگو)

- (۱) $2y = 3f(4 - 2x)$ (۲) $y = 3f(2 - 2x)$
(۳) $y = -3f(2x + 2)$ (۴) $y = -3f(2x + 4)$

مثال: نمودار تابع $y = x^2 - x - 3$ را ۲ واحد به طرف x های منفی، سپس ۹ واحد به طرف y های منفی انتقال می‌دهیم. نمودار جدید، در کدام بازه زیر محور x ها است؟

(ریاضی خارج ۹۸)

- (۱) $(-5, 2)$ (۲) $(-5, 3)$ (۳) $(-2, 3)$ (۴) $(-2, 5)$

مثال: ابتدا قرینه نمودار تابع $f(x) = (x-1)^2$ را نسبت به مبدأ مختصات رسم کرده، سپس منحنی حاصل را ۴ واحد به سمت بالا انتقال می‌دهیم. طول نقاط تلاقی منحنی اخیر با منحنی اصلی، کدام است؟

(ریاضی خارج ۹۹)

- (۱) $0, 2$ (۲) $-1, 1$ (۳) $-1, 2$ (۴) $-2, 1$



مثال: نمودار تابع با ضابطه $f(x) = 4x - x^2$ را در امتداد محور x ها، ۲ واحد در جهت منفی انتقال می‌دهیم. فاصله نقطه برخورد منحنی حاصل با نمودار تابع f ، از مبدأ مختصات کدام است؟

(تجربی ۱۴۰۱)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) $2\sqrt{5}$ (۴) $\sqrt{10}$



تساوی دو تابع: دو تابع $f(x)$ و $g(x)$ با شرایط زیر با هم مساوی هستند.

$$۱) D_f = D_g$$

$$۲) \forall x \in D : f(x) = g(x)$$

مثال: برابر دو تابع زیر را بررسی نمایید.

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{\sin^2 2x} \\ g(x) = \sin 2x \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) = \log x(x-2) \\ g(x) = \log x + \log(x-2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x(x-1)} \\ g(x) = \sqrt{x} \sqrt{x-1} \end{cases}$$

(تقریبی خارج ۹۷)

مثال: کدام یک از توابع زیر، با تابع $y = \log \frac{x-2}{x}$ برابر است؟

$$\log \frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x} \quad (۲)$$

$$2 \log(x-2) - \log x \quad (۱)$$

$$2 \log \sqrt{\frac{x-2}{x}} \quad (۴)$$

$$\frac{1}{2} \log \left(\frac{x-2}{x} \right)^2 \quad (۳)$$

اعمال جبری روی توابع و دامنه‌ی آنها

$$\begin{cases} (f+g)(x) = f(x) + g(x) \\ (f-g)(x) = f(x) - g(x) \\ (f \times g)(x) = f(x) \times g(x) \\ (f \div g)(x) = f(x) \div g(x) \quad (g(x) \neq 0) \end{cases} \quad \begin{cases} D_{f+g} = D_f \cap D_g \\ D_{f-g} = D_f \cap D_g \\ D_{f \times g} = D_f \cap D_g \\ D_{f \div g} = (D_f \cap D_g) - \{x \mid g(x) = 0\} \end{cases}$$

مثال: اگر $f(x) = \{(2, -1), (0, 0), (1, 4), (3, 2)\}$ و $g(x) = \{(2, 1), (0, 4), (5, 3), (1, 2)\}$ باشد، حاصل عبارات زیر را بیابید.




۱) $f - g =$

۲) $f + 2 =$

۳) $\frac{-1}{f} + 2g =$

مثال: اگر $f(x) = \log x$ و $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$ باشند، دامنه‌ی تابع $\frac{f}{g}$ را بیابید.


مثال: نمودار تابع $y = \sqrt{x} + \sin x$ را رسم کنید.




مثال: دامنه تابع زیر را بیابید.

$$f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{\frac{x}{2-x}}$$

مثال: در شکل مقابل نمودار توابع f و g رسم شده‌اند مقدار $(f+g)\left(\frac{3}{2}\right)$ را بیابید.




مثال: در شکل مقابل نمودار توابع f و g رسم شده‌اند. نمودار تابع $(f \circ g)(x)$ را رسم کنید.



مثال: اگر $f = \{(1, 2), (3, 4), (5, 6), (-1, 5)\}$ ، $g = \{(1, 4), (2, -1), (5, 2), (4, 6)\}$ و $(f + g)(a) = 2(f - g)(a)$ ، مقدار a کدام است؟
(موج آزمون نشر الگو)

- (۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

مثال: نمودارهای دو تابع f و $f - g$ در شکل زیر رسم شده است. حاصل $g(-3) + g(3)$ کدام است؟
(مهر و ماه)



- (۱) ۱۰ (۲) ۱۶ (۳) ۲۲ (۴) ۶

مثال: اگر $f(x) = 1 + \sqrt{1-x^2}$ و $g(x) = 1 - \sqrt{1-x^2}$ ، برد تابع $f \circ g$ کدام است؟ (نزدیام فیلی سبز)

- (۱) $\mathbb{R}$ (۲) $\{1\}$ (۳) $[0, 1]$ (۴) $[0, +\infty)$

مثال: اگر $f(x) = 2 - |x+1|$ و $g(x) = x + |x|$ ، آن گاه برد تابع $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ کدام است؟
(ریاضی خارج ۹۷)


- (۱) $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$ (۲) $(-1, +\infty)$ (۳) $\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ (۴) $(0, +\infty)$



ترکیب دو تابع

$$x \rightarrow \boxed{g(x)} \rightarrow g(x) \rightarrow \boxed{f(x)} \rightarrow f(g(x)) = (f \circ g)(x)$$


$$x \rightarrow \boxed{f(x)} \rightarrow f(x) \rightarrow \boxed{g(x)} \rightarrow g(f(x)) = (g \circ f)(x)$$



دامنه تابع مرکب:

$$D_{f \circ g} = D_{f(g(x))} = \{ x \in D_g, g(x) \in D_f \}$$

$$D_{g \circ f} = D_{g(f(x))} = \{ x \in D_f, f(x) \in D_g \}$$



مثال: اگر $f(x) = x^2 + 1$ و $g(x) = x + 2$ باشد، معادله زیر را حل کنید.


$$(f \circ g)(x) + (g \circ f)(x) = (g \circ g)(x)$$

مثال: اگر $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ باشد، دامنه و ضابطه تابع $(f \circ f)(x)$ را بیابید.

مثال: اگر $f(x) = \frac{x+1}{x}$ و $(f \circ g)(x) = x$ ، ضابطه $g(x)$ را بیابید.

مثال: اگر $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ و $(g \circ f)(x) = \frac{x+1}{2}$ ، ضابطه $g(2)$ را بیابید.

مثال: نمودارهای توابع $f(x)$ و $g(x)$ در شکل زیر ترسیم شده‌اند. مقادیر $(f \circ g)(1)$ و $(g \circ f)\left(\frac{5}{2}\right)$ را بیابید.



مثال: اگر $f(x) = \sqrt{1-x}$ و $g(x) = \sqrt{x} - 2$ باشد، دامنه تابع $(g \circ f)(x)$ را بیابید.

مثال: اگر $f = \{(-3, 7), (-1, 2), (2, 4), (0, 5), (6, -2)\}$ و $g(x) = \sqrt{2x+3} - x$ مقدار $(f \circ g)(3)$ کدام است؟

(گزینه دو ۱۴۰۰)

۵ (۴)

۳ (۳)

۷ (۲)

۱ (صفر)

مثال: اگر $f(x) = x - 3$ و $g = \{(-2, 4), (3, 0), (-5, 7)\}$ باشند، حاصل عبارت $(f \circ g)(3) + (g \circ f)(-2)$ کدام است؟

(گزینه دو ۹۹)

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



مثال: اگر $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ و $f = \{(x, 2x - 1) \mid x \in A\}$ تابع $f(f(x))$ چند عضو دوتایی دارد؟

(تجربی ۸۴)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

(تجربی ۸۶)

مثال: اگر $f(x) = [x]$ و $g(x) = \frac{x}{1-x}$ ، آن گاه $(f \circ g)(\sqrt{2})$ کدام است؟

- (۱) -۴ (۲) -۳ (۳) -۲ (۴) -۱



(تجربی خارج ۸۸)

مثال: اگر $f(x) = \sqrt{2-x-x^2}$ ، مقدار $f(f(-1))$ کدام است؟

- (۱) تعریف نشده (۲) صفر (۳) ۱ (۴) $\sqrt{2}$

مثال: در تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} x - \sqrt{x+4} & x > 3 \\ 2x + 3 & x \leq 3 \end{cases}$ مقدار $f(f(5)) + f(f(1))$ کدام است؟

(تجربی ۹۰)

- (۱) ۹ (۲) ۷ (۳) ۸ (۴) ۶



مثال: اگر $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{1-x}} & x < -1 \\ \frac{-5}{x} + 1 & -1 \leq x < 1 - \{0\} \\ \sqrt{x^2 + x + 6} & x \geq 1 \end{cases}$ باشد، حاصل $f\left(f\left(\frac{-5}{4}\right)\right)$

کدام است؟

(فوشوان)

$\frac{7}{6}$ (۴)

۷ (۳)

۶ (۲)

-۵ (۱)

(ریاضی ۱۴۰۱)

مثال: اگر $f(x) = \frac{\sqrt{2}x}{3x - \sqrt{2}}$ باشد، حاصل $(f \circ f \circ f)(\sqrt{2})$ کدام است؟

$\frac{1}{2}$ (۴)

۲ (۳)

$\sqrt{2}$ (۲)

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ (۱)

(IQ کج)

مثال: اگر $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ، مقدار $\underbrace{f \circ f \cdots \circ f}_{1397 \text{ بار}}(\sqrt{2})$ کدام است؟

$2(\sqrt{2}-1)$ (۴)

$2(\sqrt{2}+1)$ (۳)

$2-\sqrt{2}$ (۲)

$2+\sqrt{2}$ (۱)



مثال: اگر $f(x) = 2[x] - x$ و $g(x) = f([x + f(x)])$ باشد، مقدار $(g \circ f)\left(\frac{-5}{3}\right)$

کدام است؟

(تجربی ۱۴۰۲)

(۱) ۴

(۲) - ۴

(۳) - ۶

(۴) ۶

مثال: اگر $f(x) = x + [x]$ و $g(x) = f([x - f(x)])$ باشد، مقدار $(f \circ g)\left(\frac{-1}{3}\right)$ کدام

است؟

(تجربی خارج ۱۴۰۲)

(۱) - ۲

(۲) ۲

(۳) - ۴

(۴) ۴



مثال: اگر $f(x) = 2x + a$ ، $g(x) = 6 - 2x$ و $(f \circ g)(2) - (g \circ f)(a) = 3$ ، مقدار a کدام

است؟

(موج آزمون نشر الگو)

(۱) $\frac{5}{3}$

(۲) $\frac{3}{5}$

(۳) $\frac{7}{5}$

(۴) $\frac{5}{7}$



$$\frac{(f \circ g)(1) + (g \circ f)(-4)}{(f \circ f)(-3)}$$

مثال: شکل مقابل نمودار توابع f و g را نمایش می دهد. حاصل

کدام است؟


(۱) ۳

(۲) -۳

(۳) ۲


(۴) قابل محاسبه نیست.

(مهر و ماه)




(ریاضی تیر ۱۴۰۳)

مثال: در شکل زیر، قطر مربع هاشورخورده، کدام است؟



(ریاضی خارج ۱۴۰۳)

مثال: در شکل زیر، قطر مربع هاشورخورده، کدام است؟



(مهر و ماه)


مثال: اگر نمودار تابع f به صورت مقابل باشد، حاصل $(f \circ f)\left(\frac{7}{2}\right)$ کدام است؟

(۱) ۱

(۲) $\frac{1}{3}$

(۳) صفر

(۴) $\frac{4}{3}$



مثال: اگر $f(x) = \frac{2x+3}{2-x}$ و $g(x) = \frac{1-3x}{x+2}$ باشند، ضابطه تابع $g(f(x))$ کدام است؟

(تجربی ۹۶)

- (۱) x (۲) $-x$ (۳) $-x-1$ (۴) $x+1$

مثال: اگر $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$ و $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x$ باشند، مساحت ناحیه محدود به نمودار تابع $y = f \circ g(x)$ و محورهای مختصات کدام است؟

(۱) ۱

(۲) $\frac{1}{2}$

(۳) ۲

(۴) ۳

مثال: اگر $f(x) = x^2 + x$ و $g(x) = \sqrt{4x+1}$ باشند، مساحت ناحیه محدود به نمودار تابع $g \circ f$ و خط به معادله $y = 3$ کدام است؟

(تجربی ۹۵)

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) $\frac{4}{5}$ (۴) ۶



مثال: اگر $f(x) = \frac{x}{\sqrt{-x^2 + x + 2}}$ و $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ باشند، دامنه تعریف تابع $f \circ g$ ، کدام است؟

(تقریبی خارج ۹۴)

- (۱) $\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ (۲) $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ (۳) $(-2, 0)$ (۴) $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$



مثال: اگر $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ و $g(x) = \sqrt{x-x^2}$ باشد، دامنه تعریف تابع $g \circ f$ کدام است؟ (ریاضی خارج ۹۶)

- (۱) $[0, 1]$ (۲) $[-1, 1]$ (۳) $\mathbb{R}$ (۴) $\mathbb{R} - (-1, 1)$

مثال: اگر $f(x) = \sqrt{3-x}$ و $g(x) = \log_2(x^2 + 2x)$ باشد، دامنه تعریف تابع $f \circ g$

(ریاضی ۹۴)

کدام است؟

- (۱) $[-4, 2]$
 (۲) $[-2, 0]$
 (۳) $[-4, -1] \cup (1, 2]$
 (۴) $[-4, -2] \cup (0, 2]$



مثال: اگر $f(x) = \sqrt{2-x}$ و $g(x) = \log(x^2 - 15x)$ باشد، دامنه تعریف تابع $f \circ g$ کدام است؟
(ریاضی فارغ ۹۵)

(۱) $(0, 5) \cup [20, 25)$


(۲) $[-5, 0) \cup (15, 20]$

(۳) $(15, 20]$

(۴) $[-5, 0)$

(گزینه دو ۹۹)

مثال: با توجه به شکل زیر، دامنه $g \circ f$ چند عضو دارد؟




(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

مثال: نمودار توابع f و g به شکل مقابل است. دامنه تابع $g \circ f(x)$ شامل چند عدد صحیح است؟
(مهر و ماه)



(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

(تقریبی ۱۶)

مثال: اگر خروجی ماشین شکل مقابل $\frac{4}{3}$ باشد، مقدار ورودی کدام است؟

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) $\frac{7}{2}$

(۱) $\frac{11}{9}$

ورودی $\Rightarrow 2x - 2 \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{x+1}} \Rightarrow$ خروجی

مثال: اگر $f(x) = x + \sqrt{x}$ و $g = \{(1,2), (5,4), (6,5), (2,3)\}$ و $g(f(a)) = 5$ باشد،

عدد a کدام است؟

(تجربی ۹۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



مثال: توابع $f = \{(2,1), (3,2), (4,5), (1,7)\}$ و $g = \{(1,2), (3,1), (a,3), (b,1)\}$

(ریاضی ۹۰)

مفروض‌اند، اگر $(4,2) \in f \circ g$ و $(4,1) \in g \circ f$ باشند، دوتایی (a,b) کدام است؟

(۵, ۴) (۴)

(۴, ۵) (۳)

(۴, ۳) (۲)

(۳, ۴) (۱)

مثال: اگر توابع f و g به عنوان ماشین به صورت زیر باشند و $g(x) = 3x + 4$ ، مقدار $f(5)$ کدام

(تجربی خارج ۹۱)


است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



(تجربی ۱۴)

مثال: اگر $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ و $g(x) = \frac{x^2+2}{x^2+1}$ ، مقدار $g(1)$ کدام است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

مثال: اگر $f(x) = x^2 - [x]$ و $f\left(a f\left(\sqrt{5}\right)\right) = 2$ باشد، کدام می‌تواند مقدار a باشد؟
(ریاضی اردیبهشت ۱۴۰۳)

(۱) $\frac{1}{3}$

(۲) $-\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{1}{5}$

(۴) $-\frac{1}{5}$

مثال: اگر $f(x) = \frac{x}{x-1}$ باشد، ضابطه تابع $f(x^2) - 2f(x) + 1$ کدام است؟
(ریاضی ۱۹)

(۱) $\frac{1}{1-x^2}$

(۲) $\frac{2x}{x^2-1}$

(۳) $\frac{2x+1}{1-x^2}$

(۴) $\frac{2x-1}{x^2-1}$

مثال: اگر $f(2x-3) = 4x^2 - 14x + 13$ باشد، ضابطه $f(x)$ ، برابر کدام است؟
(تجربی ۹۷)

(۱) $x^2 - x + 3$

(۲) $x^2 - 2x - 1$

(۳) $x^2 - 2x + 1$

(۴) $x^2 - x + 1$



مثال: اگر $f(\cot x) = \frac{\sin x}{\cos^3 x}$ ، ضابطه $f(x)$ کدام است؟
(نزدیام فیلی سبز)

(۱) $\frac{x^3+1}{x^2}$

(۲) $\frac{x^2+1}{x^3}$

(۳) $\frac{x^3-1}{x^2}$

(۴) $\frac{x^2-1}{x^3}$



تابع صعودی و نزولی:

تابع $f(x)$ را صعودی گوئیم هرگاه برای هر x_1 و x_2 از دامنه‌ی $f(x)$ که $x_1 < x_2$ ، داشته باشیم:

$$f(x_1) \leq f(x_2)$$

تابع $f(x)$ را نزولی گوئیم هرگاه برای هر x_1 و x_2 از دامنه‌ی $f(x)$ که $x_1 < x_2$ ، داشته باشیم:

$$f(x_1) \geq f(x_2)$$

تابع $f(x)$ را صعودی اکید گوئیم هرگاه برای هر x_1 و x_2 از دامنه‌ی $f(x)$ که $x_1 < x_2$ ، داشته باشیم:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

تابع $f(x)$ را نزولی اکید گوئیم هرگاه برای هر x_1 و x_2 از دامنه‌ی $f(x)$ که $x_1 < x_2$ ، داشته باشیم:

$$f(x_1) > f(x_2)$$


تابع $f(x)$ را ثابت گوئیم هرگاه برای هر x_1 و x_2 از دامنه‌ی $f(x)$ ، داشته باشیم:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

نکته: تابعی که صعودی یا نزولی باشد را یکنوا نامیده و تابعی که اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی باشد را اکیداً یکنوا می‌نامیم.

نکته: تابعی که در بازه‌ای اکیداً صعودی و در بازه‌ای دیگر اکیداً نزولی باشد را غیریکنوا می‌نامیم.





مثال: نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} 4x-1 & 0 \leq x < 1 \\ -3x+6 & 1 \leq x < 2 \\ 2 & x \geq 2 \end{cases}$ را رسم کرده و بازه‌های یکنوایی آن را تعیین نمایید.




مثال: اگر $f(x) = -x + [x]$ و $g(x) = 2^x$ ، برد تابع $(g \circ f)(x)$ را بیابید.

مثال: صعودی و نزولی بودن توابع زیر را بررسی نمایید.


(۱) $f(x) = 2^{-x}$ (۲) $f(x) = x^2 - 2x$ (۳) $f(x) = x|x|$ (۴) $f(x) = x + |x| + 1$




مثال: یکنوایی تابع $y = |x| + |x - 2|$ را بررسی نمایید.



مثال: نمودار تابع $f(x) = (-1)^{[x]}$ را در بازه $f(x) = [-1, 2)$ رسم و سپس یکنوایی آن را بررسی نمایید.



مثال: یکنوایی تابع $f(x) = \frac{1}{x}$ را در دامنه آن بررسی نمایید.



مثال: تابعی مثال بزنید که صعودی باشد ولی اکیداً صعودی نباشد.

مثال: تابعی مثال بزنید که نزولی باشد ولی اکیداً نزولی نباشد.







مثال: با استفاده از نمودار تابع $y = \cos x$ ، نمودار توابع زیر رسم شده است. ضابطه هر نمودار را مشخص نمایید.

الف) $y = -\frac{1}{4} \cos(-\frac{1}{4}x)$


ب) $y = 2 \cos 2x$

پ) $y = \cos(\frac{1}{4}x)$

ت) $y = -\cos 2x$



مثال: نمودار توابع $y = -\sin 2x - 1$ و $y = 2 \sin(\frac{-1}{3}x)$ را به کمک نمودار تابع $y = \sin x$ در بازه $[-\pi, \pi]$ رسم کنید.



مثال: تابع f روی $\mathbb{R}$ اکیداً نزولی است و $f(x^2 - 1) < f(2x + 2)$ ، حدود x کدام است؟ (مبتکران ۹۹)

(۱) $(-2, 4)$

(۲) $(-1, 3)$

(۳) $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$

(۴) $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$

مثال: تابع f اکیداً صعودی و دامنۀ آن، مجموعه‌ای از مقادیر مثبت است. اگر $f(m^2 - 4m + 4) < f(2m^2 - 9m - 2)$ باشد، m دارای چند مقدار صحیح است؟ (ریاضی فارج ۱۴۰۲)

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۵ (۴) ۶

مثال: در بازه‌ای که تابع با ضابطه $f(x) = |x - 2| + |x - 3|$ اکیداً نزولی است، نمودار آن با نمودار تابع

$g(x) = 2x^2 - x - 10$ ، در چند نقطه مشترک هستند؟ (تجربی ۹۷)

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) فاقد نقطه مشترک

تابع یک به یک:

تابعی یک به یک است که به ازای متغیر (y) فقط یک (x) داشته باشد.

$$\forall y_1 = y_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow y = f(x)$$

بررسی تابع یک به یک از روی زوج مرتبها: تابعی یک به یک است که مؤلفه‌های دوم تکراری نداشته باشد و اگر مؤلفه‌های دوم زوج مرتبها برابر بودند، مؤلفه‌های اول نیز برابر باشند.

مثال: رابطه‌ی زیر نمایشگر یک تابع یک به یک می‌باشد. مقدار متغیر m را بیابید.

$$f = \{ (1, a+1), (1, 5-a), (2m, a-1), (5, a-3) \}$$

بررسی تابع یک به یک از روی نمودار: تابعی یک به یک است که هر خط افقی تابع را حداکثر در یک نقطه قطع کند.

روش‌های تشخیص تابع یک به یک:

۱- عددگذاری: برای بیان مثال نقض و رد گزینه استفاده می‌شود.

۲- توابع درجه‌ی زوج هیچ‌گاه یک به یک نیستند، مگر این‌که محدودیت دامنه ایجاد شود.

۳- تابع درجه‌ی دوم $y = ax^2 + bx + c$ با شرط آن‌که $x \geq \frac{-b}{2a}$ یا $x \leq \frac{-b}{2a}$ یک به یک است.

۴- تابع $y = |ax + b|$ یک به یک نیست.

۵- توابع یکنوای اکید (صعودی اکید یا نزولی اکید) یک به یک هستند.

۶- توابع به فرم $y = ax + b + k|cx + d|$ ممکن است یک به یک باشد و ممکن است یک به یک نباشد و بهترین راه برای تشخیص آن، رسم تابع است.

مثال: کدام یک از توابع زیر یک به یک هستند؟

$$y = [x]$$

$$y = \sin x$$

$$y = x^4 + x^3$$

$$y = x^4 - 5$$

$$y = x^2 - 6x, \quad x \geq 3$$

$$y = x^3 + x$$

$$y = x^3 - x$$

$$y = \sqrt{x-2} + |x+4|$$

$$y = x + |2x-2|$$

$$y = 2x + |x-1|$$

تابع معکوس:

تابعی معکوس پذیر است که یک به یک باشد و برای یافتن تابع معکوس به روش های زیر عمل می کنیم.

۱- توابع زوج مرتبی: جای مؤلفه های اول و دوم را عوض می کنیم.

مثال: معکوس تابع زیر را بیابید.

$$f = \{(1, 4), (4, 3)\} \Rightarrow f^{-1} =$$

دو تابع $f = \{(1, 4), (2, 3)\}$ و $g = \{(1, 4), (2, 4)\}$ را در نظر می گیریم. رابطه معکوس این دو تابع به صورت زیر می باشد.

$$f = \{(1, 4), (2, 3)\} \Rightarrow f^{-1} =$$



$$g = \{(1, 4), (2, 4)\} \Rightarrow g^{-1} =$$

تابع f را که رابطه معکوس آن، تابع می باشد، معکوس پذیر (وارون پذیر) می گوئیم.

تابع g را که رابطه معکوس آن، تابع نمی باشد، معکوس ناپذیر (وارون ناپذیر) می گوئیم.

اصطلاحاً f^{-1} را تابع معکوس تابع f می نامیم ولی در مورد تابع g ، رابطه g^{-1} صرفاً رابطه معکوس تابع g می باشد و از آنجایی که g^{-1} تابع نیست، نمی توان به آن تابع معکوس تابع g گفت.

۲- یافتن معکوس از روی نمودار: قرینه تابع نسبت به نیمساز ربع اول و سوم ($y = x$) را رسم می کنیم.



۳- یافتن تابع معکوس در توابعی که ضابطه آن‌ها داده شود: ابتدا یک به یک بودن بررسی شده و سپس متغیر x را بر حسب متغیر y یافته و در نهایت جای متغیرهای x و y را عوض می‌کنیم.

مثال: معکوس توابع زیر را بیابید.

$$y = x^2 - 6x, \quad x < 3$$


$$y = \sqrt[3]{x-1} + 1$$

$$y = \log_2 x$$

$$y = \frac{x-4}{x+1}$$

مثال: معکوس تابع $y = \cos x$ روی کدام بازه‌ی زیر یک تابع است؟

- (۱) $[-\pi, 0]$ (۲) $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (۳) $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ (۴) $[0, 2\pi]$



مثال: اگر $f(x) = 2x + 1$ و $g(x) = x - 1$ ، ضابطه تابع $f \circ g^{-1}$ را بیابید.

مثال: اگر تابع $f(x) = x^3 + 3x + 10$ و $f(a) = 24$ ، آنگاه مقدار $f^{-1}(-4)$ را بر حسب a بیابید.

مثال: اگر $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ باشد، ضابطه تابع $f^{-1}(\sin x)$ را بیابید.

مثال: با محدود کردن دامنه تابع $f(x) = x^2 - 4x + 5$ ، یک تابع یک به یک به دست آورده و دامنه و برد تابع f و وارون آن را بنویسید و سپس این دو تابع را در یک دستگاه مختصات رسم نمایید.

نکته: اگر دو تابع f و g وارون یکدیگر باشند، آن گاه داریم:

$$(f \circ g^{-1})(x) = x, \quad (g \circ f^{-1})(x) = x$$

مثال: در هر مورد از قسمت‌های زیر، نشان دهید که f و g وارون یکدیگر هستند.

الف) $f(x) = \frac{-7}{2}x - 3$ و $g(x) = -\frac{2x+6}{7}$

ب) $f(x) = -\sqrt{x-8}$ و $g(x) = 8 + x^2; x \leq 0$



نکاتی در مورد تابع وارون

۱- اگر توابع f و f^{-1} وارون یکدیگر باشند، آن گاه: $D_{f^{-1}} = R_f$ و $R_{f^{-1}} = D_f$.

۲- اگر نقطه $A(a, b)$ روی تابع f باشد، نقطه $A'(b, a)$ روی تابع f^{-1} قرار دارد.

۳- اگر توابع f و f^{-1} متقاطع باشند، نقطه برخورد آن‌ها روی نیمساز ربع اول و سوم ($y=x$) قرار می‌گیرد.

۴- در توابع هموگرافیک $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ اگر $a+d=0$ باشد، در این صورت $f(x) = f^{-1}(x)$ می‌باشد.

$$۵) \forall x \in D_f ; (f \circ f^{-1})(x) = x$$

$$۶) \forall x \in D_f ; (f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

مثال: برد تابع معکوس تابع $f(x) = \frac{2x+5}{x+2}$ را بیابید.

مثال: اگر نقطه $(k, 2)$ روی تابع معکوس تابع $y^5 + y = x$ قرار داشته باشد، مقدار متغیر k را بیابید.

مثال: نقطه برخورد تابع $y = x^3 + x - 8$ با معکوس خودش را بیابید.

مثال: ضابطه تابع معکوس $f(x) = \frac{3x+5}{x-3}$ را بیابید.

مثال: اگر $f(x) = \frac{x}{8} - 3$ و $g(x) = x^3$ ، مقادیر زیر را محاسبه کنید.

$$(g^{-1} \circ f^{-1})(5) =$$

$$(f^{-1} \circ f^{-1})(6) =$$

$$(f \circ g)^{-1}(5) =$$

مثال: توابع زیر یک به یک نیستند. با محدود کردن دامنه آن‌ها توابعی یک به یک بسازید و ضابطه وارون آنها را به دست آورید.

$$f(x) = |x| \quad (\text{الف})$$

$$g(x) = -x^2 \quad (\text{ب})$$

مثال: اگر $f(x) = \sqrt{x+3}$ ، دامنه و برد توابع f و f^{-1} را به دست آورده و نمودار آنها را رسم کنید. ضابطه f^{-1} را نیز به دست آورید.

مثال: رابطه بین درجه سانتی‌گراد و فارنهایت که برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌شوند، به صورت $f(x) = \frac{9}{5}x + 32$ است که در آن x میزان درجه سانتی‌گراد و $f(x)$ میزان درجه فارنهایت است. $f^{-1}(x)$ را به دست آورده و توضیح دهید چه چیزی را نشان می‌دهد.

مثال: وارون تابع $y = x^3 - x + 1$ از کدام نقطه عبور می‌کند؟
 (۱) $(-1, -2)$ (۲) $(\frac{5}{8}, \frac{1}{2})$ (۳) $(1, 2)$ (۴) $(-\frac{1}{2}, -\frac{11}{8})$
 (تجربی ۱۴۰۱)

مثال: اگر نقطه $(-\frac{1}{8}, -\frac{3}{5})$ روی تابع وارون تابع $y = \frac{x}{a + a|x|}$ باشد، مقدار a کدام است؟
 (۱) $\frac{5}{27}$ (۲) ۵ (۳) ۳ (۴) $3/5$
 (تجربی تیر ۱۴۰۳)



مثال: به ازای کدام مقدار a ، نمودار تابع وارون تابع $f(x) = x^3 + 6x^2 + ax + 1$ خط $10y - x = -10$ را در نقطه‌ای به عرض ۱ قطع می‌کند؟
 (۱) ۱۵ (۲) ۱۲ (۳) ۹ (۴) ۵
 (ریاضی اردیبهشت ۱۴۰۳)

مثال: وارون تابع $f(x) = \sqrt{x-2} \sqrt{mx-1}$ در دامنه محدود، خط $y = 12 - x$ را در نقطه‌ای به عرض 10° قطع می‌کند. مقدار $f(m+4)$ کدام است؟
(ریاضی ۱۴۰۲)

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳) ۲ (۴) ۱

مثال: اگر رابطه $f = \{(3, 2), (a, 5), (3, a^2 - a), (b, 2), (-1, 4)\}$ تابع یک به یک باشد، دوتایی (a, b) کدام است؟
(ریاضی خارج ۱۶)

- (۱) $(-1, 1)$ (۲) $(-1, 3)$ (۳) $(2, 1)$ (۴) $(2, 3)$

مثال: کدام یک از تابع‌های زیر، یک به یک است؟
(ریاضی ۹۷)

- (۱) $f(x) = x + \sqrt{x}$ (۲) $g(x) = x - \sqrt{x}$
(۳) $h(x) = 2x + \frac{1}{x}$ (۴) $p(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

مثال: کدام یک از توابع زیر یک به یک است؟

(قلم پی ۱۴۰۰)

$$g(x) = x - x\sqrt{x} \quad (۲)$$

$$f(x) = x^2 + 2\sqrt{x} \quad (۱)$$

$$p(x) = 2x^2 - |x| \quad (۴)$$

$$h(x) = x + \frac{1}{x} \quad (۳)$$



(ریاضی ۱۱)

مثال: در تابع با ضابطه $f(x) = -x + \sqrt{-2x}$ مقدار $f^{-1}(4)$ کدام است؟

$$-8 \quad (۴)$$

$$-2 \quad (۳)$$

$$-5 \quad (۲)$$

(۱) تعریف نشده

مثال: تابع f با دامنه $(2, 3)$ و ضابطه $f(x) = [-x]x + [x]$ تعریف شده است. مقدار $f^{-1}(-5)$

(قلم پی ۹۹)

کدام است؟

$$\frac{8}{3} \quad (۴)$$

(۳) ناموجود

$$\frac{7}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{5}{2} \quad (۱)$$



مثال: اگر نمودار تابع وارون $f(x) = x^3 + 2x + 2m$ از نقطه $(1, m)$ عبور کند، مقدار $f^{-1}(-6)$

(IQ کج)

کدام است؟

$$\sqrt{2} \quad (۴)$$

$$2 \quad (۳)$$

$$1 \quad (۲)$$

(۱) صفر

مثال: اگر $g(x)$ وارون تابع $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ باشد، حاصل $g\left(-\frac{3}{7}\right) + g\left(\frac{5}{9}\right)$

کدام است؟

(تجربی مهر ۱۴۰۰)

$-\frac{1}{3}$ (۴)


$-\frac{11}{28}$ (۳)

$\frac{19}{20}$ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

مثال: اگر شکل مقابل نمودار $f(x-1)$ باشد، حاصل $f(2) - f^{-1}(2)$ کدام است؟

(تجربی ۱۴۰۰)



صفر (۱)

-1 (۲)

1 (۳)

5 (۴)

مثال: تابع $f(x) = x^2 \sqrt{x^2}$ در یک بازه نزولی است. ضابطه وارون تابع در این بازه،

(ریاضی ۱۴۰۰)

کدام است؟

$-\sqrt[3]{x}, x \leq 0$ (۲)

$-\sqrt{x^3}, x \leq 0$ (۱)

$-\sqrt[3]{x}, x \geq 0$ (۴)

$-\sqrt{x^3}, x \geq 0$ (۳)

d کدام است؟

(۱) - ۲

(۲) - ۱

(۳) ۱

(۴) ۲



مثال: قرینه خط به معادله $3y - 2x = 4$ را نسبت به خط $y = x$ ، خط d می‌نامیم. عرض از مبدأ خط

(تقریبی ۹۷)

مثال: قرینه نمودار تابع $y = 2 + \sqrt{x - 1}$ را نسبت به خط $y = x$ رسم کرده و سپس نمودار حاصل را

۲ واحد در جهت مثبت محور x ها و ۳ واحد در جهت منفی محور y ها انتقال می‌دهیم و آن را $y = g(x)$

می‌نامیم. مقدار $g(4)$ کدام است؟

(۱) ۳

(۲) - ۳





(۳) - ۲

(۴) - ۴

(تقریبی ۱۴۰۰)

مثال: اگر $f(x) = x|x|$ باشد، نمودار تابع $y = f^{-1}(x)$ کدام است؟

(تقریبی ۹۵)



برد تابع:

حدود تغییرات متغیر y را بر حسب متغیر x ، برد تابع می‌نامیم.

برد تابع زوج مرتبی:


مجموعه‌ی مؤلفه‌های دوم را برد می‌نامیم.

$$f = \{(1, 4), (4, 3), (5, 6)\} \Rightarrow R_f =$$


تشخیص برد تابع از روی نمودار:

تصویر نمودار تابع بر محور y ها را برد تابع می‌نامیم.

مثال: برد تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & 0 \leq x < 1 \\ 1 - x & 1 \leq x < 3 \end{cases}$ را بیابید.



مثال: برد تابع $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x > 0 \\ 2 + x & -2 \leq x \leq 0 \end{cases}$ را بیابید.



مثال: اگر $f(x) = \frac{2}{x-1}$ و $g(x) = \frac{3}{x}$ ، برد تابع $(g \circ f)(x)$ کدام است؟

- (۱) $\mathbb{R}$ (۲) $\mathbb{R} - \{1\}$ (۳) $\mathbb{R} - \{0\}$ (۴) $\mathbb{R} - \{0, 1\}$

مثال: اگر $f(x) = x - [x]$ و $g(x) = [x] + [-x]$ باشند، برد تابع $(f \circ g)(x)$ شامل چند عدد صحیح است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) بیش از ۲

مثال: اگر $f(x) = 2x - [2x]$ و $g(x) = -x^2 + 4x$ باشند، برد تابع $(g \circ f)(x)$ ، کدام است؟

(تجربی ۹۹)

- (۱) $[0, 2)$ (۲) $[0, 3)$ (۳) $[0, 4)$ (۴) $[1, 4)$



مثال: اگر $f(x) = [x] - x$ و $g(x) = \frac{1-2x}{x+1}$ باشند، برد تابع $(g \circ f)(x)$ ، کدام

است؟

(تقریبی فارچ ۹۹)

- (۱) $[-1, 1]$ (۲) $(-1, 1)$ (۳) $(1, +\infty)$ (۴) $(-\infty, 1)$

مثال: برد تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 + 2x & -2 \leq x \leq 0 \end{cases}$ کدام است؟

(موج آزمون نشر الگو)

- (۱) $[-1, 0]$ (۲) $[-1, 1]$ (۳) $[0, 1]$ (۴) $[\frac{-1}{2}, 0]$

مثال: برد تابع $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} & x > 0 \\ |x+2| & x \leq 0 \end{cases}$ کدام است؟

(IQ کج)

- (۱) $\mathbb{R} - \{0\}$ (۲) $\mathbb{R} - \{1\}$ (۳) $\mathbb{R} - \{0, 1\}$ (۴) $\mathbb{R}$



مثال: برد تابع با ضابطه $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2}$ کدام است؟

- (۱) $(0, 1)$ (۲) $[1, +\infty)$ (۳) $(1, +\infty)$ (۴) $[0, +\infty)$

بخش پذیری و بدست آوردن باقیمانده تقسیم

اگر $f(x)$ و $p(x)$ چندجمله‌ای باشند و درجه $p(x)$ از صفر بزرگ‌تر باشد، آنگاه چندجمله‌ای‌های $q(x)$ و $r(x)$ وجود دارند به طوری که:

$$f(x) = p(x)q(x) + r(x)$$

که در آن $r(x) = 0$ یا درجه $r(x)$ از درجه $p(x)$ کمتر است.

اگر $r(x) = 0$ باشد، چندجمله‌ای $f(x)$ بر چندجمله‌ای $p(x)$ بخش پذیر است.

مثال: اگر $f(x) = x^4 - 16$ و $p(x) = x + 2$ ، نشان دهید که $f(x)$ بر $p(x)$ بخش پذیر است.

نکته: باقی مانده تقسیم چندجمله‌ای $f(x)$ بر $ax + b$ عبارت است از:

$$r(x) = f\left(\frac{-b}{a}\right)$$

مثال: در تقسیم $f(x) = x^3 + 2$ بر $p(x) = 2x - 1$ ، $q(x)$ و $r(x)$ به ترتیب خارج قسمت و باقی مانده‌اند. نشان دهید که $r(x)$ از درجه صفر است و سپس خارج قسمت تقسیم را بیابید.

مثال: باقی مانده تقسیم چندجمله‌ای $x^2 + x - 2$ را بر $2x + 1$ به دست آورید.

مثال: اگر چندجمله‌ای $x^2 + ax - 2$ بر $x - a$ بخش پذیر باشد، مقدار a را بیابید.

مثال: اگر باقی مانده تقسیم چندجمله‌ای $x^3 + kx^2 + 2$ بر $x - 2$ برابر با ۶ باشد، k را تعیین کنید.

مثال: مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که چندجمله‌ای $x^3 + ax^2 + bx + 1$ بر $x - 2$ و $x + 1$ بخش پذیر باشد.



اتحادهای مهم زیر را به خاطر می سپاریم

$$(x^n - a^n) = (x - a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + x^{n-3}a^2 + \dots + x^1 a^{n-2} + a^{n-1})$$

اگر n فرد باشد، با تغییر a به $-a$ ، اتحاد زیر شکل می گیرد.

$$(x^n + a^n) = (x + a)(x^{n-1} - x^{n-2}a + x^{n-3}a^2 - \dots - x^1 a^{n-2} + a^{n-1})$$

اگر n زوج باشد، با تغییر a به $-a$ ، اتحاد زیر شکل می گیرد.

$$(x^n + a^n) = (x - a)(x^{n-1} - x^{n-2}a + x^{n-3}a^2 - \dots + x^1 a^{n-2} - a^{n-1})$$

مثال: چندجمله‌ای $x^5 - 1$ را با عامل $x - 1$ تجزیه کنید.

مثال: چندجمله‌ای $x^6 - 64$ را با عامل $x - 2$ تجزیه کنید.

مثال: چندجمله‌ای $x^4 - 16$ را با عامل $x + 2$ تجزیه کنید.

مثال: چندجمله‌ای $x^5 + 32$ را با عامل $x + 2$ تجزیه کنید.

مثال: هر گاه باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $f(x)$ بر $x + 3$ و $x - 2$ به ترتیب ۲ و ۷ باشد، باقیمانده تقسیم $f(x)$ بر $x^2 + x - 6$ را به دست آورید.